



(3 درجات)

## اختبار 1

1 اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة :

1 ..... =  $\mathcal{E}$

Ⓐ  $\mathcal{E} \cap \mathcal{F}$

Ⓑ  $]-\infty, \infty[$

Ⓒ  $\mathcal{E} \cup \mathcal{F}$

Ⓓ  $\mathcal{E} \cap \mathcal{F}$

2 المعكوس الضربي للعدد  $\frac{\sqrt{2}}{3}$  هو .....

Ⓐ  $\frac{\sqrt{2}}{2}$

Ⓑ  $\sqrt{2}$

Ⓒ  $\sqrt{2} \cdot 3$

Ⓓ  $\sqrt{2}$

3 حجم كرة طول قطرها 6 سم = ..... سم<sup>3</sup>.

Ⓐ  $288\pi$

Ⓑ  $36\pi$

Ⓒ  $12\pi$

Ⓓ  $288$

(3 درجات)

2 أكمل ما يأتي :

1 مكعب طول حرفه 4 سم فإن مساحته الكلية = ..... سم<sup>2</sup>.

2 مرافق العدد  $\frac{1}{\sqrt{2}-\sqrt{3}}$  هو .....

3 إذا كانت :  $\frac{A}{9} = 2$  فإن :  $A$  في أبسط صورة = .....

(درجتان)

3 اختصر لأبسط صورة :  $2\sqrt{18} + 5\sqrt{2} + \frac{1}{3}\sqrt{162}$

4 إذا كانت :  $S = ]-1, 4[$  ،  $V = ]2, \infty[$

(درجتان)

أوجد مستعينا بخط الأعداد كلاً من :  $S \cap V$  ،  $S - V$



(3 درجات)

## اختبار 2

1 اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة :

1 متوازي مستطيلات أبعاده  $2\sqrt{2}$  سم ،  $3\sqrt{2}$  سم ،  $6\sqrt{2}$  سم فإن حجمه = ..... سم<sup>3</sup>.

- أ  $30\sqrt{2}$       ب  $6\sqrt{2}$       ج 6      د  $18\sqrt{2}$

2 ..... =  $]-10, 8[ - \{10, 9, 8\}$

- أ  $\emptyset$       ب  $\{10, 8\}$       ج  $\{9\}$       د ط

3 المعكوس الجمعي للعدد  $(\sqrt{2} - \sqrt{5})$  هو .....

- أ  $\sqrt{2} + \sqrt{5}$       ب  $\sqrt{2} - \sqrt{5}$       ج  $\sqrt{5} - \sqrt{2}$       د  $\sqrt{5} - \sqrt{2}$

(3 درجات)

2 أكمل ما يأتي :

1 المحاييد الضربي في ح هو ..... والمحاييد الجمعي في ح هو .....

2  $\sqrt{5}$  ،  $2\sqrt{2}$  ،  $4\sqrt{2}$  ،  $8\sqrt{2}$  ، ..... (بنفس التسلسل)

3 ..... =  $2\sqrt{2} + 2\sqrt{2}$

3 أسطوانة دائرية قائمة حجمها 924 سم<sup>3</sup> ، وارتفاعها 6 سم أوجد مساحتها الجانبية.  $(\frac{22}{7} = \pi)$  (درجتان)

4 إذا كانت :  $2\sqrt{2} + 3\sqrt{2} = 4$  ،  $\frac{1}{2\sqrt{2} + 3\sqrt{2}} = س$  أوجد في أبسط صورة قيمة :  $س - 2$  (درجتان)



## اختبار 1

(٣ درجات)

١ اخترا الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة :

١ مثلث متساوي الساقين قياس إحدى زواياه الداخلية  $60^\circ$  فإن عدد محاور تماثل هذا المثلث هو .....

- ١ (أ) ٤      ٢ (ب) ٣      ٣ (ج) ٢      ٤ (د) ١



٢ إذا كانت : ح ، ب تنتميان إلى  $\vec{AO}$  بحيث :  $AB < AC$

فإن : ح ب ..... ح أ

- ١ (أ)  $<$       ٢ (ب)  $>$       ٣ (ج)  $=$       ٤ (د)  $\leq$

٣  $\triangle ABC$  فيه :  $AB = 5$  سم ،  $BC = 7$  سم ،  $AC = 6$  سم فإن : ح (د) ..... ح (أ)

- ١ (أ)  $<$       ٢ (ب)  $>$       ٣ (ج)  $=$       ٤ (د)  $\equiv$

(٣ درجات)

٢ أكمل ما يأتي :


١ المستقيم المرسوم من رأس مثلث متساوي الساقين عمودياً على القاعدة .....

٢ إذا اختلف طولاً ضلعين في مثلث فأكبرهما في الطول تقابله زاوية .....

٣ في الشكل المقابل :

إذا كانت :  $AB = AC$  ،  $AD < AC$  س

فإن : س س ..... ح ص




(درجتان)

٣ في الشكل المقابل :

$AB < AC$  مثلث فيه :  $AB < AC$  ح

،  $SS \parallel BC$

برهن أن : ح (د) ص س) < ح (د) س ص)



(درجتان)

٤ في الشكل المقابل :

$AB < AC$  مثلث فيه :


$AB = AC$  ،  $AE \perp BC$

،  $\angle EAB = 25^\circ$  ،  $BC = 4$  سم

أوجد :


١ ح (د) ع ح)

٢ طول ع ح





(3 درجات)



(د) غير ذلك

(ج) =

(ب) >

(أ) <

(د) 4

(ج) 2

(ب) 1

(أ) صفر

(د) حـ

(ج) عـ

(ب) حـ

(أ) حـ

(3 درجات)


2 أكمل ما يأتي :

1 منصف زاوية الرأس في المثلث المتساوي الساقين .....

2 في  $\Delta$  س ص ع إذا كان : س ع < س ص فإن : (د ع) ..... (د ص)

3 عدد محاور تماثل المثلث المختلف الأضلاع هو .....

(درجتان)




3 في الشكل المقابل :

س ص < س ل

، ص ع < ع ل

برهن أن : (د س ل ع) < (د س ص ع)

(درجتان)



4 في الشكل المقابل :

س  $\exists$  ب حيث  $\overline{س ب} = \overline{س ج}$

أثبت أن : (د ب ح) < (د ج ح)



## 1 إجابة اختبار

ج ٣

ب ٢

ج ١ ١

$$\frac{\sqrt{2}}{3} \pm 3$$

$$\sqrt{2} - \sqrt{3}$$

$$96 \quad 1 \quad 2$$

$$\sqrt{2} \cdot 14 = \sqrt{2} \cdot 3 + \sqrt{2} \cdot 5 + \sqrt{2} \cdot 6 = \sqrt{2} \cdot 9 \times \frac{1}{3} + \sqrt{2} \cdot 5 + \sqrt{2} \cdot 3 \times 2 \quad 3$$



$$] \infty, -1] = \text{سم} \cup \text{ص} \quad 4$$

$$\text{ص} - \text{ص} = ] \infty, 4[$$

## 2 إجابة اختبار

ب ٣

ب ٢

ج ١ ١

$$\sqrt{2} \cdot 2 \quad 3$$

$$125\sqrt{2} \quad 2$$

$$1, \text{ صفر} \quad 1 \quad 2$$

$$3 \quad \therefore \text{حجم الأسطوانة} = \pi \cdot \text{نق}^2 \cdot \text{ع}$$

$$\therefore 6 \times \text{نق}^2 \times \frac{22}{7} = 924$$

$$\therefore \text{نق}^2 = \frac{7 \times 924}{6 \times 22} = 49$$

$$\therefore \text{نق} = 7 \text{ سم}$$

$$\therefore \text{المساحة الجانبية} = 2 \cdot \pi \cdot \text{نق} \cdot \text{ع} = 2 \times \frac{22}{7} \times 7 \times 6 = 264 \text{ سم}^2$$

$$4 \quad \therefore \sqrt{2} - \sqrt{3} = \frac{\sqrt{2} - \sqrt{3}}{2 - 3} = \frac{\sqrt{2} - \sqrt{3}}{\sqrt{2} - \sqrt{3}} \times \frac{1}{\sqrt{2} + \sqrt{3}} = \text{ب}$$

$$\therefore (-4) - (-2) = -2$$

$$(\sqrt{2} - \sqrt{3} + \sqrt{2} + \sqrt{3})(\sqrt{2} + \sqrt{3} - \sqrt{2} + \sqrt{3}) =$$

$$6\sqrt{2} = 3\sqrt{2} \times 2\sqrt{2} =$$

1 إجابة اختبار

١ ٣


ب ٢

ب ١ ١

١ ٢ ينصف كلاً من القاعدة وزاوية الرأس.

٢ أكبر في القياس من قياس الزاوية المقابلة للضلع الآخر.

٣ >



٣ في  $\triangle ABC$  :  $\because \angle A < \angle B$

(١)  $\therefore \angle C < \angle D$  (ب)  $\therefore \angle C < \angle D$

،  $\because \overline{DE} \parallel \overline{BC}$  ،  $\overline{AC}$  قاطع لهما


(٢)  $\therefore \angle C = \angle D$  (بالتناظر)

وبالمثل :  $\because \overline{DE} \parallel \overline{BC}$  ،  $\overline{AB}$  قاطع لهما

(٣)  $\therefore \angle C = \angle D$  (بالتناظر)

من (١) ، (٢) ، (٣) :

$\therefore \angle C < \angle D$  (بالتناظر) (وهو المطلوب)



٤  $\because \angle A = \angle B$  ،  $\overline{AD} \perp \overline{BC}$

(المطلوب أولاً)  $\therefore \angle C = \angle D$  (بالتناظر)  $25^\circ = \angle C$

(المطلوب ثانياً)  $\therefore \angle C = \angle D = \frac{4}{2} = 2$  سم

## 2 إجابة اختبار

٣ ب

٢ ا

١ ب

٢ ١ يكون عمودياً على القاعدة من منتصفها.

٢ >

٣ صفر

٣ العمل : نرسم ص ل

البرهان :

في  $\Delta$  س ص ل :  $\therefore$  س ص < س ل

$\therefore$  ق (د س ل ص) < ق (د س ص ل)



في  $\Delta$  ع ص ل :  $\therefore$  ص ع < ع ل

$\therefore$  ق (د ع ل ص) < ق (د ع ص ل)

بجمع (١) ، (٢) :

$\therefore$  ق (د س ل ص) + ق (د ع ل ص) < ق (د س ص ل) + ق (د ع ص ل)

$\therefore$  ق (د س ل ع) < ق (د س ص ع) (وهو المطلوب)



٤  $\therefore$   $a = b$  ح

$\therefore$   $a + b < a + c$  ح

$\therefore$   $b < c$  ح

$\therefore$  في  $\Delta$  ا ب ج :

ق (د ا ب ج) < ق (د ب ج) (وهو المطلوب)

# أولًا الجبر

## نموذج (١)

### السؤال الأول

• اختر الإجابة الصحيحة:

١ ..... =  $[5, 3] \cap \{3\}$

(أ)  $\emptyset$  (ب)  $\{3\}$  (ج)  $[5, 3[$  (د)  $\{6\}$

٢ ..... =  $\sqrt{7} + \sqrt{7}$

(أ)  $\sqrt{14}$  (ب)  $3\sqrt{7}$  (ج)  $\sqrt{7}$  (د)  $28\sqrt{7}$

٣ ..... =  $(\sqrt{3} - 2)(\sqrt{3} + 2)$

(أ) ٤ (ب)  $2\sqrt{3}$  (ج) ١ (د) ١ -

### السؤال الثاني

• أكمل ما يأتي:

١ المعكوس الجمعي للعدد  $1 - \sqrt{3}$  هو .....

٢ ..... =  $\{5, 2\} \cap [5, 2]$

٣ أسطوانة دائرية قائمة حجمها  $40\pi$  سم<sup>٣</sup> وارتفاعها ١٠ سم يكون طول نصف قطر قاعدتها ..... سم

### السؤال الثالث

• إذا كانت  $s = \sqrt{5} - \sqrt{2}$  ،  $v = \frac{3}{\sqrt{2} - \sqrt{5}}$

أثبت أن: ١  $s$  ،  $v$  مترافقان ٢ أوجد قيمة:  $s^2 - 2s + v + v^2$

### السؤال الرابع

• اختصر إلى أبسط صورة:  $\sqrt[3]{\frac{1}{9}} - \sqrt[3]{24} + \sqrt[3]{81}$

.....



## نموذج (٢)

### السؤال الأول

• اختر الإجابة الصحيحة:

١ متوازي مستطيلات أبعاده:  $\sqrt{2}$  سم،  $\sqrt{3}$  سم،  $\sqrt{6}$  سم يكون حجمه = ..... سم<sup>٣</sup>

(أ) ٦ (ب)  $\sqrt{6}$  (ج) ٣٦ (د)  $\sqrt{18}$

٢ ..... =  $[5, 2] - [7, 3]$

(أ)  $[7, 5]$  (ب)  $]7, 5[$  (ج)  $\{7, 5\}$  (د)  $[7, 5[$

٣ أسطوانة دائرية قائمة حجمها  $90\pi$  سم<sup>٣</sup> وطول قطر قاعدتها ٦ سم، يكون طول ارتفاعها .....

(أ) ٢ سم (ب)  $\sqrt{6}$  سم (ج) ١٠ سم (د) ٢٠ سم

### السؤال الثاني

• أكمل ما يأتي:

١ محيط المستطيل الذي بعده هما  $(\sqrt{5} - 3)$  سم،  $(\sqrt{5} + 3)$  يساوي .....

٢ مجموع الأعداد الحقيقية في الفترة  $[7, 7 - ]$  هو .....

٣ ..... =  $\sqrt[3]{\frac{4}{9}} \times \sqrt[3]{\frac{2}{3}}$

### السؤال الثالث

إذا كانت:  $S = \sqrt{3} + 1$  ،  $V = \frac{2}{1 + \sqrt{3}}$

أوجد قيمة المقدار:  $\frac{S+V}{S-V}$

### السؤال الرابع

• اختصر لأبسط صورة:  $\sqrt[3]{\frac{1}{3}} + \sqrt[3]{27} - \sqrt[3]{75}$

.....

### نموذج (٣)

#### السؤال الأول

• اختر الإجابة الصحيحة:

١  $[٥، ٣] - [٥، ٣] = \dots\dots\dots$

(أ)  $[٥، ٣]$  (ب)  $\{٤\}$  (ج)  $]٥، ٣[$  (د)  $\{٥، ٣\}$

٢  $\dots\dots\dots = \sqrt{٢} + \sqrt{٨}$

(أ)  $\sqrt{١٠}$  (ب)  $\sqrt{١٨}$  (ج)  $٢\sqrt{٢}$  (د)  $\sqrt{٢}$

٣ كرة طول قطرها ٦ سم يكون حجمها  $\dots\dots\dots$  سم<sup>٣</sup>

(أ)  $\pi ٩$  (ب)  $\pi ٢$  (ج)  $\pi ٣٦$  (د)  $\pi ٢٢٨$

#### السؤال الثاني

• أكمل ما يأتي:

١ إذا كان  $\sqrt{٥} + ٣ = \frac{٤}{س}$  فإن قيمة س في أبسط صورة هي  $\dots\dots\dots$

٢ ع. في صورة فترة =  $\dots\dots\dots$

٣ مكعب مجموع أطوال أحرفه ٤٨ سم فإن حجمه =  $\dots\dots\dots$

#### السؤال الثالث

• إذا كان:  $\sqrt{٥} + ٣ = س$  ،  $\sqrt{٥} - ٣ = ص$  فأوجد (س + ص) في أبسط صورة.

#### السؤال الرابع

• أوجد في أبسط صورة:  $\sqrt{٥٠} + \sqrt{٥٤} - ١٠ - \sqrt{\frac{١}{٢}} - \sqrt[٣]{١٦}$

# ثانيًا الهندسة

## نموذج (١)

### السؤال الأول

• اختر الإجابة الصحيحة:

١ مثلث متساوي الساقين قياس إحدى زواياه  $60^\circ$  يكون عدد محاور تماثله .....

- (١) ٤ (ب) ٣ (ج) ٢ (د) ١

٢ عدد متوسطات المثلث المتساوي الساقين .....

- (١) صفر (ب) ١ (ج) ٢ (د) ٣

٣ إذا كان  $\vec{P} \perp \vec{M}$  محور تماثل  $SH$  فإن:  $\frac{SP}{HP} = \dots\dots\dots$

- (١) ١ (ب) ٢ (ج)  $\frac{1}{2}$  (د)  $\frac{2}{3}$

### السؤال الثاني

• أكمل ما يأتي:

١ المتوسط المرسوم من رأس مثلث متساوي الساقين يكون .....

٢ إذا اختلف طولاً ضلعين في مثلث فأكبرهما في الطول تقابله .....

٣ المستقيم العمودي على القطعة المستقيمة من منتصفها يسمى .....

### السؤال الثالث

• في الشكل المقابل:

$\Delta PCH$  فيه

و.  $(\angle C) =$  و.  $(\angle H)$

أوجد: محيط  $\Delta PCH$

### السؤال الرابع

• في الشكل المقابل:

• برهن أن:



و.  $(\angle SPH) <$  و.  $(\angle MPH)$

٣

٣

٢

٢




## نموذج (٢)

### السؤال الأول

• اختر الإجابة الصحيحة:

- ١  $\Delta$   $ABC$  فيه:  $AB > AC$  فإن  $\angle C$  و  $\angle B$  ..... و  $\angle A$  و  $\angle C$  .....  
 (أ)  $>$  (ب)  $\geq$  (ج)  $<$  (د)  $=$

- ٢  $\Delta$   $ABC$  قائم الزاوية في  $B$ ،  $AB = 12$  سم، و  $\angle A = 60^\circ$  فإن طول  $BC$  = ..... سم  
 (أ) ١٢ (ب) ٦ (ج) ٤ (د) ٣



- ٣ في الشكل المقابل:  $x + y =$  .....  
 (أ)  $100^\circ$  (ب)  $140^\circ$  (ج)  $180^\circ$  (د)  $280^\circ$

### السؤال الثاني


• أكمل ما يأتي:

- ١ إذا كانت  $C \in$  لمحور تماثل  $AB$  فإن  $AC = BC$  .....  
 ٢ المثلث المتساوي الساقين الذي قياس إحدى زواياه  $60^\circ$  يكون .....  
 ٣ في  $\Delta$   $ABC$  إذا كانت  $D$  منتصف  $BC$  فإن  $AD$  يسمى .....

### السؤال الثالث

• في الشكل المقابل:

- $AB = AC$ ،  $AD \perp BC$ ،  $AD$  ينصف  $BC$  أثبت أن:  $AD$  ينصف  $\angle A$



### السؤال الرابع

- $\Delta$   $ABC$  مثلث فيه:  $AB = 6$  سم،  $AC = 8$  سم،  $BC = 7$  سم  
 رتب قياسات زوايا المثلث  $ABC$  تصاعدياً





# أولًا الجبر

## إجابة نموذج (١)

### السؤال الأول

١ {٣}

٢  $\sqrt{28}$

٣ ١

### السؤال الثاني

١  $1 - 3\sqrt{}$

٢ {٥، ٢}

٣ نق  $2 =$

### السؤال الثالث

١  $\sqrt{2} + \sqrt{5} = \frac{(\sqrt{2} + \sqrt{5})^3}{3} = \frac{\sqrt{2} + \sqrt{5}}{\sqrt{2} + \sqrt{5}} \times \frac{3}{\sqrt{2} - \sqrt{5}} = \text{ص}$

∴  $\sqrt{2} - \sqrt{5} = \text{س}$

∴ س، ص مترافقان

٢  $8 = 2(\sqrt{2} \sqrt{2}) = 2(\text{ص} - \text{س}) = 2\text{ص} + 2\text{س} - 2\text{س} = 2\text{ص} = 8 \Rightarrow \text{ص} = 4$

### السؤال الرابع

$\frac{1}{9}\sqrt{3} - \sqrt{24} - \sqrt{2} + 81\sqrt{}$

$\frac{3}{27}\sqrt{3} \times 3 - 3 \times (8 -) \sqrt{2} + 3 \times 27\sqrt{2} =$

$= 3\sqrt{2} - 3\sqrt{2} \times 2 - 3\sqrt{2} \times 3 = \text{صفر}$

## إجابة نموذج (٢)

### السؤال الأول

- ١ ٦
- ٢  $[٧, ٥]$
- ٣ ١٠ سم

### السؤال الثاني

- ١ ١٢ سم
- ٢ ٧
- ٣  $\frac{٢}{٣}$

### السؤال الثالث

$$\frac{(1 - \sqrt{3})}{(1 - \sqrt{3})} \times \frac{2}{(1 + \sqrt{3})} = \text{ص}$$

$$\therefore 1 - \sqrt{3} = \frac{(1 - \sqrt{3}) \cdot 2}{2} = \text{ص}$$

$$\therefore \text{قيمة} = \frac{\text{ص}}{\text{ص}} = \frac{(1 - \sqrt{3})(1 + \sqrt{3})}{1 + \sqrt{3} - 1 + \sqrt{3}} = \frac{1 - 3}{2} = \frac{1 - 3}{2} = \frac{-2}{2} = -1$$

### السؤال الرابع

$$\frac{1}{3}\sqrt{3} + 2\sqrt{2} - \sqrt{5}$$

$$\frac{3}{3} \times \frac{1}{3}\sqrt{3} + \frac{3 \times 9}{3 \times 9}\sqrt{2} - \frac{3 \times 25}{3 \times 25}\sqrt{5} =$$

$$\sqrt{3} + 3\sqrt{2} - 5\sqrt{5} =$$

$$= \text{صفر}$$

### إجابة نموذج (٣)

#### السؤال الأول

١ {٥، ٣}

٢  $\sqrt{18}$

٣  $\pi^{36}$

#### السؤال الثاني

١  $\sqrt{5} - 3$

٢  $] \infty, 0[$

٣  $64 \text{ سم}^3$

#### السؤال الثالث

$$\begin{aligned} &^2[\sqrt{5x-3} + \sqrt{5x+3}] = ^2(س + ص) \\ &\sqrt{5x-3} + (\sqrt{5x-3})(\sqrt{5x+3})\sqrt{2} + \sqrt{5x+3} = \\ &10 = 2 \times 2 + 6 = (5-9)\sqrt{2} + 6 = \end{aligned}$$

#### السؤال الرابع

$$\begin{aligned} &\sqrt{16x^2 - \frac{1}{x}}\sqrt{10 - 54x^2 + 50x} \\ &\sqrt{2 \times 8x^2 - 2x \frac{1}{x} - 2 \times 27x^2 + 2 \times 25x} = \\ &* \sqrt{2x^2 - 2x - 54x^2 + 50x} = \sqrt{2x^2 - 54x^2 + 50x - 2x} = \sqrt{-52x^2 + 48x} = \end{aligned}$$



# ثانيًا الهندسة

## إجابة نموذج (١)

### السؤال الأول

١ ٣

١ ٢

٣ ١

### السؤال الثاني

- ١ عموديًا على القاعدة وينصف زاوية الرأس
- ٢ زاوية أكبر في القيداس من قياس الزاوية المقابلة للضلع الآخر
- ٣ محور تماثل

### السؤال الثالث

$$\therefore \angle (ب) = \angle (ح) \text{ و } \angle (د) = \angle (هـ)$$

$$\therefore \angle ب = \angle ح$$

$$\therefore ٢ - س = ١ - س = ٣ + س$$

$$\therefore ٤ = س$$

$$\therefore \angle ح = ٩ - ٤ = ٥ \text{ سم}$$

$$\therefore \text{محيط } \triangle ب ح د = ٧ + ٥ + ٧ = ١٩ \text{ سم}$$

### السؤال الرابع

نرسم  $\overline{س د}$

في  $\triangle ب ح د$

$$\therefore \angle ب < \angle ح$$

$$\therefore \angle (١) < \angle (٢) \text{ و } \angle (٣) < \angle (٤)$$


في  $\triangle ح د س$

$$\therefore \angle ح < \angle د$$

$$\therefore \angle (٣) < \angle (٤)$$

بجمع ①، ②

$$\therefore \angle (٣) < \angle (٤) \text{ وهو المطلوب}$$



## إجابة نموذج (٢)

### السؤال الأول

١ <

٢ ٦

٣ ٢٨٠°

### السؤال الثاني

١ صفر

٢ متساوي الأضلاع

٣ متوسط

### السؤال الثالث

$$\angle P = \angle P \therefore$$

$$\therefore \angle P = \angle P \text{ (ب) } = \angle P \text{ (ج) } \quad ①$$

$$\therefore \angle P \parallel \angle P$$

$$\therefore \angle P = \angle P \text{ (ب) } = \angle P \text{ (ج) } \text{ بالتناظر}$$

$$\angle P = \angle P \text{ (ب) } = \angle P \text{ (ج) } \text{ بالتبادل}$$

$$\text{من } ① \therefore \angle P = \angle P \text{ (ب) } = \angle P \text{ (ج) }$$

$$\therefore \angle P \text{ ينصف } \angle P \text{ (ب) } \text{ وهو المطلوب}$$

### السؤال الرابع

$$\angle P > \angle P > \angle P$$

$$\therefore \text{ترتيب زوايا المثلث } \angle P \text{ تصاعدياً هو}$$

$$\therefore \angle P > \angle P > \angle P$$

### إجابة نموذج (٣)

#### السؤال الأول

١ ١٠٠°

٢ نصف

٣ ٣

#### السؤال الثاني

١ متساويين

٢ ينصف القاعدة ، وعموديًا عليها

٣ >

#### السؤال الثالث

٢ < ح < ب < ح

∴ ترتيب قياسات زوايا المثلث تنازليًا

و (ب >) < و (ح >) < و (أ >)

#### السؤال الرابع

في  $\triangle PQR$

∴ هـ ، و منتصفا  $PQ$  ،  $SR$

∴ هـ و  $PQ = \frac{1}{2} PQ$

∴  $PQ = 8$  سم

في  $\triangle PQR$  ح القائمة الزاوية في ب

∴ و (أ >  $PQ$  ح) =  $30^\circ$

∴  $PQ = \frac{1}{2} PQ$  ح

∴  $PQ = 4$  سم

مراجعة شهر نوفمبر منهج الجبر الصف الثاني الإعدادي

1

من درس الفترات: درس تطبيقات على الأعداد الحقيقية

مراجعة نظرية على الجبر

١ الفترة: هي مجموعة جزئية متصلة من الأعداد الحقيقية.

مثال:  $[٧, ٣]$  هي فترة تتكون من العددين ٣، ٧ وجميع الأعداد الحقيقية المحصورة بينهما

\* عند كتابة الفترة نبدأ بالعدد الأصغر \* الفترة مفتوحة من جهة  $-\infty$  ،  $+\infty$

الاتحاد  $\cup$  عناصر المجموعتين

التقاطع  $\cap$  العناصر المشتركة للمجموعتين

الفرق - عناصر المجموعة الأولى التي لا تنتمي للمجموعة الثانية \* المكمل  $\sim$  العناصر التي لا تنتمي  $\sim$

العمليات على الفترات

٢ ضرب مقدار ذي حدين في مقدار ذي حدين

$$= (\text{الأول} \times \text{الأول}) \pm (\text{ضرب الوسطين} + \text{ضرب الطرفين}) + (\text{الأخير} \times \text{الأخير})$$

مثال:  $(١ + \sqrt{٣})(٢ + \sqrt{٣}) = \text{الحل} = ٢ + \sqrt{٣} + ٢\sqrt{٣} + ٣ = ٥ + ٣\sqrt{٣}$

٣ مربع مقدار مكون من حدين = مربع الحد الأول  $\pm$   $٢ \times$  الأول  $\times$  الثاني + مربع الحد الأخير

مثال:  $(٢ + \sqrt{٥})^2 = \text{الحل} = ٤ + ٢\sqrt{٥} + ٥ = ٩ + ٢\sqrt{٥}$

٤ حاصل ضرب مجموع حدين  $\times$  الفرق بينهم = مربع الحد الأول - مربع الحد الثاني

مثال:  $(٣ + \sqrt{٥})(٣ - \sqrt{٥}) = \text{الحل} = ٩ - ٥ = ٤$

٥ العمليات على الجذور التربيعية

الجمع

١  $\sqrt{٧} = \sqrt{٤} + \sqrt{٣}$

الطرح

٢  $\sqrt{٢} = \sqrt{٣} - \sqrt{٥}$

الضرب

٣  $\sqrt{٢} \times \sqrt{٢} = ٢$  والعكس  $\sqrt{٢} \times \sqrt{٢} = ٢$

القسمة

٤  $\frac{\sqrt{٢}}{\sqrt{٢}} = ١$  والعكس  $\frac{\sqrt{٢}}{\sqrt{٢}} = ١$

٦ المعكوس الجمعي لعدد مكون من حدين نغير إشارة الحدين.

مثال:  $(\sqrt{٢} + \sqrt{٣}) = (\sqrt{٢} - \sqrt{٣})$  المعكوس الجمعي

٧ مرافق عدد مكون من حدين نغير إشارة أحد الحدين.

مثال:  $(\sqrt{٢} - \sqrt{٣})$  مرافق  $(\sqrt{٢} + \sqrt{٣})$  أو  $(-\sqrt{٢} - \sqrt{٣})$

٨ ضرب العددين المترافقان = مربع الأول - مربع الثاني

مثال:  $(٣ + \sqrt{٥})(٣ - \sqrt{٥}) = \text{الحل} = ٩ - ٥ = ٤$





\* لاحظ أن: العدد  $\times$  مرافقه = عدد نسبي "خالٍ من الجذر"

٩ مجموع العددين المترافقان = ضعف العدد الأول

مثال:  $(\sqrt{3} + \sqrt{5})(\sqrt{3} - \sqrt{5}) = \text{الكل} = 5 - 3 = 2$

١٠ ملحوظة: للتخلص من الجذر في المقام نضرب فوق وتحت في مرافق المقام

مثال:  $\frac{4}{(\sqrt{3} - \sqrt{7})} = \frac{4(\sqrt{3} + \sqrt{7})}{(\sqrt{3} - \sqrt{7})(\sqrt{3} + \sqrt{7})} = \frac{4(\sqrt{3} + \sqrt{7})}{3 - 7} = \frac{4(\sqrt{3} + \sqrt{7})}{-4} = -(\sqrt{3} + \sqrt{7})$

$$\sqrt{3} + \sqrt{7} = \frac{(\sqrt{3} + \sqrt{7}) \cdot 4}{4} = \frac{(\sqrt{3} + \sqrt{7}) \cdot 4}{3 - 7} = \frac{(\sqrt{3} + \sqrt{7}) \cdot 4}{(\sqrt{3} + \sqrt{7})(\sqrt{3} - \sqrt{7})} = \frac{(\sqrt{3} + \sqrt{7}) \cdot 4}{3 - 7} = \frac{(\sqrt{3} + \sqrt{7}) \cdot 4}{-4} = -(\sqrt{3} + \sqrt{7})$$

١١  $\sqrt{a} - \sqrt{b} = \sqrt{a - b}$  تذكر: إذا كان:  $a = b \times p$  أما  $a = b$  ،  $a = p$



١٢ التطبيقات: أولاً: الدائرة نصف قطرها ن:


١ محيط الدائرة  $= 2\pi n$  ٢ مساحة الدائرة  $= \pi n^2$

ثانياً: المكعب طول حرفه ل:

١ مساحة الوجه الواحد  $= ل^2$  ٢ المساحة الجانبية  $= 4ل^2$

٣ المساحة بدون غطاء  $= 5ل^2$  ٤ المساحة الكلية  $= 6ل^2$

٥ حجم المكعب  $= ل^3$  ٦ طول حرف المكعب  $= \sqrt[3]{\text{حجمه}}$




ثالثاً: متوازي المستطيلات

١ المساحة الجانبية = محيط القاعدة  $\times$  الارتفاع

٢ المساحة الكلية = المساحة الجانبية + ضعف مساحة القاعدة

٣ حجمه = مساحة القاعدة  $\times$  الارتفاع



\* محيط القاعدة =  $(\text{الطول} + \text{العرض}) \times 2$  \* مساحة القاعدة =  $\text{الطول} \times \text{العرض}$

رابعاً: الأسطوانة الدائرية ارتفاعها ع ونصف قطرها ن:

١ المساحة الجانبية للأسطوانة = محيط القاعدة  $\times$  الارتفاع

٢. الجانبية  $= 2\pi n \cdot ع$

٢ المساحة الكلية للأسطوانة = المساحة الجانبية + مساحة القاعدتين

$م = 2\pi n \cdot ع + 2\pi n^2 = 2\pi n(ع + ن)$

٣ حجم الأسطوانة = مساحة القاعدة  $\times$  الارتفاع \*  $ع = \frac{م}{2\pi n}$







خامساً: الكرة نصف قطرها ن :

٢ حجم الكرة =  $\frac{4}{3}\pi n^3$

١ مساحة الكرة =  $4\pi n^2$

أكمل ما يأتي:

١ مكعب حجمه  $3\sqrt{3}$  سم<sup>٣</sup> فإن مساحته الكلية = ..... سم<sup>٢</sup>

٢ أسطوانة دائرية قائمة حجمها =  $\pi n$  سم<sup>٣</sup> فإن ارتفاعها = ..... سم

٣  $..... = \{4, 3, 2-\} \cap [5, 2[$

٤ إذا كان:  $s \in \mathbb{R}, s^2 = v$  فإن:  $(s + \sqrt{v})^2 = .....$

٥ إذا كان:  $s = \frac{1}{1 - \sqrt{v}}$  فإن:  $(1 + \frac{1}{s})^2 = .....$

٦  $(3\sqrt{v} - 5\sqrt{v})^4 (3\sqrt{v} + 5\sqrt{v})^4 = s^2$  فإن:  $s = .....$

٧ إذا كان طول قطر وجه مكعب =  $2\sqrt{4}$  فإن حجمه = ..... سم<sup>٣</sup>

٨ مكعب مجموع أطوال أحرفه ٤٨ سم يكون حجمه = ..... سم<sup>٣</sup>

٩ إذا كان:  $s + \frac{1}{s} = 3\sqrt{4}$  فإن:  $s^2 + \frac{1}{s^2} = .....$

١٠ مجموع الأعداد الحقيقية في الفترة  $[10, 10-] = .....$

١١  $\sqrt{s} = 1 + \sqrt{v}$  فإن:  $s = .....$

١٢  $2\sqrt{v}, \sqrt{v}, \sqrt{18v}, \sqrt{33v}, .....$  أكمل بنفس التسلسل

١٣  $20\sqrt{v} \times 10 = 15\sqrt{v} \times .....$  ١٤ المعكوس الضربي للعدد  $\frac{3\sqrt{2}}{5} = .....$



١٥ مكعب حجمه يساوي ٦٤ سم<sup>٣</sup> فإن مساحته الجانبية = ..... سم<sup>٢</sup>

١٦  $\{7, 2\} - [7, 2] = \{7, 2\}$  ١٧  $\{3\} - [6, 3] = \{3\}$

١٨  $[2, 1] \cap [1, 3] = [2, 1]$  ١٩  $[2, 2] - \{0, 2\} = [2, 2]$

٢٠ المعكوس الجمعي للعدد  $2 + \sqrt[3]{2}$  ..... ٢١  $(\sqrt[3]{2} + 1)^2 = 2 + \sqrt[3]{2}$

٢٢ مرافق العدد  $\sqrt[3]{2} + \sqrt[3]{5}$  هو .....

سـ أختار الإجابة الصحيحة:

٢٣  $\{2\} - [5, 2] = \{2\}$

٢٤  $[5, 2]$  ☒  $[5, 2]$  ☒  $[5, 2]$  ☒  $[5, 2]$  ☒

٢٥  $[6, 2] \cap [4, 3] = [6, 2]$

٢٦  $[6, 3]$  ☒  $[6, 3]$  ☒  $[6, 3]$  ☒  $[6, 3]$  ☒

٢٧  $[10, 8] - \{10, 9, 8\} = [10, 8]$

٢٨  $\{10, 8\}$  ☒  $\{10, 8\}$  ☒  $\{10, 8\}$  ☒  $\{10, 8\}$  ☒

٢٩  $\{3, 2\} \cup [3, 2] = \{3, 2\}$

٣٠  $[3, 2]$  ☒  $[3, 2]$  ☒  $[3, 2]$  ☒  $[3, 2]$  ☒

٣١ المعكوس الضربي للعدد  $\frac{\sqrt{2}}{10}$  في أبسط صورة هو .....

٣٢  $\frac{\sqrt{2}}{5}$  ☒  $\frac{\sqrt{2}}{5}$  ☒  $\frac{\sqrt{2}}{5}$  ☒  $\frac{\sqrt{2}}{5}$  ☒

٣٣ متوازي مستطيلات أبعاده  $\sqrt{2}$ ،  $\sqrt{3}$ ،  $\sqrt{6}$  يكون حجمه = ..... سم<sup>٣</sup>

٣٤  $\frac{3\sqrt{2}}{6}$  ☒  $\frac{3\sqrt{2}}{6}$  ☒  $\frac{3\sqrt{2}}{6}$  ☒  $\frac{3\sqrt{2}}{6}$  ☒

٣٥  $\frac{1}{4}\sqrt{2} + \frac{1}{4}\sqrt{2} = \frac{1}{4}\sqrt{2}$

٣٦  $\frac{1}{4}\sqrt{2}$  ☒  $\frac{1}{4}\sqrt{2}$  ☒  $\frac{1}{4}\sqrt{2}$  ☒  $\frac{1}{4}\sqrt{2}$  ☒





- ٣٠ .....  $= \sqrt[7]{(3\sqrt{2}-5\sqrt{2})} \sqrt[7]{(3\sqrt{2}+5\sqrt{2})}$
- ١٤ ☐ ٤١ ☒ ١٢٥ ☐ ١٢٨ ☐
- ٣١ الدائرة التي طول قطرها ١٠ سم تكون مساحة سطحها = .....  $\pi$  سم<sup>٢</sup>
- ٥ ☐ ١٠ ☒ ٢٥ ☐ ١٠٠ ☐
- ٣٢ .....  $= \frac{10}{5\sqrt{2}} + (\sqrt{5}-1)^2$
- ٢ ☐ ٥ ☒ ٤- ☐ ٦ ☐
- ٣٣ مكعب طول حرفه ١٠ سم فإن مساحته الكلية = ..... سم<sup>٢</sup>
- ١٠٠ ☐ ٤٠٠ ☒ ٦٠٠ ☐ ١٠٠٠ ☐
- ٣٤ .....  $= ]٥,٢[ \cap \{٥,٢\}$
- ∅ ☐ [٥,٢] ☒ ]٥,٢] ☐ [٥,٢[ ☐
- ٣٥ .....  $= \sqrt[3]{\frac{4}{27}} - \sqrt[3]{\frac{2}{3}}$
- ٢ ☐ ٤ ☒ صفر ☐ ٤ ☐
- ٣٦ مكعب حجمه ٥ سم<sup>٣</sup> إذا ضوعف طول حرفه فإن حجمه = ..... سم<sup>٣</sup>
- ١٠ ☐ ٢٠ ☒ ٣٠ ☐ ٤٠ ☐

٣٧ أجب عما يأتي:

إذا كان: س = [٣,٢-] ، ص = [٥,١] باستخدام خط الأعداد أوجد:

١ س ∩ ص ٢ س ∪ ص ٣ س - ص ٤ ص - س ٥ س - ٦ ص -

الحل

.....

.....

.....

.....

.....



٣٨ إذا كان:  $S = \{ \infty, 3 \}$  ،  $V = \{ \infty \}$  ، صفّر  $\infty$  باستخدام خط الأعداد أوجد:

- ١  $S \cap V$  ٢  $S \cup V$  ٣  $S - V$  ٤  $S^-$

الحل


.....

.....

.....

.....

.....



.....

.....

.....

٤٠ أختصر:  $(1 - \sqrt{5})(1 + \sqrt{5}) - (1 + \sqrt{3})^2$

الحل

.....

.....

.....

٤١ إذا كانت:  $S = \frac{\sqrt{20} - \sqrt{12}}{2}$  ،  $V = \sqrt{5} + \sqrt{3}$  أوجد قيمة: ١  $S + V$  ٢  $S^3 V^3$

الحل

.....

.....

.....

٤٢ أختصر:  $\frac{1}{\sqrt{8}} - \frac{1}{\sqrt{4}} + \frac{1}{\sqrt{2}} + \sqrt{2}$

الحل

.....

.....

.....





٤٣ اختصر:  $\sqrt[3]{16} + \sqrt[3]{2} - \sqrt[3]{2} + \sqrt[3]{\frac{1}{2}} - \sqrt[3]{2}$

الحل

٤٤ إذا كانت:  $s = 3 - \sqrt{8}$ ،  $v = \frac{1}{\sqrt{8} - 3}$  أثبت أن  $s$ ،  $v$  مترافقان، ثم أوجد قيمة:  $s^2 + 2s + v^2 + 2v$

الحل

٤٥ إذا كانت:  $s = 2 + \sqrt{6}$ ،  $v = 2 - \sqrt{6}$  أوجد قيمة:  $\left(\frac{s-v}{s+v}\right)^3$

الحل

٤٦ أسطوانة دائرية حجمها  $40\pi$  سم<sup>٣</sup> وارتفاعها ١٠ سم. أوجد طول نصف قطرها، ومساحتها الجانبية

الحل

٤٧ إذا كانت:  $s = \frac{\sqrt[3]{1}}{3}$ ،  $v = \frac{3}{\sqrt[3]{1}}$  أوجد قيمة:  $\left(\frac{s}{v}\right)^2 + (sv)^2$

الحل





٤٨ أختصر:  $\sqrt{\frac{1}{3}} \sqrt{6} - \sqrt{50} \sqrt{2} + \sqrt{18} \sqrt{2}$

الحل

.....  
.....  
.....

٤٩ أختصر:  $\sqrt{12} \sqrt{2} + \sqrt{27} \sqrt{2} - \sqrt{50} \sqrt{2}$

الحل

.....  
.....  
.....

٥٠ أختصر:  $\sqrt{\frac{1}{5}} \sqrt{10} + \sqrt{20} \sqrt{2} + (2 - \sqrt{5}) \sqrt{5} \sqrt{2}$

الحل

.....  
.....  
.....

٥١ إذا كان:  $\frac{\sqrt{6} + \sqrt{7}}{\sqrt{6} - \sqrt{7}} = س$  أثبت أن:  $س + \frac{1}{س} = ٢٦$

الحل

.....  
.....  
.....

٥٢ أختصر:  $\sqrt[3]{٣٢} \sqrt[3]{٢} + \sqrt[3]{\frac{1}{3}} \sqrt[3]{٢} - \sqrt[3]{(٢ - \sqrt[3]{٢})^٢}$

الحل

.....  
.....  
.....

٥٣ إذا كانت:  $س = \sqrt[3]{٣} + ١$  ،  $ص = \sqrt[3]{٣} - ١$  أوجد قيمة:  $(س + ص)^٣$

الحل

.....  
.....  
.....



٥٤ إذا كانت:  $s = \sqrt{5} + \sqrt{3}$  ،  $s = \sqrt{2}$  أثبت أن  $s$ ،  $v$  عدنان مترافقان ، ثم أوجد قيمة:  $s^2 - v^2$

الحل

.....

.....

.....

.....

٥٥ دائرة مساحتها  $64\pi$  سم<sup>٢</sup> أوجد محيطها بدلالة  $\pi$  ؟

الحل

.....

.....

.....

.....

٥٦ أسطوانة دائرية قائمة حجمها  $250\pi$  سم<sup>٣</sup> وارتفاعها ١٠ سم أوجد طول قطر قاعدتها

الحل

.....

.....

.....

.....

٥٧ كرة من المعدن طول نصف قطرها ٣ سم صهرت وحولت إلى أسطوانة طول نصف قطر قاعدتها ٣ سم

احسب ارتفاع الأسطوانة.

الحل

.....

.....

.....

.....

٥٨ متوازي مستطيلات قاعدته مربعة الشكل، فإذا كان حجمه ٧٢٠ سم<sup>٣</sup> وأرتفاعه ٥ سم فأوجد مساحته الجانبية

الحل

.....

.....

.....

.....



## مراجعة شهر نوفمبر منهج الهندسة الصف الثاني الإعدادي

2

## مراجعة نظرية على الهندسة

من درس نظريات المثلث المتساوي الساقين: درس المقارنة بين قياسات الزوايا في المثلث

١ في المثلث المتساوي الساقين: زاويتي القاعدة متطابقتان

٢ في المثلث المتساوي الأضلاع: جميع زواياه الداخلة متطابقة وقياس كل منها  $60^\circ$ 

٣ قياس أي زاوية خارجة للمثلث تساوي مجموع قياسي الزاويتين الداخلتين ماعدا المجاورة لها

٤ قياس الزاوية الخارجة عن مثلث متساوي الأضلاع  $120^\circ$ 

٥ يكون المثلث متساوي الساقين إذا تطابق فيه أي زاويتين

٦ يكون المثلث متساوي الأضلاع إذا تطابقت جميع زواياه الداخلة

٧ نتائج المثلث المتساوي الساقين:

١ المستقيم المار برأس  $\Delta$  المتساوي الساقين وينصف زاوية الرأس يكون عمودي على القاعدة وينصفها٢ المستقيم المار برأس  $\Delta$  المتساوي الساقين وعمودي على القاعدة يكون منصف لزاوية الرأس

ومنصف للقاعدة

٣ المستقيم المار برأس  $\Delta$  المتساوي الساقين ومنصف للقاعدة يكون عمودي على القاعدة

وينصف زاوية الرأس

٤ محور تماثل  $\Delta$  المتساوي الساقين هو مستقيم مرسوم من رأسه عمودياً على قاعدته .

٥ محور تماثل القطعة المستقيمة : هو مستقيم عمودي عليها من منتصفها

٦ أي نقطة على محور تماثل القطعة المستقيمة تكون على بُعدين متساويين من طرفيها

٧ أي نقطة على بُعدين متساويين من طرفي القطعة المستقيمة تنتمي لمستقيم واحد هو محور تماثل

القطعة المستقيمة

٨ تذكر: محاور تماثل بعض الأشكال الهندسية

عدد المحاور	أمثلة لها
صفر	$\Delta$ مختلف الأضلاع + متوازي الأضلاع + شبه المنحرف + الشعاع
١	$\Delta$ المتساوي الساقين + شبه المنحرف المتساوي الساقين + القطعة + جزء من الدائرة
٢	المعين + المستطيل + الشكل البيضاوي
٣	المثلث المتساوي الأضلاع
٤	المربع
عدد لا نهائي	الدائرة + المستقيم

الوحدة الخامسة: التباين

٩١ قياس الزاوية الخارجة عند رأس من رؤوس المثلث أكبر من قياس أي زاوية داخلية للمثلث  
عدا المجاورة لها

٩٢ إذا اختلف طولاً ضلعين في مثلث فأكبرهما في الطول تقابله زاوية أكبر في القياس من قياس  
الزاوية المقابلة للضلع الآخر.

٩٣ في أي مثلث:

زاوية أكبر من زاوية

ضلع أكبر من ضلع

١ أكبر الأضلاع طولاً تقابله أكبر الزوايا قياساً

٢ أصغر الأضلاع طولاً تقابله أصغر الزوايا قياساً

٣ إذا وجدت في مثلث زاوية قياسها أكبر من مجموع قياسي الزاويتين الأخريين فإن هذه الزاوية تكون منفرجة

أكمل ما يأتي:

١١ محور تماثل المثلث المتساوي الساقين هو .....

١٢ أي نقطة على محور تماثل القطعة المستقيمة تكون .....

١٣ منتصف زاوية الرأس في المثلث المتساوي الساقين ينصف ..... ويكون عمودي على القاعدة.

١٤ متوسط المثلث المتساوي الساقين المرسوم من الرأس ..... ، .....

١٥ المستقيم المرسوم من رأس المثلث المتساوي الساقين وعمودي على القاعدة ..... ، .....

١٦ في المثلث  $ABC$  إذا كان:  $\angle A = 40^\circ$ ،  $\angle B = 70^\circ$  فإن عدد محاور تماثله = .....

١٧ إذا كان:  $\overline{AB} \perp \overline{CD}$  محور تماثل  $AB$ ،  $\overline{CD} \supseteq P$  فإن:  $AP = CP$  .....

١٨ إذا كان:  $\overline{AB} \perp \overline{CD}$  وينصفها فإن  $\overline{AP}$  يسمى .....  $CD$





٩ عدد متوسطات المثلث المتساوي الساقين = .....

١٠ مثلث قائم طولاً ضلعيه ٦ سم ، ٨ سم فإن عدد محاور تماثله = .....

١١ عدد محاور تماثل  $\Delta$   $ABC$  الذي فيه  $AB=AC$  ،  $\angle C = 60^\circ$  هو .....

١٢ إذا كان:  $S < C$  ،  $C > S$  فإن:  $S$  .....  $C$

١٣ قياس الزاوية الخارجة عند رأس من رؤوس المثلث ..... قياس أي زاوية داخلية للمثلث عدا المجاورة لها

١٤ إذا اختلف طولاً ضلعين في مثلث فأكبرهما في الطول تقابله زاوية .....

١٥ من الشكل:  $S < C$  و  $C > S$  فإن:  $S$  .....  $C$

سـ اختر الإجابة الصحيحة:

١٦ إذا كان:  $S \supseteq$  لمحور تماثل  $ABC$  فإن:  $S \supseteq$  .....  $ABC$

١٧ عدد محاور تماثل المثلث الذي قياس زاويتين فيه  $50^\circ$  ،  $60^\circ$  يساوي .....

١٨ محور تماثل القطعة المستقيمة هو المستقيم .....

١٩ مثلث متساوي الساقين إحدى زواياه قياسها  $60^\circ$  فإن عدد محاور تماثله = .....

٢٠ إذا كان قياس زاويتين في مثلث  $55^\circ$  ،  $70^\circ$  فإن عدد محاور تماثله = .....



٢١  $\Delta$  ب ح له محور تماثل واحد ، و  $(\Delta \text{ ب ح}) = 120^\circ$  فإن: و  $(\Delta \text{ ب ح}) = \dots\dots\dots^\circ$

٢ ☐ ٦٠ ☒ ١٢٠ ☐ ٣٠ ☐ ٤٠ ☐ ٥٠

٢٢ إذا كان: س  $\supset$  لمحور تماثل  $\overline{\text{ب ح}}$  فإن: س م ..... س ب

٢ ☐ < ☒ = ☐ > ☐ ☐ =

٢٣  $\Delta$  ب ح قائم الزاوية في ب ، و  $(\Delta \text{ ب ح}) = 55^\circ$  فإن عدد محاور تماثله = .....

٢ ☐ ١ ☒ ٢ ☐ ٣ ☐ ٤ ☐ صفر

٢٤ إذا كان: س < ص فإن: س + ع ..... ص + ع

٢ ☐ = ☒ > ☐ < ☐ =

٢٥ إذا كان: س < ص فإن: س  $\times$  ع ..... ص  $\times$  ع حيث ع سالبة

٢ ☐ < ☒ = ☐ > ☐ =

٢٦ إذا كان: س < ص ، ع < ل فإن: س + ع ..... ص + ل

٢ ☐ = ☒ > ☐ < ☐ =

٢٧ إذا كان: س + ص = ع + ل ، س < ع فإن: ص ..... ل

٢ ☐ = ☒ < ☐ > ☐ =

٢٨ إذا كان: و  $(\Delta \text{ ب ح}) < (\Delta \text{ د ح})$  فإن: متممة  $\Delta$  ..... متممة  $\Delta$  ب

٢ ☐ > ☒ < ☐ = ☐ =

٢٩ من الشكل:  $\Delta$  ب ح < س د فإن:  $\Delta$  ب ح .....  $\Delta$  س د


٢ ☐ = ☒ ☐ < ☐ > ☐ =



٣٠  $\Delta$  ب ح ، و  $(\Delta \text{ ب ح}) < (\Delta \text{ د ح}) + (\Delta \text{ ح ع})$  فإن:  $(\Delta \text{ ب ح})$  تكون .....

٢ ☐ حادة ☒ قائمة ☐ مستقيمة ☐ منفرجة

سأجب عما يأتي:



٢١ في الشكل المقابل:  $AP = BP$ ،  $AP$  ينصف  $BC$ ،  $AP \perp BC$ ،  $AB = AC$

أوجد بالبرهان طول  $AP$

البرهان

٢٢ في الشكل المقابل:  $AP = BP$ ،  $AP$  ينصف  $BC$ ،  $AP \perp BC$ ،  $AB = AC$

برهن أن:  $AP \perp BC$

البرهان

٢٣ في الشكل المقابل:  $AP = BP$ ،  $AP$  ينصف  $BC$ ،  $AP \perp BC$ ،  $AB = AC$

أوجد بالبرهان طول  $AP$ ،  $AP$

البرهان

٢٤ في الشكل المقابل:  $AP = BP$ ،  $AP$  ينصف  $BC$ ،  $AP \perp BC$ ،  $AB = AC$

برهن بدون استخدام التطابق أن:  $AP \perp BC$


البرهان



٢٥ من الشكل المقابل:  $SP = PS$  ،  $SP \perp SC$  ، و  $(\angle SPB) = 20^\circ$  ،  $SC = CS$  سم

أوجد ١ و  $(\angle PSB)$  ٢ طول  $SC$


البرهان



٢٦ من الشكل المقابل:  $SP = PS$  ،  $CB = BC$  ،  $C$  منتصف  $SC$

أثبت أن:  $P$  ،  $C$  ،  $H$  على استقامه واحدة


البرهان



٢٧ في الشكل المقابل:  $SP \perp SC$  ،  $SC = CS$  ، و  $(\angle SCB) = 50^\circ$

١ برهن أن:  $SP = PS$  ٢ أوجد و  $(\angle SCB)$


البرهان



٢٨ من الشكل المقابل:  $SP \perp SC$  وينصفه ، و  $(\angle SPB) = 30^\circ$

أثبت أن:  $\triangle PSB$  متساوي الأضلاع


البرهان



٢٦ في الشكل المقابل:  $\overline{SP} \parallel \overline{SC}$ ،  $\overline{SC}$  ينصف  $\angle PSC$ ،  $\overline{SP}$  ينصف  $\angle SPC$

برهن أن  $\overline{SC}$  محور تماثل  $\triangle SPC$

البرهان




.....  
 .....  
 .....  
 .....  
 .....

٢٧ في الشكل المقابل:  $\overline{SC} = \overline{SP}$ ،  $\overline{SC} = \overline{SP}$

برهن أن: ١  $\overline{SC}$  محور تماثل  $\triangle SPC$  ٢  $\angle S = \angle C$

البرهان




.....  
 .....  
 .....  
 .....  
 .....

٢٨ في الشكل المقابل:  $\overline{SC} = \overline{SP}$ ،  $\overline{SC}$  ينصف  $\angle PSC$ ،  $\overline{SC}$  ينصف  $\angle SPC$

برهن أن  $\overline{SC}$  محور تماثل  $\triangle SPC$

البرهان




.....  
 .....  
 .....  
 .....  
 .....

٢٩ في الشكل المقابل:  $\angle (SC, P) < \angle (SC, C)$ ،  $\overline{SC} = \overline{SP}$


برهن أن:  $\angle (SC, P) < \angle (SC, C)$

البرهان




.....  
 .....  
 .....  
 .....  
 .....






٢٦ في الشكل المقابل:  $AP = BP$  ، و  $(\angle PAB) < (\angle PBA)$  ، و  $(\angle PBA) < (\angle PAB)$  برهن أن: و  $(\angle PBA) < (\angle PAB)$

البرهان



٢٧ في الشكل المقابل:  $AP < BP$  ، و  $BP < AP$  برهن أن:  $AP < BP$

البرهان



٢٨ في الشكل المقابل: و  $(\angle PAB) < (\angle PBA)$  ، و  $AP = BP$  برهن أن:  $(\angle PBA) < (\angle PAB)$  منفرجة

البرهان





خامساً: الكرة نصف قطرها ن:

$$\boxed{2} \text{ حجم الكرة } = \frac{4}{3}\pi n^3$$

$$\boxed{1} \text{ مساحة الكرة } = 4\pi n^2$$

سـ أكمل ما يأتي:

$$\boxed{1} \text{ مكعب حجمه } 3\sqrt{3} \text{ سم}^3 \text{ فإن مساحته الكلية } = 18 \text{ سم}^2$$

$$\boxed{2} \text{ أسطوانة دائرية قائمة حجمها } = \pi n^2 \text{ سم}^3 \text{ فإن ارتفاعها } = \frac{1}{\pi} \text{ سم}$$

$$\boxed{3} [5, 2] \cap \{-4, 3, 2, -\} = \{3, -4\}$$

$$\boxed{4} \text{ إذا كان: } s \in \mathbb{R}, s^2 = 7 \text{ فإن: } (s + \sqrt{7})^2 = \text{صفر}$$

$$\boxed{5} \text{ إذا كان: } s = \frac{1}{1 - \sqrt{2}} \text{ فإن: } (1 + \frac{1}{s})^2 = 2$$

$$\boxed{6} (\sqrt{3} - \sqrt{5})^4 (\sqrt{3} + \sqrt{5})^4 = s^2 \text{ فإن: } s = 6$$

$$\boxed{7} \text{ إذا كان طول قطر وجه مكعب } = 2\sqrt{2} \text{ فإن حجمه } = 7.4 \text{ سم}^3$$

$$\boxed{8} \text{ مكعب مجموع أطوال أحرفه } 48 \text{ سم يكون حجمه } = 7.4 \text{ سم}^3$$

$$\boxed{9} \text{ إذا كان: } s + \frac{1}{s} = \sqrt[3]{4} \text{ فإن: } s^2 + \frac{1}{s^2} = 6.7$$

$$\boxed{10} \text{ مجموع الأعداد الحقيقية في الفترة } [-10, 10] = \text{صفر}$$

$$\boxed{11} \sqrt{s} = \sqrt{2} + 1 \text{ فإن: } s = \sqrt{2} + 3$$

$$\boxed{12} \sqrt{2}, \sqrt{8}, \sqrt{18}, \sqrt{32}, \dots \text{ أكمل بنفس التسلسل } 50$$

$$\boxed{13} \sqrt[3]{2} \times 10 = \sqrt[3]{20} \times \sqrt[3]{10} \quad \boxed{14} \text{ المعكوس الضربي للعدد } \frac{3\sqrt{5}}{7} = \frac{\sqrt[3]{2}}{5}$$

١٥ مكعب حجمه يساوي ٦٤ سم<sup>٣</sup> فإن مساحة الجانبية = ٦٤... سم<sup>٢</sup>

١٧  $[6, 3] = \{3\} - [6, 3]$

١٦  $[7, 2] = \{7, 2\} - [7, 2]$

١٩  $\emptyset = ]2, 2[ - \{0, 2\}$

١٨  $[1, 1] = [2, 1] \cap ]1, 3[$

٢١  $\sqrt[3]{2} + 4 = (3 + 1)^2$

٢٠ المعكوس الجمعي للعدد  $2 + \sqrt[3]{2}$  هو  $2 - \sqrt[3]{2}$

٢٢ مرافق العدد  $\sqrt[3]{2} + 5$  هو  $5 - \sqrt[3]{2}$

سـ اختر الإجابة الصحيحة:

٢٣  $\{2\} - [0, 2] = \dots$

☐  $]0, 2[$

☐  $]0, 2[$

☒  $[0, 2[$

☐  $]0, 2[$

٢٤  $[6, 2] \cap [4, 3] = \dots$

☐  $[4, 2]$

☐  $[6, 4]$

☒  $[2, 3]$

☐  $[6, 3]$

٢٥  $]10, 8[ - \{10, 9, 8\} = \dots$

☐ ط

☐  $\{9\}$

☒  $\emptyset$

☐  $\{10, 8\}$

٢٦  $\{3, 2\} \cup ]3, 2[ = \dots$

☐  $[3, 2]$

☐  $\{3, 2\}$

☒  $[3, 2[$

☐  $]3, 2[$

٢٧ المعكوس الضربي للعدد  $\frac{\sqrt{2}}{10}$  في أبسط صورة هو  $\dots$

☐  $\frac{\sqrt{2}}{0}$

☐  $\sqrt{2}$

☒  $10 - \sqrt{2}$

☐  $2\sqrt{5}$

٢٨ متوازي مستطيلات أبعاده  $\sqrt{2}$ ،  $\sqrt{3}$ ،  $\sqrt{6}$  يكون حجمه  $\dots$  سم<sup>٣</sup>

☐  $125\sqrt{2}$

☐  $40\sqrt{2}$

☒  $\frac{3\sqrt{2}}{6}$

☐ ٦

٢٩  $\dots = \frac{1}{4}\sqrt{2} + \frac{1}{4}\sqrt{2}$

☐  $\frac{1}{4}\sqrt{2}$

☐  $\sqrt{2}$

☒  $\sqrt{2}$

☐ ١





٣٠  $\sqrt[3]{(3\sqrt{2}-5\sqrt{2})^3(3\sqrt{2}+5\sqrt{2})^3} = \dots\dots\dots$

☐ ١٤ ☒ ٤١ ☐ ١٢٥ ☐ ١٢٨

٣١ الدائرة التي طول قطرها ١٠ سم تكون مساحة سطحها  $\pi$  سم<sup>٢</sup>  $\dots\dots\dots$

☐ ٥ ☒ ١٠ ☐ ٢٥ ☐ ١٠٠

٣٢  $\dots\dots\dots = \frac{10}{5\sqrt{2}} + (5\sqrt{2}-1)^2$

☐ ٢ ☒ ٥ ☐ ٤- ☐ ٦

٣٣ مكعب طول حرفه ١٠ سم فإن مساحته الكلية  $\dots\dots\dots$  سم<sup>٢</sup>

☐ ١٠٠ ☒ ٤٠٠ ☐ ٦٠٠ ☐ ١٠٠٠

٣٤  $\dots\dots\dots = ]٥,٢[ \cap \{٥,٢\}$

☐  $\emptyset$  ☒  $]٥,٢[$  ☐  $]٥,٢]$  ☐  $[٥,٢[$

٣٥  $\dots\dots\dots = \sqrt[3]{4} - \sqrt[3]{(2-\sqrt{2})^3}$

☐  $\sqrt[3]{2}$  ☒  $\sqrt[3]{4}$  ☐ صفر ☐  $\sqrt[3]{2}$

٣٦ مكعب حجمه ٥ سم<sup>٣</sup> إذا ضوعف طول حرفه فإن حجمه  $\dots\dots\dots$  سم<sup>٣</sup>

☐ ١٠ ☒ ٢٠ ☐ ٣٠ ☐ ٤٠

٣٧ أجب عما يأتي:

إذا كان: س =  $[-٣, ٢]$  ، ص =  $]٥, ١[$  باستخدام خط الأعداد أوجد:

١ س  $\cap$  ص   ٢ س  $\cup$  ص   ٣ س - ص   ٤ ص - س   ٥ س<sup>-</sup>   ٦ ص<sup>-</sup>

الحل


.....

.....

.....

.....

.....



$$[1 \ 2 \ 3] = 20 \text{ وحدة}$$

$$[4 \ 5 \ 6] = 20 \text{ وحدة}$$

$$[7 \ 8 \ 9] = 20 \text{ وحدة}$$

$$[10 \ 11 \ 12] = 20 \text{ وحدة}$$

$$[13 \ 14 \ 15] = 20 \text{ وحدة}$$

$$[16 \ 17 \ 18] = 20 \text{ وحدة}$$





$$] \sup, \infty - [ = \sup < \infty \rightarrow \boxed{1}$$



$$\emptyset = \sup \cap \infty \rightarrow \boxed{1}$$

$$] \sup, \infty - [ \cup ] \infty, \sup [ = \sup \cup \infty \rightarrow \boxed{2}$$

$$] \sup, \infty - [ - \emptyset = \emptyset \rightarrow \boxed{3}$$

$$] \infty, \sup [ = \sup - \infty \rightarrow \boxed{4}$$

$$] \sup, \infty - [ \cap \emptyset = \emptyset \rightarrow \boxed{5}$$



$$\emptyset = \{ \} \quad (1)$$

$$\{ \emptyset \} \subset \{ \emptyset \} = \{ \emptyset \} \quad (2)$$

$$\{ \emptyset \} \subset \{ \emptyset \}$$

$$\{ \emptyset \} - \emptyset = \{ \emptyset \} \quad (3)$$

$$\{ \emptyset \} \subset \{ \emptyset \} = \{ \emptyset \} \quad (4)$$





$$(23) \quad \sqrt[3]{\frac{1}{2}} \sqrt[3]{14} - \sqrt[3]{\frac{1}{2}} \sqrt[3]{2} + \sqrt[3]{\frac{1}{2}} \sqrt[3]{14}$$

$$= \sqrt[3]{\frac{1}{2} \times 14} + \sqrt[3]{\frac{1}{2} \times 2} - \sqrt[3]{\frac{1}{2} \times 14} =$$

$$= \sqrt[3]{7} + \sqrt[3]{1} - \sqrt[3]{7} =$$

$$\sqrt[3]{1} = 1$$

$$(24) \quad \sqrt[3]{\frac{1}{2}} \sqrt[3]{14} + \sqrt[3]{\frac{1}{2}} \sqrt[3]{2} - \sqrt[3]{\frac{1}{2}} \sqrt[3]{14}$$

$$= \sqrt[3]{\frac{1}{2} \times 14} + \sqrt[3]{\frac{1}{2} \times 2} - \sqrt[3]{\frac{1}{2} \times 14} =$$

$$= \sqrt[3]{7} + \sqrt[3]{1} - \sqrt[3]{7} =$$

$$= \sqrt[3]{1} = 1$$



$$\sqrt{1} - 3 = 0 \quad (42)$$

$$\frac{\sqrt{1} + 3}{\sqrt{1} + 3} \cdot \frac{1}{\sqrt{1} - 3} = 0$$

$$\sqrt{1} + 3 = \frac{\sqrt{1} + 3}{1 - 9} =$$

$$\sqrt{1} + 3 = 0 \quad \sqrt{1} - 3 = 0$$

$$\sqrt{1} + 3 = 0 \quad \sqrt{1} - 3 = 0$$

$$\sqrt{1} + 3 = 0 \quad \sqrt{1} - 3 = 0$$

$$(\sqrt{1} + 3) =$$

$$(\sqrt{1} + 3 + \sqrt{1} - 3) =$$

$$2\sqrt{1} = 2(1) =$$

#



$$\sqrt{12} - 2 = \sqrt{12} - 2 \quad \sqrt{12} - 2 = \sqrt{12} - 2$$

$$\left( \frac{\sqrt{12} - 2}{\sqrt{12} + 2} \right)$$

$$\left( \frac{\sqrt{12} + 2 - \sqrt{12} + 2}{\sqrt{12} - 2 + \sqrt{12} + 2} \right) =$$

$$\left( \frac{\sqrt{12} \cdot 2}{2} \right) =$$

$$\frac{12}{2} = \frac{24}{2} = \frac{2 \times 12}{2} =$$

$$\sqrt{12} \cdot 2 = \sqrt{12} \cdot 2$$

$$\sqrt{12} \cdot 2 = \sqrt{12} \cdot 2$$

$$\sqrt{12} = \frac{\sqrt{12} \cdot 2}{\sqrt{12} \cdot 2} = \sqrt{12}$$

$$\sqrt{12} = \sqrt{12}$$

$$\sqrt{12} = \sqrt{12}$$



1- مع كاسية = 3.14159

$$1.414 \times 2.236 =$$

$$3.162 = \sqrt{10}$$

$$(2.236) \times 1.414 = 3.162$$

$$\sqrt{2} = 1.414 \quad \sqrt{5} = 2.236 \quad \sqrt{10} = 3.162$$

$$(\sqrt{2}) + (\sqrt{5}) =$$

$$1.414 + 2.236 = 3.65$$

$$1 + \frac{1}{6} = \frac{7}{6}$$



$$\frac{1}{2}\sqrt{7} - \sqrt{5} + \sqrt{11} \quad (28)$$

$$\frac{1}{2}\sqrt{7} - \sqrt{5} + \sqrt{11} =$$

$$\sqrt{11} - \sqrt{5} + \sqrt{7} =$$

$$\sqrt{7} - \sqrt{5} + \sqrt{11} =$$

$$\sqrt{5} =$$

#

$$\sqrt{11} + \sqrt{5} - \sqrt{7} \quad (29)$$

$$\sqrt{7} = \sqrt{11} + \sqrt{5} - \sqrt{7} =$$

#

$$\frac{1}{2}\sqrt{11} + \sqrt{5} + (1 - \sqrt{5})\sqrt{7} \quad (30)$$

$$\frac{1}{2}\sqrt{11} + \sqrt{5} + \sqrt{7} - \sqrt{5}\sqrt{7} =$$

$$\sqrt{7} + \sqrt{5} + \frac{1}{2}\sqrt{11} - 1 =$$

$$1 =$$

#

#



$$\frac{\sqrt{2} + \sqrt{3}}{\sqrt{2} + \sqrt{3}} \times \frac{\sqrt{2} + \sqrt{3}}{\sqrt{2} - \sqrt{3}} = \dots \quad (15)$$

$$\frac{\sqrt{2} + \sqrt{3}}{\sqrt{2} + \sqrt{3}} = \frac{2 + \sqrt{2}\sqrt{3} + \sqrt{3}\sqrt{2} + 3}{2 - 3} =$$

$$\frac{\sqrt{2} - \sqrt{3}}{\sqrt{2} - \sqrt{3}} \times \frac{\sqrt{2} + \sqrt{3}}{\sqrt{2} + \sqrt{3}} = \frac{1}{5}$$

$$\frac{\sqrt{2} - \sqrt{3}}{\sqrt{2} - \sqrt{3}} = \frac{2 + \sqrt{2}\sqrt{3} - \sqrt{3}\sqrt{2} - 3}{2 - 3} =$$

$$\sqrt{2} - \sqrt{3} + \sqrt{2} + \sqrt{3} = \frac{1}{5} + 0 \quad \therefore$$

$$\boxed{\sqrt{2} = \frac{1}{5} + \sqrt{3}} \quad \therefore$$

$$(15) \quad \sqrt{2} + \sqrt{3} - \frac{1}{5} - \sqrt{3} = \sqrt{2} - \frac{1}{5}$$

$$\sqrt{2} + \sqrt{3} - \frac{1}{5} - \sqrt{3} = \sqrt{2} - \frac{1}{5}$$

$$\sqrt{2} + \sqrt{3} - \sqrt{3} = \sqrt{2}$$

$$\boxed{\sqrt{2} = \frac{1}{5}}$$



$$1 - \sqrt{1 - \frac{c^2}{v^2}} = \frac{1}{\gamma} \quad (24)$$

$$\gamma (1 - \frac{c^2}{v^2}) = 1$$

$$\gamma (1 - \frac{c^2}{v^2}) = 1$$

$$\gamma \times 1 = \gamma (1 - \frac{c^2}{v^2}) =$$

$$\cancel{\gamma} \times 1 = \cancel{\gamma} =$$

$$1 - \frac{c^2}{v^2} = \frac{1}{\gamma^2} \quad (25)$$

$$\frac{c^2}{v^2} = 1 - \frac{1}{\gamma^2}$$

$$\frac{v^2 - c^2}{v^2} \times \frac{c^2}{v^2} = \frac{c^2}{v^2} \left( 1 - \frac{1}{\gamma^2} \right)$$

$$\frac{(v^2 - c^2)c^2}{v^2} = \frac{c^2}{\gamma^2}$$

$$v^2 - c^2 = \frac{v^2}{\gamma^2}$$

$$v^2 - c^2 = \frac{v^2}{\gamma^2}$$



تابع (٥٦) م - م

$$(10 - 1) (1 + 1) =$$

$$(10 - 1) (1 + 1) =$$

$$10 \times 1 = 10$$

$$10 \times 1 = 10$$

$$10 \times 1 = 10$$

$$10 \times 1 = 10$$

$$10 \times 1 = 10$$

$$10 \times 1 = 10$$

$$10 \times 1 = 10$$



التاريخ:

٥٥

١١/١٢/٢٠٢٢

١١/١٢/٢٠٢٢

١١/١٢/٢٠٢٢

١١/١٢/٢٠٢٢

١١/١٢/٢٠٢٢

١١/١٢/٢٠٢٢

١١/١٢/٢٠٢٢



(٥٧) حجم  $\lambda_1$  - مؤاثره = حجم الكرن

$$\lambda_1 \times \frac{\sqrt{3}}{2} = \lambda_2 \times \frac{\sqrt{3}}{2}$$

$$\lambda_1 \times \frac{\sqrt{3}}{2} = \lambda_2 \times \frac{\sqrt{3}}{2}$$

$$\therefore \lambda_1 = \lambda_2$$

$$\lambda_1 = \lambda_2 = \lambda$$

$$\lambda_1 = \lambda_2 = \lambda$$



(5n)

الجميع = مساحة الأرض × العرض

$$\text{مساحة الأرض} = \frac{\text{الجميع}}{\text{العرض}}$$

$$\text{مساحة الأرض} = \frac{70}{0} = 140 \rightarrow$$

الطائر هو مربع

$$\therefore \text{الطول} = \text{العرض} = 140$$

$$\text{الطول} = \text{العرض} = 10 \rightarrow$$

$$\text{المساحة الكلية} = 2 \times (10 + 10) \times 10$$

$$= 2 \times (10 + 10) \times 10$$

$$= 2 \times 20 \times 10$$

$$= 400 \rightarrow$$

## الدرس السابع : العمليات على الأعداد الحقيقية

أولاً : جمع الأعداد الحقيقية :

تمهيد : نعلم أن :

(١)  $٣$  س ،  $٤$  س حدان جبريان متشابهان

مجموعهما هو حد جبري مشابه لهما

أي :  $٣$  س +  $٤$  س =  $(٣ + ٤)$  س =  $٧$  س

بالمثل يمكن استنتاج أن :

$$\sqrt[٢]{٧} = \sqrt[٢]{(٣ + ٤)} = \sqrt[٢]{٣} + \sqrt[٢]{٤}$$

لاحظ أن :

العدد الحقيقي  $\sqrt[٢]{٣}$  ينتج من حاصل ضرب العدد النسبي  $٣$ في العدد غير النسبي  $\sqrt[٢]{١}$ (٢)  $٣$  س ،  $٤$  ص حدان جبريان غير متشابهينمجموعهما هو مقدار جبري أبسط صورة له هي :  $٣$  س +  $٤$  صبالمثل : العددان الحقيقيين  $\sqrt[٢]{٣}$  ،  $\sqrt[٢]{٤}$  مجموعهما هوعد حقيقي أبسط صورة له هي :  $\sqrt[٢]{٣} + \sqrt[٢]{٤}$ 

(١) أوجد ناتج :

$$[١] \quad \dots = \sqrt[٥]{٥} + \sqrt[٥]{٤} - \sqrt[٥]{٣}$$

$$[٢] \quad \dots = \sqrt[٣]{٢} - \sqrt[٢]{٥} + \sqrt[٢]{١} - \sqrt[٣]{١}$$

خواص جمع الأعداد الحقيقية :

[١] الانغلاق :

إذا كان :  $٢$  ،  $١$  ،  $٣$  يكون :  $(١ + ٢) \in \mathbb{R}$ 

أي أن : مجموع أي عددين حقيقيين هو عدد حقيقي

وبالتالي :  $\mathbb{R}$  مغلقة تحت عملية الجمع

فمثلاً :

ناتج جمع كل من  $٣ + ٤$  ،  $\sqrt[٢]{٧}$  هو عدد حقيقي

[٢] الإبدال :

إذا كان :  $٢$  ،  $١$  ،  $٣$  فإن :  $١ + ٢ = ٢ + ١$ أي أن : عملية الجمع إبدالية في  $\mathbb{R}$ 

فمثلاً :

$$\sqrt[٢]{٧} + ٧ = \sqrt[٢]{٧} + ٧$$

[٣] الدمج :

إذا كان :  $٢$  ،  $١$  ،  $٣$  ،  $٤$  يكون :

$$(١ + ٢) + ٣ = (١ + ٢) + ٣ = ١ + (٢ + ٣)$$

فمثلاً :

$$\text{الدمج} \quad (٤ + \sqrt[٢]{٧}) + ٣ = ٤ + (\sqrt[٢]{٧} + ٣)$$

$$\text{الإبدال} \quad (\sqrt[٢]{٧} + ٤) + ٣ =$$

$$\text{الدمج} \quad \sqrt[٢]{٧} + (٤ + ٣) =$$

$$\sqrt[٢]{٧} + ٧ =$$

[٤] العنصر المحايد الجمعي :

الصفر هو المحايد الجمعي في  $\mathbb{R}$  لأن :  $١ = ١ + ٠ = ٠ + ١$ 

أحمد الشنتوري



فمثلاً :

$$\sqrt[3]{3} = \sqrt[3]{3} + 0 = 0 + \sqrt[3]{3}$$

[٥] وجود معكوس جمعي لكل عد حقيقي :

لكل  $p \in \mathbb{R}$  يوجد  $(-p) \in \mathbb{R}$  حيث :  
 $p + (-p) = 0$  ( صفر ) ( المحايد الجمعي )

فمثلاً :

المعكوس الجمعي للعدد  $\sqrt[3]{3}$  هو :  $-\sqrt[3]{3}$  و العكس صحيح

$$0 = (\sqrt[3]{3} -) + \sqrt[3]{3}$$

ملاحظات :

(١) المعكوس الجمعي للعدد :  $3 + \sqrt[3]{2}$  هو :

$$-(3 + \sqrt[3]{2}) = -3 - \sqrt[3]{2}$$

(٢) المعكوس الجمعي للعدد :  $3 - \sqrt[3]{2}$  هو :

$$-(3 - \sqrt[3]{2}) = -3 + \sqrt[3]{2}$$

(٣) المعكوس الجمعي للعدد صفر هو نفسه

ثانياً : طرح الأعداد الحقيقية :

حيث أن لكل عدد حقيقي معكوس جمعي فإن عملية الطرح ممكنة دائماً  
 في  $\mathbb{R}$  و تعرف كما يلي :

لكل  $p, b \in \mathbb{R}$  يكون :  $p - b = p + (-b)$  أي أن :  
 عملية الطرح  $(p - b)$  تعني جمع  $p$  مع المعكوس الجمعي للعدد  $b$   
 و يلاحظ أن :

عملية الطرح في  $\mathbb{R}$  ليست إبدالية و ليست دامجة

(٢) أكمل ما يلي :

$$[1] \quad \dots = \sqrt[3]{7} + \sqrt[3]{7}$$

$$[2] \quad \dots + 4 = 4 + \sqrt[3]{3}$$

$$[3] \quad \dots = (\sqrt[3]{0} -) + \sqrt[3]{0}$$

$$[4] \quad (\sqrt[3]{11} + \dots) + 4 = \sqrt[3]{11} + 6$$

$$[5] \quad \dots = \sqrt[3]{9} 4 - \sqrt[3]{9} 8$$

$$[6] \quad \dots = \sqrt[3]{2} 2 + \sqrt[3]{2} 3 - \sqrt[3]{2} 3 - \sqrt[3]{2} 3$$

$$[7] \quad \dots = \sqrt[3]{6} \frac{2}{3} + \sqrt[3]{6} + \sqrt[3]{6} \frac{1}{3}$$

$$[8] \quad \dots \text{ المعكوس الجمعي للعدد : } \sqrt[3]{8} - \text{ هو } \dots$$

$$[9] \quad \dots \text{ المعكوس الجمعي للعدد : } 1 - \sqrt[3]{2} \text{ هو } \dots$$

$$[10] \quad \dots \text{ المعكوس الجمعي للصفر هو } \dots$$

$$[11] \quad \dots \text{ العدد المحايد الجمعي في } \mathbb{R} \text{ هو } \dots$$

أحمد الشنتوي

ثالثاً : ضرب الأعداد الحقيقية :

تمهيد : نعلم أن :

$$(1) \quad 3 \times 4 = 12 \quad (4 \times 3) = 12$$

بالمثل يمكن استنتاج أن :

$$\sqrt{12} = \sqrt{(4 \times 3)} = \sqrt{4} \times \sqrt{3}$$

$$(2) \quad 3 \times 4 = 12 \quad (3 \times 3) = 9 \quad (4 \times 3) = 12$$

بالمثل يمكن استنتاج أن :

$$(\sqrt{3} \times \sqrt{4}) = \sqrt{3 \times 4} = \sqrt{12}$$

$$12 = 3 \times 4 =$$

(3) أوجد ناتج :

$$[1] \quad \dots = (\sqrt{0} - \sqrt{0}) \times 2$$

$$[2] \quad \dots = \sqrt{0} \times \sqrt{0}$$

خواص جمع الأعداد الحقيقية :

[1] الانغلاق :

إذا كان :  $a, b$  ، يكون :  $(a \times b) \in \mathbb{R}$  أي أن : حاصل ضرب أي عددين حقيقيين هو عدد حقيقي وبالتالي :  $\mathbb{R}$  مغلقة تحت عملية الضرب  
فمثلاً :

$$\sqrt{12} \times \sqrt{3} = \sqrt{12} \times \sqrt{3} , \quad 12 = 4 \times 3 , \quad \sqrt{12} = \sqrt{4} \times \sqrt{3} , \quad \text{هو عدد حقيقي}$$

[2] الإبدال :

إذا كان :  $a, b$  ، فإن :  $a \times b = b \times a$  أي أن : عملية الضرب إبدالية في  $\mathbb{R}$   
فمثلاً :

$$\sqrt{12} \times \sqrt{3} = \sqrt{3} \times \sqrt{12} = \sqrt{12} \times \sqrt{3}$$

[3] الدمج :

إذا كان :  $a, b, c$  ، يكون :

$$a + (b + c) = (a + b) + c = a + (b + c)$$

فمثلاً :

$$\text{الدمج} \quad (\sqrt{12} \times 3) \times \sqrt{3} = \sqrt{12} \times 3 \times \sqrt{3}$$

$$\text{الإبدال} \quad (3 \times \sqrt{12}) \times \sqrt{3} =$$

$$\text{الدمج} \quad 3 \times (\sqrt{12} \times \sqrt{3})$$

$$12 = 3 \times 4 =$$

[4] العنصر المحايد الضربي :

الواحد هو المحايد الجمعي في  $\mathbb{R}$  لأن :  $a = a \times 1 = 1 \times a$ 

فمثلاً :

$$\sqrt{12} = \sqrt{12} \times 1 = 1 \times \sqrt{12}$$

[5] وجود معكوس ضربي لكل عد حقيقي :

لكل عدد حقيقي  $a \neq 0$  صفر يوجد عدد حقيقي  $\frac{1}{a}$  حيث :

$$1 = \frac{1}{a} \times a \quad (\text{المحايد الضربي})$$

فمثلاً :

المعكوس الضربي للعدد  $\overline{0}$  هو :  $\frac{1}{\overline{0}}$  و العكس صحيحلأن :  $1 = \frac{1}{\overline{0}} \times \overline{0}$ 

ملاحظات :

(١) العدد و معكوسه الضربي لهما نفس الإشارة

فمثلاً :

المعكوس الضربي للعدد  $-\frac{2}{\overline{0}}$  هو :  $-\frac{\overline{0}}{2}$ 

(٢) المعكوس الضربي للعدد : ١ هو نفسه

، و المعكوس للعدد : - ١ هو نفسه

(٣) لا يوجد معكوس ضربي للعدد صفر لأن :  $\frac{1}{0}$  ليس لها معنى

$$(٤) \quad 1 = \frac{\overline{0}}{\overline{0}} = \frac{\overline{3}}{\overline{3}} = \frac{\overline{2}}{\overline{2}} = \frac{\overline{1}}{\overline{1}} = \dots$$

(٥) يفضل أن يكون مقام العدد الحقيقي عدداً صحيحاً

فمثلاً :

$$\overline{0} = \frac{\overline{0} \cdot \overline{0}}{\overline{0}} = \frac{\overline{0}}{\overline{0}} \times \frac{\overline{0}}{\overline{0}} = \frac{\overline{0}}{\overline{0}}$$

$$\overline{2}^3 \overline{3} = \frac{\overline{2}^3 \overline{1}}{\overline{2}} = \frac{\overline{2}^3}{\overline{2}^3} \times \frac{\overline{2}^3}{\overline{2}^3} \times \frac{\overline{1}}{\overline{2}^3} = \frac{\overline{1}}{\overline{2}^3}$$

[٦] توزيع الضرب على الجمع :

لأي ثلاثة أعداد حقيقية  $\overline{a}$  ،  $\overline{b}$  ،  $\overline{c}$  يكون :

$$\overline{a} \overline{b} + \overline{a} \overline{c} = (\overline{a} \times \overline{b}) + (\overline{a} \times \overline{c}) = (\overline{a} + \overline{b}) \times \overline{c}$$

$$\overline{a} \overline{b} + \overline{a} \overline{c} = (\overline{a} \times \overline{b}) + (\overline{a} \times \overline{c}) = \overline{a} \times (\overline{b} + \overline{c})$$

فمثلاً :

$$\overline{0} \times \overline{0}^3 + \overline{2} \times \overline{0}^3 = (\overline{0} + \overline{2}) \overline{0}^3$$

$$10 + \overline{0}^3 \overline{12} = \overline{0} \times \overline{3} + \overline{0}^3 \overline{2} \times \overline{3} =$$

رابعاً : قسمة الأعداد الحقيقية :

حيث أن لكل عدد حقيقي لا يساوي الصفر معكوس ضربي فإن عملية القسمة على أي عدد حقيقي خلاف الصفر ممكنة دائماً في  $\mathbb{R}$  و تعرف كما يلي :لكل  $\overline{a} \in \mathbb{R}$  ،  $\overline{b} \in \mathbb{R} - \{0\}$  يكون :  $\frac{\overline{a}}{\overline{b}} \times \overline{b} = \overline{a}$  (  $\overline{b} \neq 0$  )  
أي أن :عملية القسمة  $(\frac{\overline{a}}{\overline{b}})$  تعني ضرب  $\overline{a}$  في المعكوس الضربي للعدد  $\overline{b}$  و يلاحظ أن :عملية القسمة في  $\mathbb{R}$  ليست إبدالية و ليست دمجية

(٤) أكمل ما يلي :

$$[1] \quad \dots = \overline{7} \times \overline{7}$$

$$[2] \quad \dots + \overline{2} = \overline{2} \times \overline{3}$$

$$[3] \quad \dots = \overline{2} \times \dots = \overline{2} + \overline{2} + \overline{2}$$

$$[4] \quad \dots = \overline{0}^2 \times \overline{0}^3$$

$$[5] \quad \dots = \overline{2}^3 \times \overline{2}^3 \times \overline{2}^3$$



$$[٦] \quad \dots = (\sqrt{2} + \sqrt{5}) \sqrt{5}$$

$$[٧] \quad \dots = (\sqrt{3} - \sqrt{3}\sqrt{2}) \sqrt{3}$$

$$[٨] \quad \dots = (\sqrt{2} - \sqrt{5})(\sqrt{2} + \sqrt{5})$$

$$[٩] \quad \dots = (\sqrt{2} + \sqrt{5})$$

$$[١٠] \quad \dots \text{ هو } \frac{1}{\sqrt{2}} \text{ المعكوس الضربي للعدد}$$

$$[١١] \quad \dots \text{ هو العدد المحايد الضربي في } \mathbb{R}$$

$$(٥) \quad \text{إذا كان : } \sqrt{2} + \sqrt{3} = س , \sqrt{2} - \sqrt{3} = ص \text{ أوجد قيمة :}$$

$$[١] \quad س + ص \quad [٢] \quad س - ص \quad [٣] \quad س - \sqrt{2} - \sqrt{3} + ص$$

$$(٦) \quad \text{أكمل لتقدير ناتج } (\sqrt{10} + ٥)(\sqrt{3} - ٣)$$

و تحقق من صحة التقدير باستخدام الآلة الحاسبة

$$\text{تقدير } \sqrt{10} \text{ هو : } \dots \text{ لأن : } \sqrt{9} = \dots$$

$$\therefore \text{ تقدير } (\sqrt{10} + ٥) \text{ هو : } \dots + ٥ = \dots$$

$$\text{, تقدير } \sqrt{3} \text{ هو } \dots \text{ لأن : } \sqrt{٨} = \dots$$

$$\therefore \text{ تقدير } (\sqrt{3} - ٣) \text{ هو : } \dots - ٣ = \dots$$

$$\therefore \text{ تقدير } (\sqrt{10} + ٥)(\sqrt{3} - ٣) \text{ هو : } \dots \times \dots = \dots$$

و باستخدام الآلة الحاسبة نجد أن الناتج هو ....

أي أن التقدير ....

$$(٧) \quad \text{أعط تقديرًا لناتج } (\sqrt{10} + ٢)(\sqrt{3} - ٤)$$

و تحقق من صحة التقدير باستخدام الآلة الحاسبة

أحمد الشنتوري

(٨) أختار الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة :

$$[1] \dots = \sqrt{0} + \sqrt{0}$$

$$(\sqrt{1}, \sqrt{2}, 1, 0)$$

$$[2] \dots = (\sqrt{2}, 2)$$

$$(\sqrt{8}, \sqrt{4}, 8, 4)$$

$$[3] \dots = (\sqrt[3]{0}, \sqrt[3]{2})$$

$$(\sqrt[3]{8}, \sqrt[3]{4}, 2, 4)$$

[٤] المعكوس الجمعي للعدد  $\frac{1}{\sqrt{2}}$  هو ....

$$(\sqrt{3}-, \sqrt{2}-, \sqrt{3}, \sqrt{2})$$

[٥] المعكوس الجمعي للعدد  $(\sqrt{2}-\sqrt{0})$  هو ....

$$(\sqrt{2}-\sqrt{0}-, \sqrt{2}+\sqrt{0}, \sqrt{2}-\sqrt{0}, \sqrt{0}-\sqrt{2})$$

$$[6] \dots = \frac{10}{\sqrt[3]{0}}$$

$$(\sqrt{0}, \sqrt[3]{0}, \sqrt{0}, \sqrt[3]{10})$$

$$[7] \dots = \frac{\sqrt[3]{-1}}{\sqrt[3]{3}}$$

$$(1+\sqrt[3]{2}, \sqrt[3]{2}+1, 1-\sqrt[3]{2}, \sqrt[3]{2}-1)$$

[٨] المعكوس الضربي للعدد  $\frac{3-}{\sqrt[3]{3}}$  هو ....

$$(\sqrt[3]{3}-, \sqrt[3]{-}, \sqrt[3]{3}, \sqrt[3]{3})$$

$$[9] (\sqrt{3}-\sqrt{0}) = 14 - \dots$$

$$(\sqrt{9}, \sqrt{7}, \sqrt{4}, \sqrt{2})$$

[١٠] إذا كان بعدا مستطيل هما  $(\sqrt{2}+1)$  سم ،  $(\sqrt{2}-1)$  سم

فإن محيطه = .... سم

$$(\sqrt{2}, \sqrt{4}, 2, 4)$$

[١١] إذا كان بعدا مستطيل هما  $(\sqrt{0}+1)$  سم ،  $(\sqrt{0}-1)$  سمفإن مساحته = .... سم<sup>٢</sup>

$$(\sqrt{1}, 3, 31, 41)$$

[١٢] إذا كان :  $\sqrt{1} + \sqrt{2} = \sqrt{s}$  فإن :  $s = \dots$ 

$$(\sqrt{3}+\sqrt{2}, \sqrt{3}+2, \sqrt{3}-\sqrt{2}, \sqrt{3}-2)$$

[١٣] إذا كان :  $s = (\sqrt{3}-\sqrt{2})(\sqrt{3}+\sqrt{2})$ فإن :  $s = \dots$ 

$$(\sqrt{3} \pm, \sqrt[3]{\pm}, \sqrt[3]{-}, \sqrt[3]{-})$$

[١٤] إذا كان :  $s - \sqrt{1} = 17$  ،  $\sqrt{2} = s - \sqrt{v}$ فإن :  $s + v = \dots$ 

$$(\sqrt{32}, \sqrt{14}, \sqrt{8}, \sqrt{4})$$

[١٥] إذا كان : المعكوس الضربي للعدد  $\sqrt{s} - 1$  هو العدد

$$\frac{1}{4} (1 + \sqrt{s}) \text{ فإن : } s = \dots$$

$$(2, 3, 4, 0)$$

## الدرس الثامن : العمليات على الجذور التربيعية

إذا كان :  $p$  ،  $b$  عددين حقيقيين غير سالبين فإن :

$$\sqrt{pb} = \sqrt{b} \times \sqrt{p} \quad (1)$$

$$\sqrt{10} = \sqrt{0 \times 2} = \sqrt{0} \times \sqrt{2} \quad \text{فمثلاً :}$$

$$\sqrt{b} \times \sqrt{p} = \sqrt{b \times p} \quad (2)$$

$$\sqrt{3} \times \sqrt{4} = \sqrt{3 \times 4} = \sqrt{12} \quad \text{فمثلاً :}$$

تستخدم هذه القاعدة لكتابة العدد على الصورة :  $\sqrt{ص}$  لاحظ : يجب أن يكون أحد العددين مربع كامل بخلاف الواحد(1) ضع كل مما يلي على صورة  $\sqrt{ص}$  حيث  $ص$  ،  $ص$  عدنان صحيحان ،  $ص$  أصغر قيمة ممكنة :

$$.... = \sqrt{8} \quad [1]$$

$$.... = \sqrt{20} \quad [2]$$

$$.... = \sqrt{48} \quad [3]$$

$$.... = \sqrt{50} \times 2 \quad [4]$$

$$.... = \sqrt{72} \div \frac{1}{2} \quad [5]$$

$$\sqrt{\frac{p}{b}} = \frac{\sqrt{p}}{\sqrt{b}} \quad \text{حيث : } b \neq 0 \quad (3)$$

أحمد الشنتوري

فمثلاً :

$$\sqrt{\frac{0}{2}} = \frac{\sqrt{0}}{\sqrt{2}} = \frac{0}{\sqrt{2}} = \frac{0}{2}$$

$$\sqrt{\frac{3}{2}} = \frac{\sqrt{3}}{\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{3}}{\sqrt{2}} \times \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{6}}{\sqrt{2}} = \sqrt{\frac{6}{2}}$$

$$\sqrt{\frac{p}{b}} = \frac{\sqrt{p}}{\sqrt{b}} \times \frac{\sqrt{b}}{\sqrt{b}} = \frac{\sqrt{pb}}{\sqrt{b}} \quad \text{حيث : } b \neq 0 \quad (4)$$

أحمد الشنتوري

فمثلاً :

$$3 = \sqrt{9} = \frac{\sqrt{18}}{\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{18}}{2}$$

(2) اختصر إلى أبسط صورة :

$$.... = \sqrt{0} + \sqrt{8} \quad [1]$$

$$.... = \sqrt{20} - \sqrt{2} \quad [2]$$

$$.... = \sqrt{\frac{1}{2}} \times 3 - \sqrt{27} \times 2 \quad [3]$$

$$.... = \sqrt{32} + \sqrt{18} - \sqrt{128} - \sqrt{98} \quad [4]$$



## العددان المترافقان :

إذا كان :  $p$  ،  $b$  عددين نسبيين موجبين فإن :  
كلًا من العددين :  $(\sqrt{b} + \sqrt{p})$  ،  $(\sqrt{b} - \sqrt{p})$   
هو مرافق للعدد الآخر

و يكون مجموعهما  $(\sqrt{b} - \sqrt{p}) + (\sqrt{b} + \sqrt{p}) =$

$$2\sqrt{b} = \text{ضعف الحد الأول}$$

و حاصل ضربيهما  $(\sqrt{b} - \sqrt{p}) \times (\sqrt{b} + \sqrt{p}) =$

$$b - p = (\sqrt{b})^2 - (\sqrt{p})^2 =$$

$$= \text{مربع الحد الأول} - \text{مربع الحد الثاني}$$

**ملاحظة :** حاصل ضرب العددين المترافقين هو دائماً عدد نسبي

**فمثلاً :** مرافق العدد  $(\sqrt{2} - \sqrt{3})$  هو  $(\sqrt{2} + \sqrt{3})$  و

يكون : مجموعهما  $2\sqrt{2}$  ، و حاصل ضربيهما  $2 - 3 = -1$

## (٣) أكمل ما يلي :

[١] مرافق العدد  $(\sqrt{2} + \sqrt{5})$  هو ....

و مجموعهما = .... و حاصل ضربيهما = ....

[٢] مرافق العدد  $(\sqrt{7} - 3)$  هو ....

و مجموعهما = .... و حاصل ضربيهما = ....

[٣] مرافق العدد  $(\sqrt{6} + 3\sqrt{2})$  هو ....

و مجموعهما = .... و حاصل ضربيهما = ....

## ملاحظة :

إذا كان لدينا عدد حقيقي مقامه على الصورة  
 $(\sqrt{b} + \sqrt{p})$  أو  $(\sqrt{b} - \sqrt{p})$  فيجب وضعه  
في أبسط صورة و ذلك بضرب البسط و المقام في مرافق المقام

**فمثلاً :** لكتابة العدد  $\frac{3}{\sqrt{2} - \sqrt{5}}$  في أبسط صورة نتبع ما يلي :

$$\frac{\sqrt{2} + \sqrt{5}}{\sqrt{2} + \sqrt{5}} \times \frac{3}{\sqrt{2} - \sqrt{5}} = \frac{3}{\sqrt{2} - \sqrt{5}}$$

$$\sqrt{2} + \sqrt{5} = \frac{(\sqrt{2} + \sqrt{5})^3}{2 - 5} =$$

(٤) أكتب ما يلي في أبسط صورة :

$$[1] \quad \dots = \frac{2}{\sqrt{3} + \sqrt{7}}$$

$$[2] \quad \dots = \frac{\sqrt{3} + 2}{\sqrt{3} - 2}$$

$$(٥) \text{ إذا كان : } \sqrt{5} - \sqrt{3} = \text{س} , \quad \sqrt{2} + \sqrt{5} = \text{ص} ,$$

أثبت أن : س ، ص مترافقان ثم أوجد قيمة كل من :

$$[١] \text{ س} + ٢ \text{س ص} + \text{ص}^2$$

$$[٢] \text{ س}^2 - \text{س ص} + \text{ص}^2$$

$$(٦) \text{ إذا كان : } \sqrt{13} + \sqrt{6} = \text{س} , \quad \sqrt{7} = \text{ص} ,$$

أوجد قيمة كل من :

$$[١] \frac{\text{س} + \text{ص}}{\text{س ص} - ٥}$$

$$[٢] \text{س}^2 \text{ص}^2$$

أحمد الشنتوري

اكتب ذاكولي في البحث وانضم لجروبات ذاكولي  
مع رياض الأطفال للصف الثالث الإعدادي

$$[10] \quad \dots = (\sqrt{3} - \sqrt{2})(\sqrt{3} + \sqrt{2})$$

$$(\sqrt{3} - 1, \sqrt{3} - 1, \sqrt{3} - 1, \sqrt{3} - 1)$$

(٨) أختار الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة :

[1] المعكوس الضربي للعدد  $(\sqrt{2} + \sqrt{3})$  في أبسط صورة هو ....

[2] إذا كان :  $\sqrt{2} - \sqrt{5} = س$  ،  $\sqrt{2} + \sqrt{5} = ص$  ، فإن :  $(س ص ، س + ص) = \dots$

[3] إذا كان :  $\sqrt{5} + 2 = س$  ،  $\sqrt{5} - 2 = ص$  ، ص العدد المرافق للعدد س فإن :  $(س - ص) = \dots$

[4] مساحة المثلث الذي طول قاعدته  $(2 + 2\sqrt{8})$  سم ، ارتفاعه  $(1 - \sqrt{7})$  سم تساوى .... سم

[5] إذا كان :  $\sqrt{2} - 1 = س$  ،  $1 - \sqrt{2} = ص$  ، فإن :  $ص = \dots$

$$[6] \quad \dots = \sqrt{18} - \sqrt{8} + \sqrt{2} \times 4$$

$$[7] \quad \dots = \frac{3}{4}\sqrt{8} - \frac{2}{3}\sqrt{6} + \frac{1}{5}\sqrt{12}$$

(٧) أختار الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة :

$$[1] \quad \dots = \sqrt{3} - \sqrt{12} \quad (\sqrt{3}, \sqrt{3} - 2, 9, 3)$$

$$[2] \quad \dots = \sqrt{2} - \sqrt{8} - \sqrt{50} \quad (\sqrt{2}, \sqrt{30}, \sqrt{2}, \sqrt{2} - 2)$$

$$[3] \quad \dots = (\sqrt{5} + \sqrt{7})(\sqrt{5} - \sqrt{7}) \quad (\sqrt{5} - 2, \sqrt{7} - 2, 12, 2)$$

$$[4] \quad \dots = (\sqrt{2} + \sqrt{8}) \quad (\sqrt{18}, \sqrt{10}, 18, 10)$$

$$[5] \quad \dots = \frac{1}{4}\sqrt{2} + \frac{1}{4}\sqrt{2} \quad (\sqrt{2} - \frac{1}{4}, \sqrt{2}, \frac{1}{4}\sqrt{2}, 1)$$

[6] المعكوس الضربي للعدد  $\sqrt{50}$  هو ....  
 $(\sqrt{2} - \frac{1}{5}, \sqrt{2} - \frac{1}{5}, \sqrt{2} - \frac{1}{5}, \sqrt{2} - \frac{1}{5})$

[7] العدد التالي في النمط :  $\sqrt{2}, \sqrt{8}, \sqrt{18}, \sqrt{32}$  هو ....  
 $(\sqrt{40}, \sqrt{50}, \sqrt{50}, \sqrt{38})$

$$[8] \quad \dots \times 2 = \sqrt{48} - \frac{1}{4} \quad (\sqrt{2} - 3, \sqrt{3} - 2, \sqrt{3}, \sqrt{2})$$

[9] إذا كان :  $\sqrt{3} - \sqrt{2} = س$  ،  $\sqrt{3} + \sqrt{2} = ص$  ، فإن :  $ص = \dots$   
 $(3 - 2, 2 - 3, 3, 2)$

أحمد الشنتوري



$$(٣) \quad \sqrt[p]{\frac{p}{b}} = \frac{\sqrt[p]{p}}{\sqrt[p]{b}} \quad \text{حيث : } b \neq \text{صفر}, p, b \in \mathbb{C}$$

أحمد الشنتوري

فمثلاً :

$$2 = \sqrt[3]{8} = \sqrt[3]{\frac{24}{3}} = \frac{\sqrt[3]{24}}{\sqrt[3]{3}}$$

$$(٤) \quad \sqrt[p]{\frac{p}{b}} = \sqrt[p]{\frac{p}{b}} \quad \text{حيث : } b \neq \text{صفر}, p, b \in \mathbb{C}$$

أحمد الشنتوري

فمثلاً :

$$\sqrt[3]{\frac{1}{12}} = \frac{\sqrt[3]{1}}{\sqrt[3]{12}} = \frac{\sqrt[3]{1}}{\sqrt[3]{2} \times \sqrt[3]{6}} = \frac{\sqrt[3]{1}}{\sqrt[3]{2} \times \sqrt[3]{2} \times \sqrt[3]{3}} = \frac{\sqrt[3]{1}}{\sqrt[3]{4} \times \sqrt[3]{3}} = \frac{\sqrt[3]{1}}{\sqrt[3]{12}}$$

(٢) اختصر إلى أبسط صورة :

$$.... = \sqrt[3]{20} - \sqrt[3]{04} \quad [1]$$

$$.... = \sqrt[3]{32} + \sqrt[3]{1.8} \quad [2]$$

$$.... = \sqrt[3]{\frac{1}{9}} - \sqrt[3]{3} - \sqrt[3]{81} \quad [3]$$

$$.... = \sqrt[3]{04} + \sqrt[3]{128} \times 2 - \sqrt[3]{20} \quad [4]$$

## الدرس التاسع : العمليات على الجذور التكعيبة

إذا كان :  $p, b$  عددين حقيقيين فإن :  $\sqrt[p]{\frac{1}{b}}$ 

$$(1) \quad \sqrt[p]{\frac{1}{b}} = \sqrt[p]{\frac{1}{b}} \times \sqrt[p]{b} = \sqrt[p]{\frac{1}{b} \times b} = \sqrt[p]{1} = 1$$

$$\text{فمثلاً : } \sqrt[3]{\frac{1}{0}} = \sqrt[3]{\frac{1}{0} \times 2} = \sqrt[3]{\frac{1}{0}} \times \sqrt[3]{2} = \sqrt[3]{\frac{1}{0} \times 2} = \sqrt[3]{\frac{2}{0}}$$

$$(2) \quad \sqrt[p]{b} \times \sqrt[p]{p} = \sqrt[p]{b \times p}$$

$$\text{فمثلاً : } \sqrt[3]{3} \times \sqrt[3]{8} = \sqrt[3]{3} \times \sqrt[3]{8} = \sqrt[3]{3 \times 8} = \sqrt[3]{24}$$

تستخدم هذه القاعدة لكتابة العدد على الصورة :  $\sqrt[p]{s}$  حيث  $s$  عددان  
لاحظ : يجب أن يكون أحد العددين مكعب كامل بخلاف الواحد

(1) ضع كل مما يلي على صورة  $\sqrt[p]{s}$  حيث  $s$  ، ص عددان صحيحان ، ص أصغر قيمة ممكنة :

$$.... = \sqrt[3]{16} \quad [1]$$

$$.... = \sqrt[3]{2.0} \quad [2]$$

$$.... = \sqrt[3]{81} \times 2 \quad [4]$$

$$.... = \sqrt[3]{20} \times \frac{1}{6} \quad [5]$$

(٣) أختار الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة :

$$.... = \sqrt[3]{24} - \sqrt[3]{81} \quad [1]$$

$$(\sqrt[3]{3}, \sqrt[3]{3}, \sqrt[3]{07}, \sqrt[3]{3})$$

$$.... = \sqrt[3]{20} + \sqrt[3]{130} \quad [2]$$

$$(\sqrt[3]{170}, \sqrt[3]{0}, \sqrt[3]{0}, \sqrt[3]{0})$$

$$.... = \sqrt[3]{9} \times \sqrt[3]{3} \quad [3]$$

$$(\sqrt[3]{27}, \sqrt[3]{27}, \sqrt[3]{3}, \sqrt[3]{1})$$

$$.... = \sqrt[3]{2} + \sqrt[3]{2} \quad [4]$$

$$(\sqrt[3]{16}, \sqrt[3]{8}, \sqrt[3]{2}, \sqrt[3]{2})$$

$$.... = \sqrt[3]{\frac{1}{9}} - \sqrt[3]{24} \quad [5]$$

$$(\sqrt[3]{9}, \sqrt[3]{12}, \sqrt[3]{8}, \sqrt[3]{-8})$$

(٤) أختصر كلاً مما يلي لأبسط صورة :

$$.... = \sqrt[3]{16} + \sqrt[3]{98} - \sqrt[3]{04} + \sqrt[3]{18} \quad [1]$$

$$.... = \sqrt[3]{73} + \sqrt[3]{24} - \sqrt[3]{28} - \sqrt[3]{81} \quad [2]$$

$$(0) \text{ إذا كان : } \sqrt[3]{7} + 3 = \text{س} , \sqrt[3]{7} - 3 = \text{ص} ,$$

أوجد قيمة كل من :

$$[2] (\text{س} + \text{ص})$$

$$[1] (\text{س} - \text{ص})$$

أحمد الشنتوري

## الدرس العاشر : تطبيقات على الأعداد الحقيقية

## الدائرة :

محيط الدائرة =  $2\pi r$  في وحدة طوليةمساحة سطح الدائرة =  $\pi r^2$  في وحدة مربعةحيث :  $r$  طول نصف قطر الدائرة ، $\pi$  هي النسبة التقريبية بين محيط الدائرة و طول القطر

$$\pi = \frac{22}{7} \text{ أو } 3,14$$

## فمثلاً :

لايجاد مساحة دائرة محيطها ٣١,٤ سم ، (  $3,14 = \pi$  ) نتبع ما يلي :بما أن : محيط الدائرة =  $2\pi r$  في

$$\text{إذن : } 31,4 = 2 \times 3,14 \times r \Rightarrow r = 5 \text{ سم}$$

$$\text{إذن : } 0 = 31,4 \div 6,28 = 5 \text{ سم}$$


$$\text{مساحة سطح الدائرة} = \pi r^2 = 3,14 \times 5 \times 5 = 78,5 \text{ سم}^2$$

$$(I) \text{ دائرة محيطها } 88 \text{ سم أوجد مساحة سطحها ( } \pi = \frac{22}{7} \text{ )}$$



أحمد الشنتوري

$$(2) \text{ دائرة مساحة سطحها } 314 \text{ سم}^2 \text{ أوجد محيطها ( } \pi = 3,14 \text{ )}$$



(3) في الشكل المقابل :

أ ب ح د مربع مرسوم داخل دائرة م

فإذا كان محيط الجزء المظلل ٢٥ سم أوجد :


مساحة المربع ، مساحة الدائرة (  $\frac{22}{7} = \pi$  )



## متوازي المستطيلات :

هو مجسم جميع أوجهه مستطيلة الشكل  
و كل وجهين متقابلين متطابقان

إذا كانت أطوال أحرفه  $س$  ،  $ص$  ،  $ع$  فإن :



$$\text{المساحة الجانبية} = \text{محيط القاعدة} \times \text{الارتفاع}$$

$$= 2(س + ص) \times ع \text{ وحدة مربعة}$$

$$\text{المساحة الكلية} = \text{المساحة الجانبية} + 2 \times \text{مساحة القاعدة}$$


$$= 2(س ص + ع ص + ع س) \text{ وحدة مربعة}$$

$$\text{الحجم} = \text{مساحة القاعدة} \times \text{الارتفاع}$$

$$= س \times ص \times ع \text{ وحدة مكعبة}$$

## حالة خاصة : المكعب

هو متوازي مستطيلات أطوال أحرفه متساوية  
إذا كان طول حرفه  $ل$  وحدة طول فإن :



$$\text{مساحة كل وجه} = ل^2 \text{ وحدة مربعة}$$

$$\text{المساحة الجانبية} = 4ل^2 \text{ وحدة مربعة}$$

$$\text{المساحة الكلية} = 6ل^2 \text{ وحدة مربعة}$$

$$\text{الحجم} = ل^3 \text{ وحدة مكعبة}$$

(٤)

متوازي مستطيلات قاعدته مربعة الشكل ، و حجمه  $٧٢ \text{ سم}^3$   
و ارتفاعه  $٥$  سم أوجد حجمه

أحمد الشنتوري

(٥)


مكعب حجمه  $١٢٥ \text{ سم}^3$  أوجد مساحته الكلية

(٦) أيهما أكبر حجماً مكعب مساحته الكلية ٢٩٤ سم<sup>٢</sup> أم متوازي مستطيلات أبعاده  $\sqrt{٧}$  ،  $\sqrt{٥}$  ، ٥ سم

(٨) مكعب حجمه ١٧٢٨ سم<sup>٣</sup> ، قطع عند أحد أحرافه متوازي مستطيلات أبعاده ٣ سم ، ٢ سم ، ١ سم أوجد المساحة الكلية للجزء المتبقى من المكعب

أحمد الشنتوري


(٧) قطعة من الورق المقوى مستطيلة الشكل بعدها ٢٥ سم ، ١٥ سم قطع من كل ركن من أركانها الأربعة مربع طول ضلعه ٤ سم ثم طويت الأجزاء البارزة لتكون حوضاً على شكل متوازي مستطيلات أوجد حجمه و مساحته الكلية



(٩) متوازي مستطيلات قاعدته مربعة الشكل و إرتفاعه ٣ سم فإذا كان مجموع أطوال أحرافه ٥٢ سم أوجد حجمه

## الأسطوانة الدائرية القائمة :

هي مجسم له قاعدتان متوازيتان و متطابقتان كل منهما عبارة سطح دائرة أما السطح الجانبي فهو سطح منحني يسمى سطح الأسطوانة في الشكل المقابل :



إذا كان :  $r$  ،  $r'$  مركزي قاعدتي الأسطوانة فإن :  
 $r = r'$  هو ارتفاع الأسطوانة ،  $r = r'$  ،  
 كل منهما = طول نصف قطر قاعدة الأسطوانة

،  $p = p'$  و إذا قطعنا سطح

الأسطوانة الجانبي عند  $p$  و بسطنا هذا السطح نحصل على سطح المستطيل

$p = p'$  و يكون :  $p = h$  ارتفاع

الأسطوانة ،  $p = p'$  محيط قاعدة الأسطوانة

، مساحة المستطيل  $p = p'$  = المساحة الجانبية للأسطوانة

المساحة الجانبية للأسطوانة = محيط القاعدة  $\times$  الارتفاع  
 $\pi r^2 = \pi r \times h$  وحدة مربعة

المساحة الكلية للأسطوانة = المساحة الجانبية +  $2 \times$  مساحة القاعدة  
 $\pi r^2 = \pi r \times h + 2 \times \pi r^2$  وحدة مربعة

حجم الأسطوانة = مساحة القاعدة  $\times$  الارتفاع  
 $\pi r^2 = \pi r^2 \times h$  وحدة مكعبة

أحمد الشنتوري

(١٠)

قطعة من الورق المقوى على شكل مستطيل  $p$  ب د ع فيه  $p$  ب =  
 ١٠ سم ، ب د = ٢٢ سم ، طويت على شكل أسطوانة دائرية قائمة  
 بحيث ينطبق  $p$  ب على ع د أوجد حجم الأسطوانة الناتجة  
 $(\frac{22}{7} = \pi)$

أحمد الشنتوري

(١١)

أسطوانة دائرية قائمة محيط قاعدتها = ٤٤ سم ، حجمها = ٣٨٥٠  
 سم<sup>٣</sup> أوجد ارتفاعها  $(\frac{22}{7} = \pi)$



(١٢) أسطوانة دائرية قائمة حجمها  $٧٥٣٦$  سم<sup>٣</sup> و ارتفاعها  $٢٤$  سم  
أوجد مساحتها الكلية (  $٣,١٤ = \pi$  )

(١٤) قطعة من الشيكولاتة على شكل أسطوانة دائرية قائمة طول نصف  
قطر قاعدتها  $١١$  سم و ارتفاعها  $١٠,٥$  سم صهرت و حولت إلى  $٣$   
مكعبات متساوية الحجم أوجد طول حرف المكعب الواحد  
(  $\frac{٢٢}{٧} = \pi$  )

أحمد الشنتوري

(١٣) أيهما أكبر حجماً أسطوانة دائرية قائمة طول نصف قطر قاعدتها  
 $٧$  سم و ارتفاعها  $١٠$  سم أم مكعب طول حرفه  $١١$  سم ؟  
(  $\frac{٢٢}{٧} = \pi$  )

(١٥) أسطوانة دائرية قائمة ارتفاعها يساوي طول نصف قطر قاعدتها و  
حجمها يساوي  $٢٧\pi$  سم<sup>٣</sup> أوجد مساحتها الجانبية بدلالة  $\pi$

## الكرة :

هي مجسم سطحه منحنى جميع نقاط سطحه على أبعاد متساوية ( نـ ) من نقطة ثابتة داخله ( مركز الكرة ) إذا قطعت الكرة بمستوى مار بمركزها فإن المقطع دائرة مركزها هو مركز الكرة ، وطول نصف قطرها هو طول نصف قطر الكرة ( نـ )



مساحة سطح الكرة =  $\pi \times 4$  نـ<sup>٢</sup> وحدة مربعة

حجم الكرة =  $\frac{4}{3} \pi \times 3$  نـ<sup>٣</sup> وحدة مكعبة

(١٦) كرة مساحة سطحها ١٢٥٦ سم<sup>٢</sup> أوجد حجمها (  $\pi = ٣,١٤$  )

(١٨)

متوازي مستطيلات من الرصاص أطوال أحرفه ٧٧ ، ٢٤ ، ٢١ سم شكلت منه مادة لتكوين كرة أوجد طول نصف قطر الكرة (  $\frac{٢٢}{٧} = \pi$  )

أحمد الشنتوري

(١٩) كرة حجمها  $36\pi$  سم<sup>٣</sup> وضعت داخل مكعب فمست أوجهه الستة أوجد مساحة سطح الكرة ثم أوجد حجم المكعب

(٢١) اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة :

[١] حجم الكرة التي طول نصف قطرها  $\sqrt[3]{3}$  سم يساوى .... سم<sup>٣</sup>

(  $\pi \frac{9}{4}$  ،  $\pi \frac{4}{9}$  ،  $\pi \sqrt[3]{3}$  ،  $\pi \frac{4}{3}$  )

[٢] طول نصف قطر الكرة التي مساحتها  $9\pi$  سم<sup>٢</sup> يساوى .... سم

( ٩ ، ٦ ، ٣ ، ١,٥ )

[٣] المساحة الكلية لمكعب حجمه ٨ سم<sup>٣</sup> تساوى .... سم<sup>٢</sup>

( ٢٤ ، ١٦ ، ٤ ، ٢ )

[٤] طول نصف قطر دائرة مساحتها  $2\pi$  سم<sup>٢</sup> يساوى .... سم

( ١ ، ٢ ،  $\sqrt{2}$  ، ٤ )

[٥] ارتفاع متوازي المستطيلات الذي مساحته الجانبية ٢٤ سم<sup>٢</sup>

و قاعدته على شكل مربع طول ضلعه ٦ سم يساوى .... سم

( ١٠ ، ٦ ، ٥ ، ٣ )

[٦] إذا كانت المساحة الجانبية لأسطوانة دائرية قائمة طول نصف

قطرها ٨ سم هي  $8\pi$  سم<sup>٢</sup> فإن ارتفاعها = .... سم

( ٨ ، ٤ ، ١٠ ، ١٦ )

(٢٠) كرة معدنية جوفاء طولاً نصفى قطريها الداخلى و الخارجى ٢,١ سم ، ٣,٥ سم على الترتيب أوجد كتلتها علماً بأن السنتيمتر المكعب من هذا المعدن كتلته ٢٠ جرام (  $\frac{22}{7} = \pi$  )

لأمانة العلمية  
يرجى عدم حذف أسمى نهائياً  
يسمح فقط بإعادة النشر  
دون أى تعديل



الدرس الحادي عشر : حل المعادلات و المتباينات من الدرجة الأولى  
في متغير واحد في ح

أولاً : حل المعادلات من الدرجة الأولى في متغير واحد في ح  
نعلم أن :

(١) المعادلة هي :

جملة رياضية تحتوي على متغير أو أكثر وتحتوي علاقة التساوي  
بين عبارتين رياضيتين

فمثلاً :

الجملة الرياضية :  $7 = 1 - 2$  تسمى معادلة حيث :

تحتوي على المتغير أو المجهول (س) ، علاقة التساوي (=)  
بين العبارتين (  $1 - 2$  ) بالطرف الأيمن ، ( 7 ) بالطرف الأيسر

(٢) درجة المعادلة هي :

أعلى درجة حد جبري تحتوي عليه المعادلة  
فمثلاً :

المعادلة :  $7 = 1 - 2$  من الدرجة الأولى ،

المعادلة :  $9 = 0 + 1$  من الدرجة الثانية ، .... و هكذا

(٣) حل المعادلة هو :

إيجاد قيمة المتغير ( المجهول ) التي تحقق تساوي طرفي المعادلة

(٤) مجموعة حل المعادلة :

هي المجموعة التي تحقق عناصرها المعادلة

ملاحظة :

في حالة المعادلة من الدرجة الأولى في مجهول واحد :  
للمجهول قيمة واحدة

(٥) خواص علاقة التساوي :

إذا كان : س ، ص ، ع أعداداً حقيقية فإن :

[١] إذا كان : س = ص فإن : س ± ع = ص ± ع

[٢] إذا كان : س = ص فإن : س × ع = ص × ع

[٣] إذا كان : س × ع = ص × ع فإن : س = ص ، ع ≠ ٠

كيفية حل المعادلات من الدرجة الأولى في متغير واحد في ح :

(١)  $7 = 1 - 2$  بإضافة ( ١ ) للطرفين ينتج :

$8 = 1 - 2$  بقسمة طرفي المعادلة على ( ١ ) ينتج :

س = ٤ ∴ مجموعة الحل = { ٤ }

ملاحظة :

يمكن ضرب طرفي المعادلة :  $8 = 1 - 2$  في المعكوس الضربي

لمعامل س و هو  $\frac{1}{1}$  كما يلي :

$$\frac{1}{1} \times 8 = \frac{1}{1} \times (1 - 2) \quad \therefore 8 = 1 - 2$$

و يمثل الحل على خط الأعداد كما بالشكل التالي :



(٢)  $0 = 1 + 2$  بإضافة ( - ) للطرفين ينتج :

$0 = 1 + 2$  بضرب طرفي المعادلة في  $\frac{1}{0}$  ينتج :


$$0 = \frac{1}{0} \times (1 + 2) \quad \therefore 0 = \frac{1}{0} \times 3 \quad \therefore 0 = 3$$

$$[٤] \sqrt{3} \text{ س} - ٢ = ١$$

$$[٥] \sqrt{2} \text{ س} - ١ = ٢$$

$$[٦] \sqrt{7} \text{ س} - \sqrt{7} = ٦$$

∴ مجموعة الحل =  $\{ \sqrt{0} \}$   
و يمثل الحل على خط الأعداد كما بالشكل التالي



(١) أوجد في ح مجموعة الحل لكل من المعادلات التالية و مثل الحل على خط الأعداد :

$$[١] ٣ \text{ س} + ٧ = ١$$

$$[٢] ٤ \text{ س} + ٤ = ٤$$

$$[٣] ٢ \text{ س} + ٢ = ٠$$

ثانياً : حل المتباينات من الدرجة الأولى في متغير واحد في ح

نعلم أن :

(١) المتباينة :

هي جملة رياضية تتضمن علامة التباين بين عبارتين رياضيتين

ملاحظة :

علامات التباين هي :

< : أكبر من ، > : أقل من  
≤ : أكبر من أو يساوي ، ≥ : أقل من أو يساوي

فمثلاً :

الجملة الرياضية :  $s - 1 > 7$  تسمى متباينة حيث :

تحتوى على المتغير أو المجهول (س) ، علاقة التساوي ( > )  
بين العبارتين (س - 1) بالطرف الأيمن ، ( 7 ) بالطرف الأيسر

(٢) درجة المتباينة هي :

أعلى درجة حد جبرى تحتوى عليه المتباينة

فمثلاً :

المتباينة :  $s - 1 < 7$  من الدرجة الأولى ،

المتباينة :  $s + 9 \geq 0$  من الدرجة الثانية ، .... و هكذا

(٣) حل المتباينة هو :

إيجاد قيم المتغير ( المجهول ) التى تحقق تساوى طرفى المعادلة

(٤) مجموعة حل المعادلة :

هي مجموعة العناصر التى يحقق كل منها المتباينة

و تكتب فى صورة فترة

ملاحظة : فى حالة المتباينة من الدرجة الأولى فى مجهول واحد :  
للمجهول قيمة واحدة أو أكثر

(٥) خواص علاقة التباين :

إذا كان : س ، ص ، ع أعداداً حقيقية و كان  $s > v$  فإن :

$$[1] \quad s + e > v + e$$

سواء كانت ع موجبة أو سالبة ( خاصية الإضافة )

$$[2] \quad \text{إذا كان : } e < 0 \text{ فإن : } s \times e > v \times e$$

خاصية الضرب فى عدد حقيقى موجب

$$[3] \quad \text{إذا كان : } e > 0 \text{ فإن : } s \times e < v \times e$$

خاصية الضرب فى عدد حقيقى سالب

أى أن : عند ضرب (أو قسمة) طرفى المتباينة فى (على)

عدد سالب يتغير اتجاه علامة التباين

ملاحظة :

يمكن استنتاج خواص علاقة التباين السابقة فى جميع علاقات

التباين :  $>$  أو  $<$  أو  $\leq$  أو  $\geq$

كيفية حل المعادلات من الدرجة الأولى فى متغير واحد فى ح :


$$[1] \quad 3s + 1 > 10 \quad \text{بإضافة ( - 1 ) للطرفين}$$

$$3s > 9$$

بضرب طرفى المتباينة فى  $(\frac{1}{3} < 0)$  ينتج :

$$s > 3 \quad \therefore \text{مجموعة الحل} = ]3, \infty[$$

و يمثل الحل على خط الأعداد كما بالشكل التالى :





(٢) أوجد في ح مجموعة الحل لكل من المتباينات التالية و مثل الحل على خط الأعداد :

$$[1] \quad 3 - 2 < 1$$


$$(٢) \quad 3 - 2 \geq 1 \quad \text{إضافة ( - ٣ ) للطرفين}$$

$$- 2 \geq 2 - 1$$

بضرب طرفي المتباينة في  $( - \frac{1}{2} > 0 )$  ينتج :

$$3 - 2 \leq 1 \quad \therefore \text{مجموعة الحل} = ] 1, \infty [$$

و يمثل الحل على خط الأعداد كما بالشكل التالي :



$$[2] \quad 3 - 0 \leq 4 - 2$$

$$(٣) \quad 0 - 3 > 3 - 2 \geq 7 \quad \text{إضافة ( ٢ ) للأطراف}$$

بالضرب في  $( \frac{1}{2} > 0 )$  ينتج :

$$- 3 > 3 - 3 \geq 9 \quad \therefore \text{مجموعة الحل} = ] 1, 3 [$$

و يمثل الحل على خط الأعداد كما بالشكل التالي :



$$[3] \quad 0 \geq 1 - 2 > 3 - 3$$


$$(٤) \quad 2 + 3 \geq 2 + 3 \geq 8 + 3 \quad \text{إضافة ( - ٣ )}$$

$$2 \geq 2 + 3 \geq 8 \quad \text{إضافة ( ٢ - )}$$

$$8 \geq 2 \geq 0 \quad \text{بالضرب في } ( \frac{1}{2} > 0 )$$

$$4 \geq 2 \geq 0 \quad \therefore \text{مجموعة الحل} = [ 0, 4 ]$$

و يمثل الحل على خط الأعداد كما بالشكل التالي :



أحمد الشنتوري

$$[4] \quad \frac{1}{4} \leq 1 + s \leq 2$$

$$[7] \quad |2 - s| > 3 - s \geq 1$$

$$[5] \quad 2 - s \geq 3 - s \geq 0$$

$$[8] \quad \sqrt[3]{8 - s} > 1 + s \geq \sqrt[3]{9}$$

$$[6] \quad 1 - s \geq 3 - s \geq 0 + s$$

(٣) إذا كانت :  $[4, 7]$  هي مجموعة حل المتباينة :  
 $p \leq 3 - s \leq b$  أوجد قيمة كل من :  $p, b$

أحمد الشنتوري

(٤) اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة :

[1] مجموعة حل المعادلة :  $2x - 3 = 7$  في  $\mathbb{R}$  هي ....

(  $\emptyset$  ,  $\{0\}$  ,  $\{1\}$  ,  $\{2\}$  )

[2] مجموعة حل المعادلة :  $\sqrt{x} = 2$  في  $\mathbb{R}$  هي ....

(  $\emptyset$  ,  $\{\sqrt{2}\}$  ,  $\{\sqrt{2}, 2\}$  ,  $\{\sqrt{2}, 4\}$  )

[3] مجموعة حل المعادلة :  $\sqrt{x} = \sqrt{3} - \sqrt{3}$  في  $\mathbb{R}$  هي ....

(  $\emptyset$  ,  $\{\text{صفر}\}$  ,  $\{\sqrt{3}, 2\}$  ,  $\{\sqrt{3}\}$  )

[4] مجموعة حل المتباينة :  $x < 7$  في  $\mathbb{R}$  هي ....

(  $]-\infty, 7[$  ,  $]-\infty, 7]$  ,  $]-\infty, 7[$  ,  $]-\infty, 7]$  )

[5] مجموعة حل المتباينة :  $1 - x > 1$  في  $\mathbb{R}$  هي ....

(  $]-1, 1[$  ,  $]-1, 1]$  ,  $]-1, 1[$  ,  $]-1, 1]$  )

[6] مجموعة حل المتباينة :  $1 - x \geq 1$  في  $\mathbb{R}$  هي ....

(  $]-1, 1[$  ,  $]-1, 1]$  ,  $]-1, 1[$  ,  $]-1, 1]$  )

[7] إذا كان :  $2 < x < 3$  فإن  $2x + 3 \geq \dots$

(  $]-1, 7[$  ,  $]-1, 7]$  ,  $]-1, 7[$  ,  $]-1, 7]$  )

[8] العدد :  $2 \in$  مجموعة حل المتباينة ....

(  $x < 2$  ,  $x \leq 2$  ,  $x > 2$  ,  $x \geq 2$  )

[9] إذا كان :  $x \in ]-\infty, 2]$

فإن : العبارة تمثل المتباينة ....

(  $x \geq 2$  ,  $x \leq 2$  ,  $x > 2$  ,  $x < 2$  )

أحمد الشنتوري

(٥) أكمل ما يلي لتحصل على عبارة صحيحة حيث  $x \in \mathbb{R}$  :

[1] إذا كان :  $x + 5 = 11$  فإن :  $6x = \dots$

[2] إذا كان :  $3x = 6$  فإن :  $x + 6 = \dots$

[3] إذا كان :  $2x - 1 = 7$  فإن :  $\frac{1}{x} = \dots$

[4] إذا كانت مجموعة حل المعادلة :  $x + 4 = 3$  هي  $\{3\}$

فإن :  $x = \dots$

[5] إذا كانت مجموعة حل المعادلة :  $3x + 2 = 0$  هي

$\{1\}$  فإن :  $x = \dots$

[6] مجموعة حل المعادلة :  $x + \dots = 7$  هي  $\{-2\}$

[7] مجموعة حل المتباينة :  $x > 3$  هي ....

[8] مجموعة حل المتباينة :  $x \leq 1$  هي ....

[9] مجموعة حل المتباينتين :  $x > 3$  ,  $x \leq 1$  معاً هي ....

[10] إذا كان :  $m > p$  فإن :  $p - 3 \dots p - 3$

[11] إذا كان :  $m > p$  ,  $x = 3$  فإن :  $p \dots x$

[12] إذا كان :  $m > p$  ,  $x = 3$  فإن :  $p \dots x$

[13] إذا كان :  $1 < x < 2$  فإن :  $x + 1 \in \dots$



## الوحدة الثانية

## العلاقة بين متغيرين

## الدرس الأول : العلاقة بين متغيرين

تمهيد :

أشترى محمد كراسات و أقلام فإذا كان ثمن الكراسة ستة جنيهاً ، و ثمن القلم أربعة جنيهاً ، و دفع للبائع ٥٠ جنيهاً فما هي الإمكانيات المختلفة لعدد الأقلام و الكراسات التي اشتراها محمد ؟  
لدراسة الإمكانيات المختلفة

نفرض أن : عدد الأقلام = س ، عدد الكراسات = ص  
∴ ٦س + ٤ص = ٥٠

تسمى هذه العلاقة : **معادلة من الدرجة الأولى في متغيرين**  
يمكن قسمة طرفي المعادلة على ٢ فنحصل على معادلة مكافئة لها  
و هي : ٣س + ٢ص = ٢٥ و يمكن كتابتها على الصورة :  
٢ص = ٢٥ - ٣س أي أن :  $ص = \frac{٢٥ - ٣س}{٢}$

لاحظ أن :

س ، ص أعداد طبيعية  
وفي هذه الحالة تكون س عدداً فردياً  
يمكن تكوين الجدول المقابل لمعرفة الإمكانيات المختلفة

س	ص	( س ، ص )
١	١١	( ١ ، ١١ )
٣	٨	( ٣ ، ٨ )
٥	٥	( ٥ ، ٥ )
٧	٢	( ٧ ، ٢ )
٩	سالبة	لا تصلح

(١) مع مؤمن أوراق مالية فئة ٥ جنيهاً ، و أوراق مالية فئة ٢٠ جنيهاً  
أشترى مؤمن من مركز تجاري بما قيمته ٨٥ جنيهاً ، ما الإمكانيات المختلفة لدفع هذا المبلغ باستخدام نوعي الأوراق المالية التي معه ؟

(٢) مثلث متساوي الساقين محيطه ١٩ سم ، ما الإمكانيات المختلفة لأطوال أضلاعه ، علماً بأن أطوال أضلاعه  $\in \mathbb{N}$   
تذكر : مجموع طولى ضلعين في المثلث أكبر من طول الضلع الثالث

أحمد الشنتوري

## دراسة العلاقة بين متغيرين

العلاقة :  $٣س + ب ص = ح$  حيث :  $٣ \neq ٠$  ،  $ب \neq ٠$  .  
تسمى علاقة خطية بين المتغيرين  $س$  ،  $ص$  ، و يمكن  
إيجاد مجموعة من الأزواج المرتبة  $(س ، ص)$  تحقق هذه العلاقة  
فمثلاً :

لدراسة العلاقة :  $٣س + ص = ٢$   
نوجد الأزواج المرتبة بوضع قيمة  $س$  وإيجاد قيمة  $ص$  المناظرة  
أو العكس كما يلي :

$$\text{بوضع } س = ٠ : \therefore ٣ \times ٠ + ص = ٢$$

$$\therefore ص = ٢ \quad \therefore (٠ ، ٢) \text{ يحقق العلاقة}$$

$$\text{بوضع } س = ١ : \therefore ٣ \times ١ + ص = ٢$$

$$\therefore ص = -١ \quad \therefore (١ ، -١) \text{ يحقق العلاقة}$$

$$\text{بوضع } س = -١ : \therefore ٣ \times -١ + ص = ٢$$

$$\therefore ص = ٥ \quad \therefore (-١ ، ٥) \text{ يحقق العلاقة}$$

و هكذا نجد أن هناك عدداً لا نهائى من الأزواج المرتبة  $(س ، ص)$   
التي تحقق هذه العلاقة  
ملاحظة :

يمكن كتابة العلاقة :  $٣س + ص = ٢$  كما يلي :  
 $ص = ٢ - ٣س$  أى : وضع أحد المتغيرين فى طرف مستقل  
ثم إيجاد الأزواج المرتبة التي تحقق هذه العلاقة

(٣) أوجد ثلاثة أزواج مرتبة تحقق كلاً من العلاقات التالية :

$$[١] س - ٢ ص = ٥$$

$$[٢] ٢س + ٥ ص = ١٠$$

أحمد الشنتوري

(٤) بين أي الأزواج المرتبة التالية يحقق العلاقة :  $٢س - ص = ١$   
كما بالمثال :

مثال : (١ ، ١)

نضع :  $س = ١$  ،  $ص = ١$

$$\therefore ٢س - ص = ١ - ١ \times ٢ = ١ - ٢ = -١$$

$\therefore$  (١ ، ١) يحقق العلاقة

[١] (٣ ، ٥)

[٢] (٥ ، ٣)

[٣] (٢ - ، ٥ -)

(٥) اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة :

[١] إذا كان : (١ ، ٢ -) يحقق العلاقة :  $٣س + ٤ص = ١$

فإن :  $٤ = \dots$

[ ٥ - ، ٥ ، ٧ - ، ٧ ]

[٢] إذا كان : (٥ - ، ٢) يحقق العلاقة :  $٣س - ص + ٤ = ٠$

فإن :  $٤ = \dots$

[ ١١ - ، ١١ ، ١ - ، ١ ]

[٣] إذا كان : (٢ ، ٤) يحقق العلاقة :  $٥س - ص = ٦$

فإن :  $٤ = \dots$

[ ٢ - ، ١ - ، ٢ ، ١ ]

[٤] الزوج المرتب الذي يحقق العلاقة :  $٢س + ص = ٥$

هو ....

[ (٣ - ، ١) ، (٣ ، ١) ، (١ ، ٣) ، (٣ ، ١ -) ]

[٥] الزوج المرتب الذي يحقق العلاقتين :  $٢س + ص = ٥$  ،

$٢س + ص = ٧$  معاً هو ....

[ (٣ - ، ٢) ، (٢ ، ٣) ، (٣ ، ٢) ، (٣ ، ٢ -) ]

[٦] الجدول التالي يبين

العلاقة بين  $س$  ،

$ص$  و هي ....

[  $ص = ٧ + س$  ،  $ص = ٧ - س$  ،

$ص = ٣س + ١$  ،  $ص = ٣س + ١$  ]




## التمثيل البياني للعلاقة بين متغيرين

العلاقة :  $p = s + b$  حيث :  $p \neq 0$  ،  $b \neq 0$   
تسمى علاقة خطية بين المتغيرين  $s$  ،  $v$  و يمثلها بيانياً خط مستقيم  
فمثلاً :

لتمثيل العلاقة :  $3s = v + 2$  بيانياً  
نوجد ثلاثة أزواج مرتبة تحقق هذه العلاقة كما سبق و يمكن وضعها في جدول كالتالي :

س	٠	١	١ -
ص	٢	١ -	٠

و نعين في النظام  
الإحداثي المتعامد النقط  
التي تمثل الأزواج  
المرتبة :  $(2, 0)$  ،  
 $(1, 1)$  ،  
 $(0, 1 -)$



ونرسم الخط المستقيم  
المر بها فيكون هو  
التمثيل البياني لهذه  
العلاقة  
( الخط المستقيم باللون  
الأزرق يمثل العلاقة )  
لاحظ أن :

جميع نقط المستقيم الممثل  
للعلاقة تعين أزواج مرتبة تحقق هذه العلاقة

أحمد الشنتوري

## حالات خاصة :

(١) إذا كان :  $p = 0$  .

فتصبح العلاقة على الصورة :

$$b = v$$

فمثلاً :

$$3 = v$$

$$أي : v = \frac{3}{1}$$

يمثلها الخط المستقيم باللون الأحمر

و هو يمر بالنقطة  $(\frac{3}{1}, 0)$

و يكون موازياً لمحور السينات

ملاحظة : العلاقة :  $v = 0$  . يمثلها محور السينات

(٢) إذا كان :  $b = 0$  .

فتصبح العلاقة على الصورة :

$$p = s$$

فمثلاً :

$$1 - = s$$



$$أي : s = 1 -$$

يمثلها الخط المستقيم باللون الأخضر


و هو يمر بالنقطة  $(0, 1 -)$

و يكون موازياً لمحور الصادات

ملاحظة : العلاقة :  $s = 0$  . يمثلها محور الصادات



أحمد الشنتوري




أحمد الشنتوري

ملاحظات :

- (١) يمكن تكوين الجدول مباشرة
- (٢) يمكن إيجاد نقطة تقاطع المستقيم الممثل للعلاقة :  

$$٣س + ٢ص = ٦$$
 مع محور السينات بوضع :  $ص = ٠$   
 ، و مع محور الصادات بوضع :  $س = ٠$   
**فمثلاً :** العلاقة :  $٣س + ٢ص = ٦$   
 بوضع :  $ص = ٠$  ينتج :  $٣س = ٦$   
 ∴ نقطة تقاطع المستقيم مع محور السينات هي ( ٢ ، ٠ )  
 بوضع :  $س = ٠$  ينتج :  $٢ص = ٦$   
 ∴ نقطة تقاطع المستقيم مع محور الصادات هي ( ٠ ، ٣ )

أحمد الشنتوري



(٣) إذا كان :  $ص = ٠$   
 فتصبح العلاقة على الصورة :

$$٣س + ٢(٠) = ٦$$

فمثلاً :

$$٣س = ٦$$

$$س = ٢$$

أي :  $ص = ٢ - ٣س$ 

يمثلها الخط المستقيم باللون البنّي

و هو يمر بنقطة الأصل ( ٠ ، ٠ )

كما بالشكل المقابل :

س	٠	١	-١
ص	٣	٢	١

(٦) مثل بيانياً العلاقة :  $٣س = ٢ص - ٦$ 

- |               |                      |
|---------------|----------------------|
| بوضع س = .... | ∴ $٣س = ٢(....) - ٦$ |
| ∴ $ص = ....$  | ∴ يحقق العلاقة       |
| بوضع س = .... | ∴ $٣س = ٢(....) - ٦$ |
| ∴ $ص = ....$  | ∴ يحقق العلاقة       |
| بوضع س = .... | ∴ $٣س = ٢(....) - ٦$ |
| ∴ $ص = ....$  | ∴ يحقق العلاقة       |


س	٠	١	-١
ص	٣	٢	١

أحمد الشنتوري




(٩) ارسم المستقيم الممثل للعلاقة :  $٢س + ٣ص = ٦$  ، و إذا كان هذا المستقيم يقطع محور السينات في النقطة  $٨$  ، و يقطع محور الصادات في النقطة  $ب$  ، أوجد مساحة المثلث و  $٨$  ب حيث ( و ) نقطة الأصل

س	.	....	....
ص	....	.	....



(٧) أوجد نقط تقاطع المستقيم :  $٢س - ص = ٤$  مع محوري الإحداثيات ثم أرسم هذا المستقيم

س	.	....	....
ص	....	.	....



(٨) إذا كان المستقيم الممثل للعلاقة :  $٢س - ص = ٨$  يقطع محور السينات في النقطة ( ٣ ، ٢ ) أوجد قيمة كل من :  $٨$  ، ٢



## الدرس الثاني : ميل الخط المستقيم و تطبيقات حياتية

تمهيد :

إذا تحركت نقطة على خط مستقيم  
ل من الموضع م (س<sub>١</sub> ، ص<sub>١</sub>)  
إلى الموضع ب (س<sub>٢</sub> ، ص<sub>٢</sub>)  
حيث : س<sub>٢</sub> < س<sub>١</sub> ، و كل من  
م ، ب ∈ المستقيم ل فإن :  
(١) التغير في الإحداثي السيني

$$= س_٢ - س_١$$

و يسمى بالتغير الأفقي

(٢) التغير في الإحداثي الصادي = ص<sub>٢</sub> - ص<sub>١</sub>

و يسمى بالتغير الرأسى

(من الممكن أن يكون موجباً أو سالباً أو مساوياً للصفر)

(٣) النسبة بين التغير في الإحداثي الصادي و التغير في الإحداثي السيني

تسمى ميل الخط المستقيم و يرمز له بالرمز ( م )

مما سبق نستنتج :

$$\text{ميل الخط المستقيم} = \frac{\text{التغير في الإحداثي الصادي}}{\text{التغير في الإحداثي السيني}} = \frac{\text{التغير الرأسى}}{\text{التغير الأفقى}}$$

$$م = \frac{ص_٢ - ص_١}{س_٢ - س_١} \quad \text{حيث : } س_٢ < س_١$$

الحالات المختلفة للتغير الرأسى ( ص<sub>٢</sub> - ص<sub>١</sub> ) :

(١) إذا كانت : م (٢ ، ١) ،

ب (٣ ، ٤) فإن :

$$\text{ميل } \vec{MP} = \frac{٢ - ٣}{١ - ٤} = \frac{١}{٣}$$

نلاحظ :



(١) تحركت نقطة م على

الخط المستقيم لأعلى

لتصل إلى نقطة ب

(٢) ص<sub>٢</sub> < ص<sub>١</sub> أى أن : ص تزداد بزيادة س

(٣) ميل المستقيم = عدد موجب ( ٢ &lt; ٠ )



(٢) إذا كانت : م (٤ ، ٠) ،

ب (١ ، ٢) فإن :

$$\text{ميل } \vec{MP} = \frac{٤ - ١}{٠ - ٢} = -\frac{٣}{٢}$$

نلاحظ :

(١) تحركت نقطة م على

الخط المستقيم لأسفل

لتصل إلى نقطة ب

(٢) ص<sub>٢</sub> > ص<sub>١</sub> أى أن : ص تقل بزيادة س

(٣) ميل المستقيم = عدد سالب ( ٢ &gt; ٠ )

(١) أوجد ميل الخط المستقيم المار بكل نقطتين مما يلي :

[١]  $P(1, 1)$  ،  $B(2, 4)$

[٢]  $P(0, 3)$  ،  $B(0, 6)$

[٣]  $P(2, -2)$  ، نقطة الأصل

[٤]  $P(-1, 3)$  ،  $B(-2, 4)$

[٣] إذا كانت :  $P(-1, 2)$  ،

$B(3, 2)$  فإن :

$$\text{ميل } \vec{PB} = \frac{2-2}{(1)-3} = \frac{0}{-2} = 0$$

نلاحظ : (١) تحركت نقطة  $P$  أفقياً لتصل إلى نقطة  $B$

(٢)  $s_1 = s_2$

أي أن :  $s$  ثابتة بتغير  $s$

(٣) ميل المستقيم  $= 0$  (  $m = 0$  )

أي أن : ميل المستقيم الموازي لمحور السينات  $= 0$

[٤] إذا كانت :  $P(1, 2)$  ،

$B(2, 4)$  فإن :

لا يمكن حساب الميل لأن تعريف الميل يشترط وجود تغير في الإحداثي السيني



أي :  $s_1 - s_2 \neq 0$

نلاحظ : (١) تحركت نقطة  $P$  رأسياً لتصل إلى نقطة  $B$

(٢)  $s_1 = s_2$

(٣) ميل المستقيم غير معرف

أي أن : ميل المستقيم الموازي لمحور الصادات غير معرف



أحمد الشنتوري

(٢) إذا كان : ميل المستقيم المار بالنقطتين  $(-1, 1)$  ،  $(6, 6)$  ،  
يساوي 0 أوجد قيمة : س

(٤) إذا كان : ميل المستقيم المار بالنقط  $(3, -1)$  ،  $(6, 1)$  ،  
(٩، ص) يساوي  $\frac{2}{3}$  أوجد قيمة كل من : س ، ص

أحمد الشنتوري

(٣) إذا كان : ميل المستقيم المار بالنقطتين  $(1, ص)$  ،  $(-1, 0)$  ،  
يساوي  $\frac{3}{4}$  أوجد قيمة : ص

(٥) إذا كان :  $P(2, -1)$  ،  $B(3, 2)$  ،  $C(4, 0)$  أوجد ميل كل  
من  $\overrightarrow{PB}$  ،  $\overrightarrow{BC}$  ،  $\overrightarrow{CP}$  ثم أذكر ماذا تلاحظ ؟




(٦) إذا كان المستقيم المار بالنقطتين  $(٢, ٤)$  ،  $(٣, ٧)$  يوازي محور السينات أوجد قيمة :  $٧$

(٨) أوجد ميل المستقيم  $\vec{AB}$  حيث :  $A(-١, ٣)$  ،  $B(٢, ٥)$  ثم بين ما إذا كانت النقطة  $C(٨, ١)$  تقع على  $\vec{AB}$  أم لا ؟

أحمد الشنتوي

(٧) أثبت أن ميل المستقيم المار بالنقطتين  $(١, ١)$  ،  $(٢, ١)$  يساوي ميل المستقيم المار بالنقطتين  $(٣, ٣)$  ،  $(٢, -٧)$



(٩) في الشكل المقابل :  
 $\vec{AB}$  د مثلث ، أكمل  
 باستخدام أحد الكلمات :  
 ( موجب ، سالب ،  
 صفر ، غير معرف )

[١] ميل  $\vec{AB}$  ....

[٢] ميل  $\vec{BC}$  ....

[٣] ميل  $\vec{AC}$  ....

[٤] ميل  $\vec{AB}$  ....

(٣) ميل  $\overrightarrow{AB} = \frac{20 - 20}{2 - 2} =$  صفر و هو يعنى أن رأس مال الشركة

كان ثابتاً خلال السنتين الثالثة و الرابعة

(٤) ميل  $\overrightarrow{AC} = \frac{20 - 30}{2 - 1} = -10$  و هو يعبر عن تناقص رأس مال

الشركة خلال السنتين الأخيرتين بمعدل 10 آلاف جنيه  
( أى : 10 آلاف جنيه لكل سنة )

(٥) رأس مال الشركة عند بدء العمل = الإحداثى الصادى عند P  
= 20 ألف جنيه

ملاحظات :

(١) إذا كان : الميل موجب فإن : معدل التغير يتزايد

(٢) إذا كان : الميل سالب فإن : معدل التغير يتناقص

(٣) إذا كان : الميل = صفر فإن : معدل التغير ثابت

(٤) تمثل العلاقة بين المتغيرين فى الربع الأول على الشبكة التربيعية المتعامدة

(٥) إذا كان الميل موجب و قطع المستقيم محور الصادات فى النقطة

( ٠ ، ص ) فإن : ص تعبر عن القيمة الابتدائية ( الصغرى ) للمتغير ص

(٦) إذا كان الميل سالب و قطع المستقيم محور الصادات فى النقطة

( ٠ ، ص ) فإن : ص تعبر عن القيمة النهائية ( العظمى ) للمتغير ص

تطبيقات حياتية على ميل الخط المستقيم :  
نعلم أن :

إذا كانت هناك علاقة خطية بين متغيرين س ، ص فإن :

ميل الخط المستقيم الذى يمثل هذه العلاقة =  $\frac{\text{التغير فى الإحداثى الصادى}}{\text{التغير فى الإحداثى السينى}}$

أى أن : ميل الخط المستقيم ( م ) يعبر عن معدل التغير فى ص بالنسبة إلى س

و يوجد فى حياتنا العديد من التطبيقات الحياتية كتطبيق على العلاقة بين متغيرين و التى نحتاج فيها لمعرفة معدل التغير مثل :  
التغير فى حركة سيارة أو دراجة - التغير فى استهلاك الوقود -  
التغير فى رأس مال إحدى الشركات .... الخ

تطبيق (١) : الشكل المقابل

يوضح تغير رأس مال شركة خلال 7 سنوات و منه نلاحظ :

(١) P = ( 20 ، 0 ) ، B = ( 20 ، 2 )


، C = ( 20 ، 4 ) ، E = ( 30 ، 6 )

(٢) ميل  $\overrightarrow{AB} = \frac{20 - 20}{2 - 2} = 10$

و هو يعبر عن تزايد رأس مال الشركة خلال أول

سنتين بمعدل 10 آلاف جنيه

( أى : 10 آلاف جنيه لكل سنة )





[٤] القطعة المستقيمة الأفقية تبين توقف الدراجة لمدة ساعة بعد أن

تحركت مسافة ٥. كم ، ثم تبدأ رحلة العودة

[٥] المسافة الكلية = ١٠. كم ، و الزمن الكلي = ١. ث

[٦] السرعة المتوسطة للدراجة خلال الرحلة كلها =  $\frac{\text{المسافة الكلية}}{\text{الزمن الكلي}}$

$$= \frac{10}{1} = 10 \text{ كم / س}$$

ملاحظات :

(١) إذا كانت السيارة أو الدراجة أو .... تقطع مسافات متساوية في

أزمنة متساوية فإنها تتحرك بسرعة منتظمة و الذي يحددها ميل

المستقيم الذي يمثل العلاقة بين السرعة و الزمن أى أن :

السرعة المنتظمة للسيارة (ع) = معدل التغير في المسافة (ف)


بالنسبة للزمن (س) = ميل المستقيم (٢)

، و إذا كانت هذه العلاقة لا تمثل خط مستقيم واحد بل عدة قطع

مستقيمة فإن :

$$\frac{\text{المسافة الكلية}}{\text{الزمن الكلي}} = \text{السرعة المتوسطة}$$

تطبيق (٣) :



ملأ شخص خزان سيارته بالوقود و سعة

هذا الخزان ٤. لتراً و بعد أن تحرك

١٢. كم وجد أن المؤشر يوضح أن

المتبقى  $\frac{3}{4}$  الخزان

لرسم الشكل البياني الذي يوضح العلاقة بين كمية الوقود بالخزان و المسافة التي قطعها السيارة

(٧) إذا كان الميل موجب و قطع المستقيم محور السينات في النقطة

(س ، ٠) فإن : س تعبر عن القيمة الابتدائية (الصغرى)

للمتغير س

(٨) إذا كان الميل سالب و قطع المستقيم محور السينات في النقطة

(س ، ٠) فإن : س تعبر عن القيمة النهائية (العظمى)

للمتغير س

تطبيق (٢) : الشكل المقابل :

يوضح حركة دراجة حيث الزمن س

بالساعة ، و المسافة ف بالكيلو متر

بين مدينتين ذهاباً و عودة

و منه نلاحظ :

[١]  $(٠, ٠) = ب$  ،  $(٥, ٤) = ب$

،  $(٥, ٦) = د$  ،

$(٠, ١٠) = ع$

[٢] السرعة المنتظمة للدراجة خلال رحلة الذهاب = ميل  $\overrightarrow{ب د}$

$$= \frac{٠ - ٥}{٦ - ٤} = -١٢,٥ \text{ كم / س}$$


[٣] السرعة المنتظمة للدراجة خلال رحلة العودة = ميل  $\overrightarrow{د ع}$

$$= \frac{٠ - ٠}{١٠ - ٥} = ٠ \text{ كم / س}$$

و الإشارة السالبة تعنى أن الدراجة تتحرك في عكس اتجاه حركتها

الأولى بسرعة ١٠ كم / س



رأس المال  
بالآلاف الجنيهات

(١) الشكل المقابل :

يوضح تغير رأس مال  
شركة خلال ٨ سنوات  
أكمل ما يلي :

$$P = ( \dots , \dots )$$

$$B = ( \dots , \dots )$$

$$C = ( \dots , \dots )$$

$$E = ( \dots , \dots )$$

$$[2] \text{ ميل } \overrightarrow{PB} =$$

$$\dots = \frac{\dots - \dots}{\dots - \dots}$$

و هو يعبر عن ....

$$[3] \text{ ميل } \overrightarrow{BC} = \dots = \frac{\dots - \dots}{\dots - \dots}$$

و هو يعبر عن ....


$$[4] \text{ ميل } \overrightarrow{CE} = \dots = \frac{\dots - \dots}{\dots - \dots}$$

و هو يعبر عن ....

[5] رأس مال الشركة عند بدء العمل = الإحداثي الصادي عند ....

= .... ألف جنيه

أحمد الشنتوي

كمية الوقود  
( لتر )

حيث العلاقة خطية نلاحظ أن :

(١) عند البدء :  $P = (0, 4)$ 

أى أن : المسافة المقطوعة

( ف ) = . كم ، و كمية

الوقود المتبقية = ٤ لتر

(٢) بعد قطع مسافة ١٢ كم

:  $B = (12, 3)$ 

أى أن : ف = ١٢ كم

، و كمية الوقود

المتبقية = ٣ لتر

$$\text{و يكون : ميل } \overrightarrow{PB} = \frac{4 - 3}{0 - 12} = -\frac{1}{12}$$

و هذا يعنى أن كمية الوقود تتناقص بمعدل لتر واحد كل ١٢ ساعة


(٣) يفرغ الخزان عندما تقطع السيارة مسافة =  $\frac{\text{كمية الوقود}}{\text{معدل النقص}}$

$$= \frac{4}{\frac{1}{12}} = 48 \text{ كم}$$

،  $\overrightarrow{PB}$  يقطع المحور الأفقى ( محور المسافة ) فى النقطة  $(0, 48)$

## (٢) الشكل المقابل :

يوضح العلاقة بين المسافة بالكيلومتر و الزمن بالساعة لحركة سيارة بين مدينتين ذهاباً و عودة  
أكمل ما يلي :



[١]  $P = ( \dots , \dots )$  ،

ب =  $( \dots , \dots )$  ،

ح =  $( \dots , \dots )$  ،

ع =  $( \dots , \dots )$

[٢] السرعة المنتظمة للسيارة خلال رحلة الذهاب = ميل  $\vec{P}$  ب

$$= \frac{\dots - \dots}{\dots - \dots} = \dots \text{ كم / س}$$

[٣] المسافة الكلية خلال رحلة العودة = ... كم

[٤] الزمن الكلي خلال رحلة العودة = ... ساعة


[٥] سرعة المتوسطة للسيارة خلال رحلة العودة =  $\frac{\text{المسافة الكلية}}{\text{الزمن الكلي}}$

$$= \frac{\dots}{\dots} = \dots \text{ كم / س}$$

[٦] القطعة المستقيمة الأفقية بالشكل تدل على ...

(٣)

ملأ محمد خزان سيارته بالوقود الشكل المقابل يمثل العلاقة بين العلاقة بين الزمن بالساعة و كمية الوقود المتبقية بالتر  
أكمل ما يلي :



[١] أكبر سعة للخزان = ... لتر

[٢] يفرغ الخزان بعد مرور ... ساعة

[٣] بعد مرور ١٥ ساعة

يتبقى بالخزان ... لتر (ساعة)

[٤] يتبقى بالخزان ١٠ لتر بعد مرور ... ساعة

[٥]  $P = ( \dots , \dots )$  ، ب =  $( \dots , \dots )$

[٦] ميل  $\vec{P}$  ب =  $\frac{\dots - \dots}{\dots - \dots} = \dots$

[٧] معدل استهلاك الوقود في الساعة الواحدة = ... لتر / ساعة

أحمد الشنتوري



[٢] عمق البئر قبل بدء عمل الحفار = .... متر

[٣] عمق البئر بعد انتهاء عمل الحفار = .... متر

[٣] الزمن الكلي الذي أستغرقه الحفار في الحفر = .... ساعات

[٤] ميل  $\vec{AB}$  =  $\frac{\text{....} - \text{....}}{\text{....} - \text{....}}$  = ....

[٨] متوسط العمق الذي يحفره الحفار في الخمس ساعات الأولى

= .... متر / ساعة

[٦] ميل  $\vec{CD}$  =  $\frac{\text{....} - \text{....}}{\text{....} - \text{....}}$  = ....

[٧] متوسط العمق الذي يحفره الحفار في الساعتين الأخيرتين

= .... متر / ساعة

(٦) قرأ شخص جزءاً من كتاب عدد صفحاته ٦٠ صفحة فإذا كانت العلاقة

التي تربط عدد الصفحات المتبقية (ص) ، و الزمن اللازم لقراءتها

(ن) بالدقيقة تتعين بالعلاقة :  $ص = ٣٠ - \frac{١}{٢}ن$

أكمل ما يلي :

[١] عدد الصفحات التي سبق لهذا الشخص قراءتها = .... صفحة

[٢] الزمن اللازم لقراءة بقية الصفحات = .... دقيقة

(٤) تقرأ سهير كتاب ، و الشكل المقابل يمثل

العلاقة بين الزمن بالساعة و عدد الصفحات المتبقية أكمل ما يلي :

[١] عدد صفحات الكتاب المتبقية عند

بداية القراءة = .... صفحة

[٢]  $P = ( \text{....} , \text{....} )$  ،

$B = ( \text{....} , \text{....} )$

[٣] ميل  $\vec{PB}$  =  $\frac{\text{....} - \text{....}}{\text{....} - \text{....}}$  = ....

[٤] معدل الصفحات المقرؤة في الساعة الواحدة = .... صفحة / ساعة

و يعني ....

[٥] تنهى سهير قراءة الكتاب بعد .... ساعات

(٥) أستأجر مزارع حفاراً ليستكمل حفر بئر

و الشكل المقابل يوضح العلاقة بين عمق

البئر بالمتر و الزمن بالساعة

أكمل ما يلي :



[١]  $P = ( \text{....} , \text{....} )$  ،

$B = ( \text{....} , \text{....} )$  ،

$C = ( \text{....} , \text{....} )$  ،

$E = ( \text{....} , \text{....} )$

أحمد الشنتوي





## العمليات على الأعداد الحقيقية

### تدريبات

أكمل ما يأتي

(١) المحايد الجمعي في ح هو صفر

(٢) المحايد الضربي في ح هو ١

$$\overline{٥}٦ = \overline{٥}٤ + \overline{٥}٢ \quad (٣)$$

$$\overline{٣}٥ = \overline{٣}٤ + \overline{٣} \quad (٤)$$

$$\overline{٥}٤ + ٦ = \overline{٥}٤ + ٦ \quad (٥)$$

$$\overline{٧}٤ + \overline{٥}٢ = \overline{٧}٤ + \overline{٥}٢ \quad (٦)$$

$$\overline{٥}٦ - \overline{٢}٣ - \overline{٥}٤ + \overline{٢}٧ = \overline{٥}٢ - \overline{٢}٤ =$$

$$\overline{٢}٣ + \overline{٢}٣ + \overline{٢}٥ + \overline{٢}٧ = \overline{٢}٨ + \overline{٢}٩ =$$

(٩) المعكوس الجمعي للعدد  $(\overline{٥} - \overline{٢})$

$$\overline{٥} + \overline{٢} - = (\overline{٥} - \overline{٢}) - = \overline{٢} - \overline{٥} =$$

$$٥ = \overline{٢٥} = \overline{٥} \times \overline{٥} \quad (١٠)$$

$$\overline{٣٥} = \overline{٧} \times \overline{٥} \quad (١١)$$

$$\overline{١٠}٦ - = \overline{٢}٣ \times \overline{٥}٢ - \quad (١٢)$$

$$\overline{٧}٤ = \overline{٧} \times ٤ \quad (١٣)$$

$$\overline{١٠}٣ - = \overline{٢}٣ \times \overline{٥}٢ - \quad (١٤)$$

١٠

أكتب ما يأتي بحيث يكون المقام عدداً صحيحاً

$$\frac{(\overline{٥} - \overline{٢})}{\overline{٥}}, \frac{\overline{٣}}{\overline{٥}٢}, \frac{٥-}{\overline{٣}}, \frac{٥}{\overline{٢}}$$

$$\frac{\overline{٢}٥}{٢} = \frac{\overline{٢} \times ٥}{\overline{٢} \times \overline{٢}} = \frac{٥}{\overline{٢}} \quad (١)$$

$$\frac{\overline{٣}٥-}{٣} = \frac{\overline{٣} \times ٥-}{\overline{٣} \times \overline{٣}} = \frac{٥-}{\overline{٣}} \quad (٢)$$

$$\frac{\overline{١٥}}{١٠} = \frac{\overline{٥} \times \overline{٣}}{\overline{٥} \times \overline{٢}} = \frac{\overline{٣}}{\overline{٢}} \quad (٣)$$

$$\frac{\overline{٥} \times (\overline{٥} - \overline{٢})}{\overline{٥} \times \overline{٥}} = \frac{(\overline{٥} - \overline{٢})}{\overline{٥}} \quad (٤)$$

$$\frac{(\overline{٥} - \overline{١٠})}{٥} =$$

أكمل ما يأتي

$$(\overline{٥}٢ - \overline{٣}٤) \overline{٢}٣ \quad (١)$$

$$\overline{١٠}٦ - \overline{٦}١٢ =$$

$$(\overline{٣}٤ + \overline{٢}٥) \overline{٢}٣ \quad (٢)$$

$$\overline{٦}١٢ + ٣٠ =$$

$$(\overline{٧}٢ - \overline{٣}٣) \overline{٧} \quad (٣)$$

$$١٤ - \overline{٢}١٣ =$$

# العمليات على الجذور التربيعية

$$\sqrt{2} + \sqrt{8} \quad (١)$$

$$\sqrt{2} \times 3 = \sqrt{2} + \sqrt{2} \times 2 = \sqrt{2} + \sqrt{4 \times 2} =$$

$$\sqrt{3} \times 2 - \sqrt{12} \quad (٢)$$

$$\text{صفر} = \sqrt{3} \times 2 - \sqrt{3} \times 2 = \sqrt{3} \times 2 - \sqrt{4 \times 3} =$$

$$\sqrt{8} \times 3 + \sqrt{18} \times 2 - \sqrt{50} \times 3 \quad (٣)$$

$$\sqrt{4 \times 2} \times 3 + \sqrt{9 \times 2} \times 2 - \sqrt{25 \times 2} \times 3 =$$

$$\sqrt{2} \times 2 \times 3 + \sqrt{2} \times 3 \times 2 - \sqrt{2} \times 5 \times 3 =$$

$$\sqrt{2} \times 10 = \sqrt{2} \times 6 + \sqrt{2} \times 6 - \sqrt{2} \times 10 =$$

$$\sqrt{40} \times 2 + \sqrt{80} \times 4 - \sqrt{20} \times 3 \quad (٤)$$

$$\sqrt{9 \times 5} \times 2 + \sqrt{16 \times 5} \times 4 - \sqrt{5 \times 4} \times 3 =$$

$$\sqrt{5} \times 3 \times 2 + \sqrt{5} \times 4 \times 4 - \sqrt{5} \times 2 \times 3 =$$

$$\sqrt{5} \times 4 - = \sqrt{5} \times 6 + \sqrt{5} \times 16 - \sqrt{5} \times 6 =$$

$$(\sqrt{7} - \sqrt{2})(\sqrt{5} - \sqrt{3}) \quad (٤)$$

$$\sqrt{35} + \sqrt{10} - \sqrt{21} - \sqrt{6} =$$

$$(\sqrt{5} \times 2 - \sqrt{3})(\sqrt{5} \times 3 - \sqrt{3} \times 2) \quad (٥)$$

$$30 + \sqrt{15} \times 3 - \sqrt{15} \times 4 - 6 =$$

$$\sqrt{15} \times 7 - 36 =$$

$$(\sqrt{2} - \sqrt{7})(\sqrt{2} + \sqrt{7}) \quad (٦)$$

$$2 - \sqrt{14} + \sqrt{14} - 7 =$$

$$5 = 2 - 7 =$$

$$(\sqrt{2} \times 4 - \sqrt{5} \times 3)(\sqrt{2} \times 4 + \sqrt{5} \times 3) \quad (٧)$$

$$32 - \sqrt{10} \times 12 + \sqrt{10} \times 12 - 45 =$$

$$13 = 32 - 45 =$$

$$^2(\sqrt{2} - \sqrt{7}) \quad (٨)$$

$$2 + \sqrt{14} \times 2 - 7 =$$

$$\sqrt{14} \times 2 - 9 =$$

$$\sqrt{48} - 2(\sqrt{3} + 2) \quad (1)$$

$$\sqrt{16 \times 3} - 2 + \sqrt{3} \cdot 4 + 4 =$$

$$7 = \sqrt{3} \cdot 4 - \sqrt{3} \cdot 4 + 7 =$$

$$\frac{6}{\sqrt{2}} + \frac{1}{2} \sqrt{12} - \sqrt{2} \cdot 2 \quad (2)$$

$$\frac{\sqrt{2} \times 6}{\sqrt{2} \times \sqrt{2}} + \frac{2 \times 1 \sqrt{12}}{2} - \sqrt{16 \times 2} =$$

$$\frac{\sqrt{2} \cdot 6}{2} + \sqrt{2} \cdot 6 - \sqrt{2} \cdot 4 =$$

$$\sqrt{2} = \sqrt{2} \cdot 3 + \sqrt{2} \cdot 6 - \sqrt{2} \cdot 4 =$$

$$\frac{1}{5} \sqrt{5} - \sqrt{12} - \frac{1}{3} \sqrt{6} + \sqrt{5} \cdot 2 \quad (3)$$

$$\frac{5 \times 1 \sqrt{5}}{5} - \sqrt{4 \times 3} - \sqrt{3 \times 1} \frac{6}{3} + \sqrt{5} \cdot 2 =$$

$$\sqrt{5} = \sqrt{5} - \sqrt{2} \cdot 2 - \sqrt{2} \cdot 2 + \sqrt{5} \cdot 2 =$$

$$\sqrt{5} \frac{1}{3} = \frac{\sqrt{5}}{3} = \frac{\sqrt{5}}{9 \sqrt{1}} = \frac{5}{9} \sqrt{1} \quad (1)$$

$$\frac{\sqrt{3} \cdot 4}{3} = \frac{\sqrt{3}}{\sqrt{3}} \times \frac{4}{\sqrt{3}} = \frac{\sqrt{12}}{\sqrt{3}} = \frac{16}{3} \sqrt{1} \quad (2)$$

$$3 = \sqrt{9} = \frac{18}{2} \sqrt{1} = \frac{18 \sqrt{1}}{2 \sqrt{1}} \quad (3)$$

$$\sqrt{2} \cdot 2 = \sqrt{4 \times 3} = \sqrt{12} = \frac{144}{7} \sqrt{1} = \frac{144 \sqrt{1}}{7 \sqrt{1}} \quad (4)$$

$$\sqrt{3} \frac{6}{3} = \frac{3}{9} \sqrt{6} = \frac{3 \times 1}{3 \times 3} \sqrt{6} = \frac{1}{3} \sqrt{6} \quad (5)$$

$$\sqrt{2} \cdot 2 =$$

$$\sqrt{2} \cdot 2 = \sqrt{3 \times 1} \frac{6}{3} = \frac{1}{3} \sqrt{6} \quad (6)$$

$$\sqrt{10} \frac{3}{5} = \sqrt{5 \times 2} \frac{3}{5} = \frac{2}{5} \sqrt{3} \quad (7)$$

$$\sqrt{3} \frac{1}{3} = \sqrt{3 \times 1} \frac{1}{3} = \frac{1}{3} \sqrt{1} \quad (8)$$



$$(٣) \text{ إذا كانت } \frac{8}{\sqrt{3}-\sqrt{5}} =$$

$$ص، \frac{\sqrt{3}-2}{\sqrt{3}+2} =$$

أكتب س، ص بحيث يكون المقام عدداً نسبياً ثم  
أوجد س + ص

أولاً يجب تبسيط كلاً من س، ص بضرب كل منهما  
في مرافق مقامه

$$س = \frac{(\sqrt{3}+\sqrt{5})}{(\sqrt{3}+\sqrt{5})} \times \frac{8}{(\sqrt{3}-\sqrt{5})}$$

$$س = \frac{(\sqrt{3}+\sqrt{5})^8}{2} = \frac{(\sqrt{3}+\sqrt{5})^8}{3-5}$$

$$س = (\sqrt{3}+\sqrt{5})^4 = (\sqrt{3}+\sqrt{5})^4 = \sqrt{3}^4 + \sqrt{5}^4 =$$

$$ص = \frac{(\sqrt{3}-2)}{(\sqrt{3}-2)} \times \frac{(\sqrt{3}-2)}{(\sqrt{3}+2)}$$

$$ص = \frac{\sqrt{3}^4 - 2^4}{1} = \frac{3 + \sqrt{3}^4 - 4}{3-4}$$

$$ص = \sqrt{3}^4 - 2^4 =$$

$$س + ص = \sqrt{3}^4 - 2^4 + \sqrt{3}^4 + \sqrt{5}^4 =$$

$$ص + \sqrt{5}^4 =$$

## العددان المترافقان

إذا كان  $p, b$  عددين نسبيين موجبين فإن  
( $\sqrt{b} + \sqrt{p}$ )، ( $\sqrt{b} - \sqrt{p}$ )  
يسميان عددان مترافقان و يعتبر كلاً منهما  
مرافقاً للآخر و يكون حاصل ضربهما  
 $b - p =$  عدد نسبي

## تدريبات

(١) أكتب المرافق لكل مما يأتي

$$(١) (\sqrt{5} + \sqrt{2}) \text{ المرافق } (\sqrt{5} - \sqrt{2})$$

$$(٢) (\sqrt{7} - \sqrt{3}) \text{ المرافق } (\sqrt{7} + \sqrt{3})$$

$$(٣) (\sqrt{4} - \sqrt{5}) \text{ المرافق } (\sqrt{4} + \sqrt{5})$$

$$(٤) (\sqrt{7} + \sqrt{3}) \text{ المرافق } (\sqrt{7} - \sqrt{3})$$

$$(٥) (\sqrt{8} - \sqrt{7}) \text{ المرافق } (\sqrt{8} + \sqrt{7})$$

(٢) أكتب ما يأتي بحيث يكون المقام عدداً نسبياً

$$(١) \frac{2}{(\sqrt{5} - \sqrt{7})}$$

$$\frac{(\sqrt{5} + \sqrt{7})}{(\sqrt{5} + \sqrt{7})} \times \frac{2}{(\sqrt{5} - \sqrt{7})}$$

$$= \frac{(\sqrt{5} + \sqrt{7})^2}{2} \times \frac{(\sqrt{5} + \sqrt{7})^2}{5-7}$$

$$= (\sqrt{5} + \sqrt{7}) =$$

(٥) إذا كانت  $\sqrt{5} + \sqrt{7} = س$  ،  $\frac{2}{س} = ص$  ،

أوجد قيمة  $\frac{س + ص}{س ص}$

$$ص = \frac{2}{س} = \frac{2}{(\sqrt{5} + \sqrt{7})}$$

$$ص = \frac{(\sqrt{5} - \sqrt{7})}{(\sqrt{5} - \sqrt{7})} \times \frac{2}{(\sqrt{5} + \sqrt{7})}$$

$$ص = \frac{(\sqrt{5} - \sqrt{7})^2}{2} \times \frac{2}{5 - 7}$$

$$ص = (\sqrt{5} - \sqrt{7})$$

$$س + ص = \sqrt{5} - \sqrt{7} + \sqrt{5} + \sqrt{7} = 2\sqrt{5}$$

$$س ص = (\sqrt{5} - \sqrt{7})(\sqrt{5} + \sqrt{7}) = 5 - 7 = -2$$

$$2 = 5 - 7 =$$

$$\sqrt{7} = \frac{2\sqrt{7}}{2} = \frac{س + ص}{س ص}$$

(٤) إذا كانت  $\frac{4}{(\sqrt{3} - \sqrt{7})} = س$

،  $\sqrt{3} - \sqrt{7} = ص$  ، اثبت أن س ، ص مترافقان  
ثم أوجد قيمة

$$س^2 - 2س ص + ص^2$$

$$س = \frac{(\sqrt{3} + \sqrt{7})}{(\sqrt{3} + \sqrt{7})} \times \frac{4}{(\sqrt{3} - \sqrt{7})}$$

$$س = \frac{(\sqrt{3} + \sqrt{7})^4}{4} = \frac{(\sqrt{3} + \sqrt{7})^4}{3 - 7}$$

$$س = (\sqrt{3} + \sqrt{7}) ، ص = (\sqrt{3} - \sqrt{7}) ::$$

∴ س ، ص مترافقان

$$س^2 (\sqrt{3} + \sqrt{7}) = س^2$$

$$21\sqrt{2} + 10 = 3 + 21\sqrt{2} + 7 =$$

$$ص^2 (\sqrt{3} - \sqrt{7}) = ص^2$$

$$21\sqrt{2} - 10 = 3 + 21\sqrt{2} - 7 =$$

$$س ص = (\sqrt{3} - \sqrt{7})(\sqrt{3} + \sqrt{7}) = 3 - 7 = -4$$

$$4 = 3 - 7 =$$

$$س^2 - 2س ص + ص^2$$

$$21\sqrt{2} - 10 + 4 \times 2 - 21\sqrt{2} + 10 =$$

$$12 = 8 - 20 =$$

إختصر ما يأتي لأبسط صورة

$$\sqrt[3]{10} = \sqrt[3]{5} \times \sqrt[3]{2} \quad (1)$$

$$\sqrt[3]{12} = \sqrt[3]{4} \times \sqrt[3]{3} \quad (2)$$

$$\sqrt[3]{50} = \sqrt[3]{8 \times 5} = \sqrt[3]{40} \quad (3)$$

$$\sqrt[3]{27} = \sqrt[3]{27 \times 2} = \sqrt[3]{54} \quad (4)$$

$$\sqrt[3]{54} = \sqrt[3]{27 \times 2} = \sqrt[3]{54} \quad (5)$$

$$\sqrt[3]{27 \times 2} = \sqrt[3]{54} = \sqrt[3]{27} \times \sqrt[3]{2} = 3\sqrt[3]{2}$$

$$\sqrt[3]{27 \times 2} = \sqrt[3]{54} = \sqrt[3]{27} \times \sqrt[3]{2} = 3\sqrt[3]{2}$$

$$\sqrt[3]{27 \times 2} = \sqrt[3]{54} = \sqrt[3]{27} \times \sqrt[3]{2} = 3\sqrt[3]{2}$$

$$\sqrt[3]{27} = 3$$

$$\sqrt[3]{\frac{1}{4}} = \sqrt[3]{\frac{1}{4}} = \sqrt[3]{\frac{1}{4}} \quad (6)$$

$$\sqrt[3]{\frac{4 \times 4 \times 1}{4 \times 4 \times 4}} = \sqrt[3]{\frac{4}{4}} = \sqrt[3]{1} = 1$$

$$\sqrt[3]{\frac{16}{64}} = \sqrt[3]{\frac{16}{64}} = \sqrt[3]{\frac{16}{64}} = \sqrt[3]{\frac{1}{4}} = \sqrt[3]{\frac{1}{4}}$$

$$\sqrt[3]{\frac{16}{64}} = \sqrt[3]{\frac{16}{64}} = \sqrt[3]{\frac{16}{64}} = \sqrt[3]{\frac{1}{4}} = \sqrt[3]{\frac{1}{4}}$$

$$\sqrt[3]{\frac{16}{64}} = \sqrt[3]{\frac{16}{64}} = \sqrt[3]{\frac{16}{64}} = \sqrt[3]{\frac{1}{4}} = \sqrt[3]{\frac{1}{4}}$$

$$\sqrt[3]{\frac{16}{64}} = \sqrt[3]{\frac{16}{64}} = \sqrt[3]{\frac{16}{64}} = \sqrt[3]{\frac{1}{4}} = \sqrt[3]{\frac{1}{4}}$$

$$\sqrt[3]{\frac{16}{64}} = \sqrt[3]{\frac{16}{64}} = \sqrt[3]{\frac{16}{64}} = \sqrt[3]{\frac{1}{4}} = \sqrt[3]{\frac{1}{4}}$$

$$\sqrt[3]{1} = 1, \sqrt[3]{1} = 1 \quad (7)$$

$$\sqrt[3]{1} = 1, \sqrt[3]{1} = 1$$

$$\sqrt[3]{1} = 1, \sqrt[3]{1} = 1$$

$$\sqrt[3]{1} = 1, \sqrt[3]{1} = 1$$

$$\sqrt[3]{1} = 1, \sqrt[3]{1} = 1$$

$$\sqrt[3]{1} = 1, \sqrt[3]{1} = 1$$

$$\sqrt[3]{1} = 1, \sqrt[3]{1} = 1$$



## تطبيقات على الأعداد الحقيقية

أولاً المكعب إذا كان مكعب طول حرفه ل فإن

$$(1) \text{مساحة الوجه (على شكل مربع)} = \text{طول الضلع} \times \text{نفسه} = \text{ل} \times \text{ل} = \text{ل}^2$$

$$(2) \text{المساحة الجانبية للمكعب} = \text{مساحة الوجه} \times 4 = \text{ل}^2 \times 4 = 4\text{ل}^2$$

$$(3) \text{المساحة الكلية للمكعب} = \text{مساحة الوجه} \times 6 = \text{ل}^2 \times 6 = 6\text{ل}^2$$

$$(4) \text{حجم المكعب} = \text{طول الحرف} \times \text{نفسه} \times \text{نفسه} = \text{ل} \times \text{ل} \times \text{ل} = \text{ل}^3$$

$$\text{ثانياً (1) حجم الكرة} = \frac{4}{3}\pi \text{ر}^3$$

$$(2) \text{مساحة سطح الكرة} = 4\pi \text{ر}^2$$

$$\text{ثالثاً مساحة الدائرة} = \pi \text{ر}^2$$

$$\text{محيط الدائرة} = 2\pi \text{ر}$$

## رابعاً

$$(1) \text{حجم متوازي المستطيلات} = \text{الطول} \times \text{العرض} \times \text{الارتفاع}$$

$$(2) \text{حجم متوازي المستطيلات} = \text{مساحة القاعدة} \times \text{الارتفاع}$$

$$(3) \text{المساحة الجانبية لمتوازي المستطيلات} = \text{محيط القاعدة} \times \text{الارتفاع}$$

$$(4) \text{المساحة الكلية لمتوازي المستطيلات} = \text{المساحة الجانبية} + \text{مجموع مساحتي القاعدتين} = 2(\text{س ص} + \text{س ع} + \text{ص ع})$$

## رابعاً

$$(1) \text{حجم الإسطوانة} = \text{مساحة القاعدة} \times \text{الارتفاع} = \pi \text{ر}^2 \times \text{ع}$$

$$(3) \text{المساحة الجانبية للإسطوانة} = \text{محيط القاعدة} \times \text{الارتفاع} = 2\pi \text{ر} \times \text{ع}$$

$$(4) \text{المساحة الكلية للإسطوانة} = \text{المساحة الجانبية} + \text{مجموع مساحتي القاعدتين} = 2\pi \text{ر}^2 + 2\pi \text{ر} \times \text{ع}$$

## تدريبات

(1) دائرة مساحتها ٣٨ سم<sup>٢</sup> أوجد محيطها

$$\frac{22}{7} = \pi$$

$$\text{مساحة الدائرة} = \pi \text{ر}^2 = 38 \text{ و } 5$$

$$\frac{22}{7} \times \pi \text{ر}^2 = 38 \text{ و } 5 \text{ بضرب الطرفين في } \frac{7}{22}$$

$$\frac{7}{22} \times 38 \text{ و } 5 = \pi \text{ر}^2 \times \frac{7}{22} \times \frac{7}{22}$$

$$\pi \text{ر}^2 = 120.25 \text{ بايجاد الجذر التربيعي للطرفين}$$

$$\pi \text{ر} = \sqrt{120.25} = 3.5 \text{ سم}$$

$$\text{محيط الدائرة} = 2\pi \text{ر} = 2 \times \frac{22}{7} \times 3.5 = 22 \text{ سم}$$

(٦) متوازي مستطيلات قاعدته مربعة الشكل  
حجمه ٧٢٠ سم<sup>٣</sup> و ارتفاعه ٥ سم أوجد مساحته  
الكلية

$$\begin{aligned} \text{حجم متوازي المستطيلات} \\ &= \text{مساحة القاعدة} \times \text{الارتفاع} = ٧٢٠ \\ &= \text{مساحة القاعدة} \times ٥ = ٧٢٠ \\ \text{مساحة القاعدة} &= ٧٢٠ \div ٥ = ١٤٤ \text{ سم}^2 \\ \text{مساحة القاعدة (مربع)} &= \text{ل}^2 = ١٤٤ \\ \text{ل} &= \sqrt{١٤٤} = ١٢ \text{ سم} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{المساحة الكلية لمتوازي المستطيلات} \\ &= (٢ \text{ ص} + \text{س} \times \text{ع} + \text{ص} \times \text{ع}) \\ &= (٥ \times ١٢ + ٥ \times ١٢ + ١٢ \times ١٢) \\ &= ٥٢٨ \text{ سم}^2 \end{aligned}$$

(٧) إسطوانة دائرية قائمة طول نصف قطرها  
١٤ سم و ارتفاعها ٢٠ سم أوجد حجمها و مساحتها  
الكلية

$$\begin{aligned} \text{حجم الإسطوانة} &= \text{مساحة القاعدة} \times \text{الارتفاع} \\ &= \pi \times \text{نق}^2 \times \text{ع} = \pi \times ١٤^2 \times ٢٠ \\ &= ١٢٣٢٠ \text{ سم}^3 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{المساحة الجانبية للإسطوانة} \\ &= \text{محيط القاعدة} \times \text{الارتفاع} \\ &= ٢ \pi \times \text{نق} \times \text{ع} \\ &= ٢ \times \pi \times ١٤ \times ٢٠ = ١٧٦٠ \text{ سم}^2 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{المساحة الكلية للإسطوانة} \\ &= \text{المساحة الجانبية} + \text{مجموع مساحتي القاعدتين} \\ &= ٢ \pi \times \text{نق}^2 + ٢ \pi \times \text{نق} \times \text{ع} \\ &= ١٢٣٢٠ + ١٧٦٠ = ١٤٠٩٦ \text{ سم}^2 \end{aligned}$$

(٢) أوجد المساحة الكلية لمكعب حجمه ١٢٥ سم<sup>٣</sup>

حجم المكعب = ل<sup>٣</sup> = ١٢٥ بإيجاد الجذر التكعيبي  
للطرفين

$$\text{ل} = \sqrt[3]{١٢٥} = ٥ \text{ سم}$$

$$\begin{aligned} \text{المساحة الكلية للمكعب} \\ &= ٦ \text{ ل}^2 = ٦ \times ٥ \times ٥ = ١٥٠ \text{ سم}^2 \end{aligned}$$

(٣) أوجد طول حرف مكعب حجمه ٢  $\sqrt{٢}$  سم<sup>٣</sup>

$$\text{حجم المكعب} = \text{ل}^3 = ٢ \sqrt{٢}$$

$$\text{ل}^3 = \sqrt{٢} \times \sqrt{٢} \times \sqrt{٢}$$

$$\text{ل} = \sqrt[3]{٢ \sqrt{٢}} \text{ سم}$$

(٤) أوجد حجم مكعب مساحته الكلية ٢٩٤ سم<sup>٢</sup>

$$\text{المساحة الكلية للمكعب} = ٦ \text{ ل}^2 = ٢٩٤$$

$$\text{ل}^2 = ٢٩٤ \div ٦$$

$$\text{ل}^2 = ٤٩$$

$$\text{ل} = \sqrt{٤٩} = ٧ \text{ سم}$$

$$\text{حجم المكعب} = \text{ل}^3 = ٧^3 = ٣٤٣ \text{ سم}^3$$

(٥) أوجد حجم متوازي مستطيلات أبعاده

$$\sqrt{٢} \text{ سم} ، \sqrt{٣} \text{ سم} ، \sqrt{٦} \text{ سم}$$

حجم متوازي المستطيلات

$$= \text{الطول} \times \text{العرض} \times \text{الارتفاع}$$

$$= \sqrt{٢} \times \sqrt{٣} \times \sqrt{٦} = ٦ \text{ سم}^3$$





أوجد مجموعة حل كل من المتباينات الآتية في ح  
و مثل الحل على خط الأعداد


(١) س - ١  $\geq$  ٥ حيث س  $\geq$  ٥

س - ١  $\geq$  ٥ بإضافة ١ للطرفين

س - ١ + ١  $\geq$  ٥ + ١

س  $\geq$  ٦

م.ح في ح =  $[-6, \infty)$



(٢) ٢س + ٣ > ٧ حيث س  $\geq$  ٥


٢س + ٣ > ٧ بإضافة -٣ للطرفين

٢س + ٣ - ٣ > ٧ - ٣

٢س > ٤

$\frac{٢س}{٢} > \frac{٤}{٢}$   
س > ٢

م.ح في ح =  $(2, \infty)$



(٣) ٢س - ٥  $\leq$  ٥ حيث س  $\geq$  ٥


٢س - ٥  $\leq$  ٥ بإضافة ٥ للطرفين

٢س - ٥ + ٥  $\leq$  ٥ + ٥

٢س  $\leq$  ١٠ بقسمة الطرفين على ٢

$\frac{٢س}{٢} \leq \frac{١٠}{٢}$   
س  $\leq$  ٥

س  $\leq$  ٥



## حل المعادلات و المتباينات من الدرجة الأولى في متغير واحد في ح


أوجد مجموعة حل كل من المعادلات الآتية في ح  
و مثل الحل على خط الأعداد

(١) س³ - ٢ = ٦ بإضافة ٢ للطرفين

س³ - ٢ + ٢ = ٦ + ٢

س³ = ٨ بإيجاد الجذر التكعيبي للطرفين

س =  $\sqrt[3]{٨} = ٢$  م.ح في ح = { ٢ }




(٢) س +  $\sqrt{٣} = ١$  بإضافة -١ للطرفين

س +  $\sqrt{٣} - ١ = ١ - ١$


س =  $١ - \sqrt{٣}$

م.ح في ح = {  $١ - \sqrt{٣}$  }



طول الوتر =  $\frac{١+٣}{٢} = ٢$

طول ضلع القائمة =  $\frac{١-٣}{٢} = ١$



تابعنا على صفحتنا على الفيسبوك  
[www.facebook.com/ZakroolySite](http://www.facebook.com/ZakroolySite)

## العلاقة بين متغيرين

$P$   $S + B = V$  حيث  $P \neq 0$  ،  $B \neq 0$  صفر  
تسمى علاقة خطية بين المتغيرين  $S$  ،  $V$

(١) إذا كان الزوج المرتب (٢ ، ٦) يحقق العلاقة  
ص  $B = S$  احسب قيمة  $B$

$$\therefore V = B = S$$

$$\therefore 6 = B \times 2 \quad \text{بقسمة الطرفين على ٢}$$

$$\therefore B = 3 \quad \frac{B \times 2}{2} = \frac{6}{2}$$

(٢) إذا كان الزوج المرتب (١ ، ٢) يحقق العلاقة  
ص  $P + S = V$  احسب قيمة  $P$

$$\therefore V = S + P$$

$$\therefore 2 = P + 1$$

$$\therefore P = 1 \quad \therefore 1 - 2 = P$$

(٣) إذا كان الزوج المرتب (٣ ، ٤ -) يحقق العلاقة  
ص  $2 + S = B$  احسب قيمة  $B$

$$\therefore V = 2 + S = B$$

$$\therefore 4 - = 3 \times 2 + B$$

$$\therefore B = 4 - \quad \therefore B = 2$$

(٤) إذا كان الزوج المرتب (ج ، ٤) يحقق العلاقة  
ص  $3 - 2 = V = 10$  احسب قيمة ج

$$\therefore 3 - 2 = V = 10$$

$$\therefore 10 = 4 \times 2 - 3 \times J$$

$$\therefore 10 = 8 - 3J$$

$$\therefore 3J = 8 - 10$$

$$\therefore 3J = -2$$

$$\therefore J = -\frac{2}{3}$$

$$(٤) \quad 5 - 7 \geq 2 \quad \text{حيث } S \geq 0$$

$$5 - 7 \geq 2 \quad \text{بإضافة ٧ للطرفين}$$


$$5 - 7 \geq 2 - 7$$

$$5 - 7 \geq 5 - 7 \quad \text{بقسمة الطرفين على ٥ -}$$

$$\frac{5 - 7}{5 -} \leq \frac{5 - 7}{5 -}$$

$$S \leq 1$$

$$S \in ]-\infty, 1]$$



$$(٥) \quad 5 > 3 - 1 \geq 11 \quad \text{حيث } S \geq 0$$

$$5 > 3 - 1 \geq 11$$


$$\text{بإضافة ١ لجميع الأطراف}$$

$$5 + 1 > 3 - 1 + 1 \geq 11 + 1$$


$$6 > 3 \geq 12 \quad \text{بالقسمة على ٣}$$

$$\frac{6}{3} > \frac{3}{3} \geq \frac{12}{3}$$


$$2 < S \leq 4$$




$$S \in (2, 4]$$



(٧) مثل بيانياً  $ص = ٢$



(٨) مثل بيانياً  $ص = ٣$




(٥) أوجد ثلاثة أزواج مرتبة تحقق العلاقة  
 $ص = س + ٢$  و مثلها بيانياً

بفرض  $س = ٠$   
 $ص = ٢ + (٠) = ٢$   
(٢ ، ٠)

بفرض  $س = ١$   
 $ص = ٢ + (١) = ٣$   
(٣ ، ١)

بفرض  $س = ٢$   
 $ص = ٢ + (٢) = ٤$   
(٤ ، ٢)



(٦) أوجد ثلاثة أزواج مرتبة تحقق العلاقة  
 $ص = س + ٢$  و مثلها بيانياً

بفرض  $ص = ٠$   
 $س = ٢ + (٠) = ٢$   
(٢ ، ٠)

بفرض  $ص = ١$   
 $س = ٢ + (١) = ٣$   
(٣ ، ١)

بفرض  $ص = ٢$   
 $س = ٢ + (٢) = ٤$   
(٤ ، ٢)

(١٠) أوجد ثلاثة أزواج مرتبة تحقق العلاقة  
 $٢س - ص = ١$  و مثلها بيانياً

(عزل)

$$\begin{aligned} ٢س - ص &= ١ \\ -ص &= ١ - ٢س \\ -ص &= ١ - ٢س \end{aligned}$$

بفرض  $س = صفر$


$$ص = ١ - ٢ \times (٠) = ١ \quad (٠, ١)$$

بفرض  $س = ١$

$$ص = ١ - ٢ \times (١) = -١ \quad (١, -١)$$

بفرض  $س = ٢$

$$ص = ١ - ٢ \times (٢) = -٣ \quad (٢, -٣)$$



(٩) أوجد ثلاثة أزواج مرتبة تحقق العلاقة  
 $٢س + ص = ٤$  و مثلها بيانياً

(عزل)

$$\begin{aligned} ٢س + ص &= ٤ \\ ص &= ٤ - ٢س \end{aligned}$$

بفرض  $ص = ٠$


$$٠ = ٤ - ٢س \quad (٠, ٤)$$

بفرض  $ص = ١$

$$١ = ٤ - ٢س \quad (١, ٢)$$

بفرض  $ص = ٢$

$$٢ = ٤ - ٢س \quad (٢, ٠)$$






## ميل الخط المستقيم

ميل الخط المستقيم المار بالنقطتين  
(١ ص ، ١ س) ، (٢ ص ، ٢ س)

$$\frac{\text{التغير الرأسى}}{\text{التغير الأفقى}} = \frac{\text{فرق الصادات}}{\text{فرق السينات}} = \frac{\text{ص}_٢ - \text{ص}_١}{\text{س}_٢ - \text{س}_١}$$



### ملاحظات هامة

(١) ميل محور السينات يساوى صفر

(٢) ميل أى مستقيم أفقى يوازى السينات يساوى صفر

(٣) ميل محور الصادات غير معرف

(٤) ميل أى مستقيم رأسى يوازى الصادات غير معرف

(٥) إذا كان المستقيم يصنع زاوية حادة مع الاتجاه الموجب لمحور السينات فإن الميل كمية موجبة

(٦) إذا كان المستقيم يصنع زاوية منفرجة مع الاتجاه الموجب لمحور السينات فإن الميل كمية سالبة

(١١) أوجد نقط تقاطع المستقيم الممثل للمعادلة  
٣ س + ٢ ص = ١٢ مع محورى الإحداثيات

أولاً

المستقيم يقطع محور السينات عند ص = صفر

$$\begin{aligned} ٣ س + ٢ ص &= ١٢ \\ ٣ س + ٢ (٠) &= ١٢ \\ ٣ س &= ١٢ \\ س &= ٤ \end{aligned}$$

نقطة التقاطع مع محور السينات (٤ ، ٠)


ثانياً

المستقيم يقطع محور الصادات عند س = صفر

$$\begin{aligned} ٣ س + ٢ ص &= ١٢ \\ ٣ (٠) + ٢ ص &= ١٢ \\ ٢ ص &= ١٢ \\ ص &= ٦ \end{aligned}$$

نقطة التقاطع مع محور الصادات (٠ ، ٦)

(١٢) نقطة تقاطع المستقيمين الممثلين للمعادلتين  
س = ٣ ، ص = ٢ هى .....



## تدریبات

(١) أوجد ميل المستقيم المار بالنقطتين  
 $(١, ٢)$  ،  $(٤, ٣)$

$$٣ = \frac{٣}{١} = \frac{١ - ٤}{٢ - ٣} = \frac{ص١ - ص٢}{س١ - س٢} = \text{الميل}$$

(٢) أوجد ميل المستقيم المار بالنقطتين  
 $(-٤, ١)$  ،  $(٣, ٥)$

$$\frac{٦}{٧} = \frac{١ + ٥}{٤ + ٣} = \frac{(١-) - ٥}{(٤-) - ٣} = \frac{١ص - ٢ص}{١س - ٢س} = \text{الميل}$$

(٣) اثبت أن النقاط

٨ (١ ، ١) ، ب (٢ ، ٣) ، ج (٣ ، ٥)  
تقع على استقامة واحدة

$$۲ = \frac{۲}{۱} = \frac{۱-۳}{۱-۲} = \frac{۱ص-۲ص}{۱س-۲س} = \text{میل } \overleftrightarrow{AB}$$

$$۲ = \frac{۲}{۱} = \frac{۳ - ۵}{۲ - ۳} = \frac{۱ص - ۲ص}{۱س - ۲س} = \text{میل ب ج} \longleftrightarrow$$

∴ میل ا ب = میل ب ج

∴ م ، ب ، ج تقع على استقامة واحدة

(٤) إذا كان المستقيم المار بالنقطتين  $\frac{1}{2}$  و  $\frac{1}{3}$  أوجد قيمة  $m$   $s (m, 5)$ ،  $v (2, 3)$  ميله  $= \frac{1}{7}$

$$\frac{2}{7} = \frac{2 - 2}{8 - 2} = \frac{0 - 3}{8 - 2} = \frac{ص_1 - ص_2}{س_1 - س_2} = \text{الميل}$$

٤-٢ م = ١٤ - بإضافة ٤ للطرفين

$$4-14- = 4-22-4$$

(٥) إذا كان المستقيم المار بالنقطتين  
س (٣ ، ٧) ، ص (٥ ، ك) يوازي محور  
احسب قيمة ك

∴ المستقيم يوازي محور السينات  
∴ الميل = صفر

$$\frac{٠}{٢} = \frac{٧ - \text{ك}}{٢} = \frac{٧ - \text{ك}}{٣ - ٥} = \frac{\text{ص}_١ - \text{ص}_٢}{\text{س}_١ - \text{س}_٢} = \text{الميل}$$

ك - ۷ = صفر      ك = ۷

(٦) إذا كان المستقيم المار بالنقطتين  
س (٥ ، ١)، ص (ك ، ٩) يوازي محور الصادات  
احسب قيمة ك

∴ المستقيم يوازي محور الصادات  
∴ الميل غير معرف

$$\frac{٨}{٠} = \frac{٨}{٥ - ٥} = \frac{١ - ٩}{٥ - ٥} = \frac{١ص - ٢ص}{١س - ٢س} = \text{الميل}$$

ك - ٥ = صفر      ك = ٥

(٧) إذا كانت النقاط

م (١ ، ك) ، ب (١ - ، ٥) ، ج (٢ ، ٣ - )  
تقع على استقامة واحدة احسب قيمة ك

$$\text{ميل ب ج} = \frac{\text{ص}_٢ - \text{ص}_١}{\text{س}_٢ - \text{س}_١} = \frac{\text{ص} - ٣}{\text{س} - ٢} = \frac{٥ - ٣}{١ - ٢} = \frac{٢}{-١} = -٢$$

$$\text{ميل أ ب} = \frac{\text{ص}_٢ - \text{ص}_١}{\text{س}_٢ - \text{س}_١} = \frac{\text{ص} - ٥}{\text{س} - ١} = \frac{\text{ك} - ٥}{٢ - ١} = \frac{\text{ك} - ٥}{١}$$

∴ م ، ب ، ج تقع على استقامة واحدة

$$\therefore \text{ميل أ ب} = \text{ميل ب ج}$$

$$\frac{\text{ك} - ٥}{١} = \frac{٢}{-١}$$

$$١٥ - ٣ = ١٦ \text{ بإضافة } ١٥ \text{ للطرفين}$$

$$١٥ - ١٦ = ١٥ - ٣$$

$$١ = ٣ - \text{ك} \quad \text{بالقسمة على } ٣ -$$

$$\text{ك} = \frac{١}{٣ -}$$

العمليات على الأعداد الحقيقية

٥

(١) أكمل ما يأتي بالاجابة الصحيحة

(١) المحايد الجمعى فى ح هو ..... والمحايد الضربى هو .....

(٢) المعكوس الضربى للعدد  $\frac{3}{7}$  هو ..... (فى أبسط صورة)

(٣) المعكوس الجمعى للعدد  $1 - \frac{2}{7}$  هو .....

(٤)  $7 + \frac{3}{7} = 5 + (0.0 + 0.0)$

(٥) اذا كان :  $7 + \frac{3}{7} = س$  ،  $7 - \frac{3}{7} = ص$  فان :  $(س + ص) =$  .....

(٦)  $\frac{3}{7} + (-\frac{3}{7}) =$  .....

(٧) المعكوس الجمعى للعدد  $\frac{3}{7} - \frac{7}{7}$  هو .....

(٨)  $\frac{3}{7} \times \frac{7}{5} = 10 \times$  .....

(٩)  $\frac{5}{7} \times \frac{7}{5} = 5 \times$  .....

(١٠) اذا كانت :  $س = 5$  فان :  $(س + \frac{5}{7}) =$  .....

(١١) مرافق العدد  $\frac{3}{7} - \frac{5}{7}$  هو ..... ومجموعهما هو ..... وحاصل ضربهما .....

(١٢) اذا كان :  $س = 3 + \frac{2}{7}$  فان مرافقها ..... وحاصل ضربهما .....

(١٣) العدد  $\frac{1}{\frac{3}{7} - \frac{7}{7}}$  فى أبسط صورة هو .....

(١٤) المعكوس الضربى للعدد  $\frac{2}{7} + \frac{3}{7}$  فى أبسط صورة هو .....

(١٥) المعكوس الضربى للعدد  $\frac{5}{7} + 1$  فى أبسط صورة هو .....

(١٦) اذا كان :  $\frac{1}{س} = 2 - \frac{5}{7}$  فان  $س$  فى أبسط صورة يساوى .....

(١٧) اذا كان :  $س = 1 + \frac{5}{7}$  ،  $ص = 1 - \frac{5}{7}$  فان :  $س - ص =$  .....

(١٨)  $(\frac{2}{7} + \frac{5}{7})^*$  ..... (١٩)  $(\frac{3}{7} + 1)^*$  .....

(٢٠)  $\frac{2}{7} \cdot 0.0 = \frac{2}{7} + \frac{8}{7}$  (٢١)  $(\frac{3}{7} + \frac{7}{7})^*$  .....

(٢٢) اذا كان :  $س = \frac{1}{\frac{5}{7} - \frac{8}{7}}$  ،  $ص = \frac{1}{3}$  فان :  $س =$  .....

(٢٣) المعكوس الضربى للعدد  $\frac{3}{3\frac{3}{7}}$  هو  $\frac{3}{3\frac{3}{7}}$

(٢٤) مرافق العدد  $\frac{3}{7} - \frac{5}{7}$  هو .....

(٢٥) المعكوس الجمعى للعدد  $\frac{3}{7} - 5$  هو .....

(٢٦)  $(2 - \frac{5}{7})(2 + \frac{5}{7}) =$  .....

(٢٧) المعكوس الضربى للعدد  $\frac{3}{7}$  هو .....



٢٧) حاصل ضرب العدد  $(\sqrt{2} + \sqrt{7})$  في مرافقة يساوي .....

٢٨) المعكوس الضربي للعدد  $\frac{5}{\sqrt{2}}$  هو .....

٢٩) المعكوس الضربي للعدد  $\sqrt{2} + \sqrt{3}$  في أبسط صورة يساوي .....

٣٠) المستطيل الذي بعده  $(1 + \sqrt{3})$  سم ،  $(1 - \sqrt{3})$  سم ، تكون مساحته = ..... سم<sup>2</sup>

٣١) إذا كان :  $\sqrt{3} + \sqrt{2} = \sqrt{5}$  ،  $\sqrt{3} - \sqrt{2} = \sqrt{5}$  ، فإن :  $(\sqrt{3} + \sqrt{2})^2 =$  .....

٣٢)  $2\sqrt{2} - \frac{1}{\sqrt{2}} =$  .....

٣٣) المعكوس الضربي للعدد  $\frac{\sqrt{2}}{4}$  هو .....

٣٤)  $\sqrt{5}$  ،  $\sqrt{2}$  ،  $\sqrt{4}$  ،  $\sqrt{8}$  ، ..... أكمل بنفس التسلسل

٣٥) إذا كانت :  $\sqrt{3} + \sqrt{2} = \sqrt{5}$  ،  $\sqrt{3} - \sqrt{2} = \sqrt{5}$  ، فإن :  $(\sqrt{3} + \sqrt{2})^2 =$  .....

٣٦)  $(\sqrt{2} + \sqrt{8})(\sqrt{2} - \sqrt{8}) =$  .....

(٢) اختر الإجابة الصحيحة

١)  $(2\sqrt{2})^2 =$  ..... [ ١٠ ، ١٥ ، ٢٠ ، ٣٠ ]

٢) إذا كان :  $\sqrt{3} + \sqrt{2} = \sqrt{5}$  ،  $\sqrt{3} - \sqrt{2} = \sqrt{5}$  ، فإن :  $(\sqrt{3} + \sqrt{2})^2 =$  .....

[  $(\sqrt{3} + \sqrt{2})^2$  ،  $(\sqrt{3} - \sqrt{2})^2$  ،  $(\sqrt{3} + \sqrt{2})$  ،  $(\sqrt{3} - \sqrt{2})$  ]

٣) إذا كانت :  $\sqrt{3} + \sqrt{2} = \sqrt{5}$  ،  $\sqrt{3} - \sqrt{2} = \sqrt{5}$  ، فإن :  $\sqrt{3} - \sqrt{2} =$  .....

[  $2\sqrt{2}$  ،  $2\sqrt{7}$  ،  $2\sqrt{4}$  ،  $2\sqrt{5}$  ]

٤)  $(\sqrt{3} + \sqrt{11})^2 =$  ..... [  $3 + \sqrt{11}$  ،  $2 + \sqrt{11}$  ،  $3 + \sqrt{33}$  ،  $2 + \sqrt{33}$  ]

٥) العدد  $(\sqrt{3} + 1)(\sqrt{3} - 1)$  هو عدد ..... [ طبيعي ، نسبي ، غير نسبي ، أولى ]

٦) أبسط صورة للمقدار :  $(1 + \sqrt{3})(1 - \sqrt{3})$  هو ..... [  $2(1 - \sqrt{3})$  ،  $(1 + \sqrt{3})^2$  ،  $4$  ،  $13$  ]

٧)  $(\sqrt{5} + \sqrt{6})(\sqrt{5} - \sqrt{6}) =$  ..... [  $6$  ،  $5$  ،  $1$  ،  $11$  ]

٨) المعكوس الجمعي للعدد  $\sqrt{3} - \sqrt{7}$  هو ..... [  $\sqrt{3} - \sqrt{7}$  ،  $\sqrt{3} + \sqrt{7}$  ،  $\sqrt{7} - \sqrt{3}$  ،  $\sqrt{7} + \sqrt{3}$  ]

٩) المستطيل الذي بعده  $(2 + \sqrt{7})$  سم ،  $(2 - \sqrt{7})$  سم تكون مساحته = ..... سم<sup>2</sup>

[  $5$  ،  $3$  ،  $2\sqrt{2}$  ،  $4 - \sqrt{7}$  ]

١٠)  $2\sqrt{2} - \sqrt{6} =$  ..... [  $2\sqrt{2}$  ،  $8$  ،  $\sqrt{2}$  ،  $14\sqrt{2}$  ]

١١)  $2\sqrt{2} - \sqrt{8} =$  ..... [  $2\sqrt{2}$  ،  $2$  ،  $\sqrt{2}$  ،  $3$  ]

١٢) العدد التالي في النمط :  $\sqrt{3}$  ،  $\sqrt{2}$  ،  $\sqrt{4}$  ،  $\sqrt{8}$  هو ..... [  $\sqrt{5}$  ،  $\sqrt{10}$  ،  $\sqrt{18}$  ،  $\sqrt{2}$  ]

١٣)  $(\sqrt{2} + \sqrt{8})^2 =$  ..... [  $10$  ،  $10\sqrt{2}$  ،  $18$  ،  $18\sqrt{2}$  ]

١٤)  $\frac{1}{10 + 2\sqrt{2}} =$  ..... [  $3\sqrt{2}$  ،  $4\sqrt{2}$  ،  $5$  ،  $12$  ]

١٥) المعكوس الضربي للعدد  $\frac{5}{10}$  هو .....  $[\frac{5}{10}, \frac{5}{10}, \frac{5}{10}, \frac{5}{10}]$

١٦) مرافق العدد  $(3 - \sqrt{2})$  هو .....  $[\sqrt{2} - 3, 3 - \sqrt{2}, \sqrt{2} - 3, 3 - \sqrt{2}]$

١٧) .....  $[\sqrt{2}, \sqrt{2}, \sqrt{2}, \sqrt{2}]$   $= \sqrt{2} - \sqrt{18} - 5\sqrt{2}$

١٨) .....  $[\sqrt{2}, \sqrt{2}, \sqrt{2}, \sqrt{2}]$   $= (\sqrt{2} + \sqrt{7})(\sqrt{2} - \sqrt{7})$

١٩) إذا كانت:  $1 + \sqrt{3} = م$ ،  $1 - \sqrt{3} = ن$  فإن:  $(م + ن)^2 = \dots\dots\dots$   $[8, 6, 12, 24]$

٢٠) إذا كانت:  $م = \sqrt{2} + \sqrt{3}$ ،  $ن = \sqrt{2} - \sqrt{3}$  فإن:  $(م - ن)^2 = \dots\dots\dots$

.....  $[40, 12, 24, 6]$

٢١) .....  $[\sqrt{8}, \sqrt{8}, \sqrt{8}, \sqrt{8}]$   $= \sqrt{9} - \sqrt{24} - \sqrt{8}$

.....  $[\sqrt{3}, \sqrt{3}, \sqrt{3}, \sqrt{3}]$   $= \sqrt{3} - \sqrt{12} - \sqrt{3}$

.....  $[18, \sqrt{4}, 9, 14]$   $= \sqrt{4} - (\sqrt{2} + \sqrt{7})^2$

.....  $[\sqrt{2}, \sqrt{2}, \sqrt{2}, \sqrt{2}]$   $= \sqrt{2} + 5\sqrt{3}$

٢٥) المعكوس الضربي للعدد  $\frac{3}{3}$  هو .....  $[\sqrt{6}, \sqrt{3}, \sqrt{3}, \sqrt{6}]$

.....  $[\sqrt{2}, \sqrt{2}, \sqrt{2}, \sqrt{2}]$   $= \sqrt{2} - \sqrt{8} - \sqrt{2}$



(٢) اختصر كلا مما يأتي لأبسط صورة

$$٢٠\sqrt{١٢} - ٢٧\sqrt{٥} + ٥\sqrt{١٢} - ٢\sqrt{٥}$$

الحل:

$$١٨\sqrt{٢٤} - ٢٧\sqrt{٣} - ٥\sqrt{٤} + ٢٤\sqrt{١}$$

الحل:

$$٢٧\sqrt{٤} - ٨\sqrt{١٨} + ١٨\sqrt{٢}$$

الحل:

$$٧٥\sqrt{٢} - ٣\sqrt{٢} + ٢٧\sqrt{٢}$$

الحل:

$$\frac{١}{٢}\sqrt{٢} + ٥\sqrt{٢} - ٣٢\sqrt{٢}$$

الحل:

$$١٨\sqrt{٢} - ٣٢\sqrt{٢} - \frac{١}{٢}\sqrt{٢}$$

الحل:

$$\frac{١}{٢}\sqrt{٢} - ٥\sqrt{٢} - ١٨\sqrt{٢} + ٨\sqrt{٢}$$

الحل:

$$٢٧\sqrt{٤} + ١٨\sqrt{٢} - ١٢٨\sqrt{٢} - ٩٨\sqrt{٢}$$

الحل:

$$٣٠\sqrt{٢} - ١٨\sqrt{٥} + ٢٧\sqrt{٢}$$

الحل:

$$\frac{١}{٣}\sqrt{٦} + ٢٧\sqrt{٢} - ٤٨\sqrt{٢}$$

الحل:

$$(١١) \sqrt{24} - \sqrt{20} - \sqrt{6}$$

الحل:

.....

.....

.....

.....

$$(١٢) 2\sqrt{5} + \sqrt{6} - \frac{1}{3}\sqrt{5} - \sqrt{2}$$

الحل:

.....

.....

.....

.....

$$(١٣) \sqrt{45} + 8 + \sqrt{\frac{1}{4}} + 5\sqrt{16}$$

الحل:

.....

.....

.....

.....

$$(١٤) \sqrt{4} - 2\sqrt{2} + \frac{1}{4}\sqrt{4} + 5\sqrt{4} + 3\sqrt{2}$$

الحل:

.....

.....

.....

.....

$$(١٦) \sqrt{45} + 4 + \sqrt{\frac{1}{4}} - \sqrt{2}$$

الحل:

.....

.....

.....

.....

$$(١٥) \sqrt{45} - \sqrt{28} + \sqrt{16}$$

الحل:

.....

.....

.....

.....

(٤) اثبت أن

$$(٢) \sqrt{5} \times \sqrt{6} \div \sqrt{6} = 6$$

الحل:

.....

.....

.....

.....

$$(١) \sqrt{28} + \sqrt{16} - \sqrt{2} = 5$$

الحل:

.....

.....

.....

.....

(٥) إذا كانت:

$$1 + \sqrt{5} = ب , ب = 1 - \sqrt{5} \text{ أوجد قيمة : } (ب - 1) , (ب + 1)$$

الحل:

.....

.....

.....

.....

.....

.....



(٥) أجب عن الأسئلة الآتية

١) إذا كان :  $س = ١ + \sqrt{٣}$  ،  $س = ١ - \sqrt{٣}$   
 فأوجد :  $س + س$  ،  $س \cdot س$   
 الحل :

.....  
 .....  
 .....

٢) إذا كان :  $س = \sqrt{٣} + \sqrt{٧}$  ،  $س = \sqrt{٣} - \sqrt{٧}$   
 فأوجد في أبسط صورة :  $\frac{س + س}{س \cdot س}$   
 الحل :

.....  
 .....  
 .....

٣) إذا كان :  $س = \frac{٤}{\sqrt{٥} + ٣}$  ،  $س = \sqrt{٥} + ٣$   
 فأوجد :  $س^٢$  ،  $س^٢$   
 الحل :

.....  
 .....  
 .....

٤) إذا كان :  $س = ٢ - \sqrt{٥}$  ،  $س = ٢ + \sqrt{٥}$   
 فأوجد قيمة المقدار :  $س^٢ + س + س^٢$   
 الحل :

.....  
 .....  
 .....

٥) إذا كان :  $س = \sqrt{٣} + \sqrt{٥}$  ،  $س = \frac{٢}{\sqrt{٣} + \sqrt{٥}}$   
 أثبت أن :  $س$  مترافقان وأوجد  $(س + س) \div س$   
 الحل :

.....  
 .....  
 .....  
 .....

٦) إذا كان :  $س = \sqrt{٣} + \sqrt{٥}$  ،  $س = \frac{٢}{س}$   
 فأوجد قيمة المقدار :  $\frac{س - س}{س \cdot س}$   
 الحل :

.....  
 .....  
 .....  
 .....

٧) إذا كان :  $س = \sqrt{٣} + \sqrt{٢}$  ،  $س = \sqrt{٣} - \sqrt{٢}$   
 فأوجد :  $(س + س)^٢$   
 الحل :

.....  
 .....  
 .....  
 .....

٨) إذا كان :  $س = \sqrt{٢} + \sqrt{٥}$  ،  $س$  مترافق للعدد  $س$   
 فأوجد قيمة :  $س + س$  ،  $س - س$   
 الحل :

.....  
 .....  
 .....  
 .....

$$٩) \text{ إذا كان : } \frac{4}{3\sqrt{2} - 7\sqrt{2}} = \text{ص} \quad \frac{4}{3\sqrt{2} + 7\sqrt{2}} = \text{م}$$

أوجد قيمة: م<sup>٢</sup> م<sup>٢</sup>  
الحل:

.....

.....

.....

.....

$$١٠) \text{ إذا كان : } 3\sqrt{2} + 2\sqrt{2} = \text{ب} \quad \frac{1}{2\sqrt{2} + 3\sqrt{2}} = \text{ب}$$

فأوجد قيمة المقدار: ب<sup>٢</sup> - ب<sup>٢</sup>  
الحل:

.....

.....

.....

.....

أ. شريف عبد الحميد

العمليات على الجذور التربيعية والتكعيبية

٦

(١) أكمل ما يأتي بالإجابة الصحيحة

- ١) مكعب طول حرفه ٦ سم ، تكون مساحته الجانبية ..... سم<sup>٢</sup>
- ٢) مكعب طول حرفه ٤ سم ، تكون مساحته الكلية ..... سم<sup>٢</sup>
- ٣) مكعب حجمه ٢٥ ١ سم تكون مساحته الجانبية ..... سم<sup>٢</sup>
- ٤) مكعب حجمه ١ سم تكون مساحته الكلية ..... سم<sup>٢</sup>
- ٥) مكعب مجموع أطوال أحرفه ٣٦ سم ، فإن حجمه ..... سم<sup>٣</sup>
- ٦) دائرة محيطها ٢٠  $\pi$  سم ، تكون مساحتها ..... سم<sup>٢</sup>
- ٧) الكرة التي حجمها  $\frac{4}{3} \pi$  سم<sup>٣</sup> يكون طول قطرها ..... سم
- ٨) الكرة التي حجمها  $\frac{9}{4} \pi$  سم<sup>٣</sup> يكون طول قطرها ..... سم
- ٩) المكعب الذي حجمه ٨ سم<sup>٣</sup> يكون مجموع أطوال أحرفه ..... سم
- ١٠) مكعب حجمه ٢٧ سم<sup>٣</sup> يكون طول حرفه ..... سم
- ١١) إذا كان حجم كرة =  $36\pi$  سم<sup>٣</sup> فإن طول قطرها ..... سم
- ١٢) إذا كان حجم مكعب ٢١٦ سم<sup>٣</sup> فإن مساحة أحد أوجهه ..... سم<sup>٢</sup>
- ٢٢) متوازي مستطيلات أبعاده : ٢ سم ، ٣ سم ، ٥ سم فإن حجمه ..... سم<sup>٣</sup>
- ٢٤) مكعب طول حرفه ٦ سم يكون حجمه ..... سم<sup>٣</sup>
- ٢٥) مكعب مساحته الجانبية ٣٦ سم<sup>٢</sup> فإن حجمه ..... سم<sup>٣</sup>
- ٢٦) حجم الأسطوانة = ..... وحدة مكعبة
- ٢٧) أسطوانة دائرية قائمة حجمها يساوي  $729\pi$  سم<sup>٣</sup> فإذا كان ارتفاعها يساوي طول نصف قطرها فإن ارتفاعها ..... سم
- ٢٨) حجم كرة طول نصف قطرها ٣ سم = ..... سم<sup>٣</sup>
- ٢٩) حجم كرة طول قطرها ٦ سم = ..... سم<sup>٣</sup>
- ٣٠) دائرة طول نصف قطرها ٧ سم يكون محيطها ..... سم
- ٣١) أسطوانة دائرية قائمة طول نصف قطر قاعدتها ٦ سم ، وارتفاعها ٤ سم فإن مساحتها الجانبية ..... سم<sup>٢</sup>
- ٣٢) المساحة الجانبية لمتوازي المستطيلات ..... سم<sup>٢</sup>
- ٣٣) الدائرة التي محيطها  $20\pi$  سم يكون مساحتها ..... سم<sup>٢</sup>
- ٣٤) مساحة سطح الكرة التي طول قطرها ٤ سم = ..... سم<sup>٢</sup>



(٢) اختر الأجوبة الصحيحة من بين الأجابات المعطاة

- ١) مكعب حجمه ٦٤ سم<sup>٣</sup> ، فإن مساحته الجانبية = ..... سم<sup>٢</sup>
- ٢) مكعب مساحته الكلية ٢٤ سم<sup>٢</sup> ، فإن طول حرفه = ..... سم
- ٣) مكعب مساحته الجانبية ٤ سم<sup>٢</sup> ، فإن حجمه = ..... سم<sup>٣</sup>
- ٤) مكعب حجمه ٢  $\sqrt{2}$  سم<sup>٣</sup> فإن طول حرفه = ..... سم
- ٥) حجم الكرة = .....  $\left[ \frac{4}{3}\pi \frac{4}{3} \text{ نقى} , \frac{3}{4}\pi \frac{4}{3} \text{ نقى} , \frac{4}{3}\pi \frac{4}{3} \text{ نقى} , \frac{3}{4}\pi \frac{4}{3} \text{ نقى} \right]$
- ٦) حجم الكرة التي طول قطرها ٦ سم = ..... سم<sup>٣</sup>
- ٧) مساحة كرة طول نصف قطرها ٢ سم = ..... سم<sup>٢</sup>
- ٨) إذا كان حجم كرة  $\frac{9}{16}\pi$  سم<sup>٣</sup> ، فإن طول نصف قطرها = ..... سم
- ٩) إذا كانت مساحة سطح كرة  $\pi 36$  سم<sup>٢</sup> ، فإن طول نصف قطرها = ..... سم
- ١٠) مكعب حجمه  $\frac{5}{8} 10$  سم<sup>٣</sup> فإن طول ضلعه = ..... سم
- ١١) المربع الذي مساحته ١٠ سم<sup>٢</sup> يكون طول ضلعه = ..... سم
- ١٢) مكعب طول حرفه ٤ سم يكون حجمه = ..... سم<sup>٣</sup>
- ١٣) متوازي مستطيلات أبعاده  $\sqrt{3}$  ،  $\sqrt{5}$  ،  $\sqrt{15}$  فإن حجمها = ..... سم<sup>٣</sup>
- ١٤) حجم كرة طول نصف قطرها ٣ سم = ..... سم<sup>٣</sup>
- ١٥) إذا كان حجم مكعب = ٢٧ سم<sup>٣</sup> فإن مساحة أحد أوجهه = ..... سم<sup>٢</sup>
- ١٦) مكعب حجمه ٥  $\sqrt{5}$  سم<sup>٣</sup> يكون طول حرفه = ..... سم
- ١٧) إذا كان حجم كرة  $\pi 32$  سم<sup>٣</sup> فإن طول نصف قطرها = ..... سم
- ١٨) مكعب طول حرفه ٩  $\sqrt{9}$  سم فإن حجمه = ..... سم<sup>٣</sup>
- ١٩) المكعب الذي حجمه ٦٤ سم<sup>٣</sup> يكون طول حرفه = ..... سم

(٢) أجب عن الأسئلة الآتية

- ١) أوجد حجم أسطوانة دائرية قائمة طول نصف قطر قاعدتها ٧ سم ، وارتفاعها ١٠ سم  $\left( \frac{22}{7} = \pi \right)$   
الحل :  
.....  
.....

- ٢) أسطوانة دائرية قائمة طول قطر قاعدتها ١٤ سم ، وارتفاعها ١٠ سم أوجد حجمها ، مساحتها الجانبية

$$\left( \frac{22}{7} = \pi \right)$$

الحل :  
.....  
.....



٢) أسطوانة دائرية قائمة طول قطر قاعدتها  $2\sqrt{7}$  سم ، وارتفاعها ٩ سم أوجد حجمها  $(\frac{22}{7} = \pi)$

الحل :

٤) متوازي مستطيلات قاعدته مربعة الشكل فإذا كان حجمه ٧٢٠ سم<sup>٣</sup> وارتفاعه ٥ سم أوجد مساحته الكلية .

الحل :

٥) مكعب طول حرفه = ٥ سم أوجد : مساحته الكلية ، مساحته الجانبية

الحل :

٦) أسطوانة دائرية قائمة حجمها  $36\pi$  سم<sup>٣</sup> وارتفاعها ٤ سم أوجد مساحتها الجانبية بدلالة  $\pi$

الحل :

٧) أسطوانة دائرية قائمة طول قطر قاعدتها  $2\sqrt{7}$  سم ، وارتفاعها ٩ سم أوجد حجمها بدلالة  $\pi$

الحل :

٨) كرة حجمها  $\frac{32}{3}\pi$  سم<sup>٣</sup> أوجد طول نصف قطرها

الحل :

٩) مكعب حجمه ١٢٥ سم<sup>٣</sup> ، أوجد طول حرفه ومساحته الجانبية

الحل :

٥)  $1 - 5 \leq 6$

الحل:

.....

.....

.....

.....

.....

٦)  $1 + \frac{1}{2} \leq 2 < 3$

الحل:

.....

.....

.....

.....

.....

٧)  $1 - 2 \geq 1 + 5 > 0$

الحل:

.....

.....

.....

.....

.....

٨)  $1 \geq 3 - 2 \geq 5$

الحل:

.....

.....

.....

.....

.....

٩)  $3 - 4 \geq 7 - 5 \geq 0$

الحل:

.....

.....

.....

.....

.....

١٠)  $7 > 4 + 3 > 4$

الحل:

.....

.....

.....

.....

.....

١١)  $3 \geq 5 - 1 > 0$

الحل:

.....

.....

.....

.....

.....

١٢)  $5 \geq 3 - 2 \geq 0$

الحل:

.....

.....

.....

.....

.....

١١)  $3 > 3 - 1 \geq 0$

الحل:

.....

.....

.....

.....

.....

١٢)  $5 > 1 - 2 > 0$

الحل:

.....

.....

.....

.....

.....

١٣)  $\sqrt{9} \geq 1 + 8 \geq \sqrt{8}$

الحل:

.....

.....

.....

.....

.....

١٣)  $3 > 3 - 5 > 0$

الحل:

.....

.....

.....

.....

.....



١٢)  $5س - 3 > 2س + 9$

الحل: .....

.....

.....

.....

.....

١٢)  $3س - 4س \leq 2س - 2$

الحل: .....

.....

.....

.....

.....

١٢)  $س \geq 2س - 1 \geq 3س + 3$

الحل: .....

.....

.....

.....

.....

١٤)  $س - 1 > 3س - 1 \geq 1س + 1$

الحل: .....

.....

.....

.....

.....

أ: شريف عبد الحميد دياب

العلاقة بين متغيرين

٨

(١) أكمل ما يأتي بالاجابة الصحيحة

- ١) اذا كان :  $(٢٤٣-)$  تحقق العلاقة  $٣س + ب = ١$  فان : ب = .....
- ٢) اذا كان :  $(-٢، ٢)$  تحقق العلاقة  $س + ٥ = ١٥$  فان : ك = .....
- ٣) اذا كان :  $(٤، ١)$  تحقق العلاقة  $س + ٥ = ٥$  فان : ك = .....
- ٤) العلاقة  $س = ٥$  تمثل بيانيا بخط مستقيم يوازي محور .....
- ٥) العلاقة  $س = -٢$  تمثل بيانيا بخط مستقيم يوازي محور .....
- ٦) العلاقة  $٣س - ٢س = ٩$  تمثل مستقيم يقطع محور السينات في النقطة .....
- ٧) اذا كان  $(٤، ٤)$  يحقق العلاقة  $س + ٢س = ٨$  فان : ك = .....
- ٨) اذا كان  $(٢٤١)$  يحقق العلاقة  $٢س + س - ج = ٠$  فان : ج = .....
- ٩) اذا كان  $(٤٤٣-)$  يحقق العلاقة  $٢س + ب = ٦$  فان : ب = .....
- ١٠) اذا كان  $(٥٤١-)$  يحقق العلاقة  $٣س + ك = ٢$  فان : ك = .....
- ١١) اذا كان  $(٣، ٢)$  يحقق العلاقة  $س + ٥ = ٧$  فان : ك = .....
- ١٢) اذا كان :  $(٢، ٢)$  تحقق العلاقة  $٢س + ٤ = ٢٤$  فان : ك = .....
- ١٣) اذا كان :  $(٢، ٣)$  تحقق العلاقة  $س + ٥ = ١٥$  فان : ك = .....

(٢) اختر الاجابة الصحيحة

- ١) الزوج المرتب الذي يحقق العلاقة :  $س + ٤ = ٥$  هو .....  $[ (٣-٤) ، (٣٤١) ، (٣-٤١-) ، (٣٤١-) ]$
- ٢) الزوج المرتب  $(١٤٣)$  يحقق العلاقة ...  $[ س - ٦ = ٦ ، ٦ = ٣س + ٦ ، ٦ = ٣س - ٦ ، ٦ = ٣س + ٦ ]$
- ٣) النقطة  $(٢٤٣)$  لا تحقق العلاقة .....  $[ س + ٥ = ٥ ، ٥ = ٣س - ٧ ، ٧ = س + ٧ ، ٧ = س - ١ ]$
- ٤) اذا كانت النقطة  $(٥٤١-)$  تحقق العلاقة  $٣س + ك = ٧$  فان : ك = .....  $[ ١٠ ، ١ ، ٢- ، ٢ ]$
- ٥) أي الأزواج التالية يحقق العلاقة  $٢س + ٥ = ٥$  ؟ .....  $[ (٢٤٢) ، (١٤٣) ، (٣٤١) ، (٣٤١-) ]$
- ٦) اذا كانت :  $(٦، ٦)$  تحقق العلاقة  $س - ٢س = ٠$  فان : ك = .....  $[ ٦- ، ٦ ، ٣ ، ٣- ]$
- ٧) العلاقة  $س = ٥$  يمثلها بيانيا مستقيم .....
- .....  $[ يوازي محور السينات ، يوازي محور الصادات ، محور السينات ، محور الصادات ]$
- ٨) اذا كان  $(٥-٤٢)$  يحقق العلاقة  $٣س - س + ج = ٠$  فان : ج = .....  $[ ١١- ، ١١ ، ١- ، ١ ]$
- ٩) اذا كان  $(٣، ٣)$  يحقق العلاقة  $٣س + ٩ = ٩$  فان : ب = .....  $[ ٥ ، ٩ ، ٢ ، ٣ ]$
- ١٠) اذا كان  $(٢٤١-)$  يحقق العلاقة  $٣س + ك = ٧$  فان : ك = .....  $[ ٥ ، ٤ ، ٢ ، ٣ ]$
- ١١) اذا كان  $(١٤١)$  يحقق العلاقة  $س + ٥ = ٥$  فان : ا = .....  $[ ٥ ، ٩ ، ٢ ، ٣ ]$
- ١٢)  $س = ٣$  يمثلها بيانيا مستقيم يوازي .....  $[ محور السينات ، محور الصادات ، غير ذلك ]$
- ١٣) النقطة  $(١٤١) \in$  للمستقيم الذي معادلته .....  $[ س + ٢ = ٢ ، س + ٢ = ٣س ، ١٥ = س + ٢ ، ٢ = ٣س ]$



(٢) مثل بيانيا كلا من العلاقات الآتية:

$$(1) \text{ مس } + \text{ ص } = 2$$

### الحل:

A full page of blank graph paper with a light blue background and a dark green grid. The grid consists of small squares, approximately 10 columns wide and 20 rows high.

۲، ۲ س - ص = ۳

### الحل:

A full page of blank graph paper with a light blue background and a dark green grid. The grid consists of 10 columns and 10 rows of squares.

$$2 = 2s + 3$$

### الحل:

[illegible]

$$5 = 2, 4$$

**الحل :**

A full page of blank graph paper with a light blue background and a dark blue grid. The grid consists of 20 columns and 20 rows of squares.

$$= 1 + \sqrt{5} \quad (5)$$

### الحل:


A full page of blank graph paper with a light blue background and a dark blue grid. The grid consists of small squares, approximately 10 units wide by 10 units high.

$$1 = s + s \quad (6)$$

**الحل :**

A full-page sheet of graph paper with a light blue background and a dark blue grid. The grid consists of 10 columns and 10 rows of squares. There are no margins or additional markings on the page.





٨ = ٣ + ٥س  
الحل:

.....

.....

.....

.....

.....


.....

.....

.....

.....

.....



٧ = ٢ - ٥س  
الحل:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

(٤) أجب عن الأسئلة الآتية

(أ) إذا كانت (٣-١) تحقق العلاقة: ٥س + ب = ١٨ ، فأوجد قيمة ب

الحل: .....

.....

.....


(ب) إذا كانت (٢، ك) تحقق العلاقة: ٢س - ٥س = ٨ ، فأوجد قيمة ك

الحل: .....

.....

.....

(ج) ارسم الخط المستقيم الذي يمثل العلاقة: ٢س - ٤ = ثم أوجد نقطتي تقاطع المستقيم مع محوري الإحداثيات



الحل: .....

.....

.....

.....

.....

.....

## ميل الخط المستقيم

٩

(١) أكمل ما يأتي بالاجابة الصحيحة

- ١) ميل الخط المستقيم الموازي لمحور السينات يساوى .....
- ٢) ميل الخط المستقيم الموازي لمحور الصادات يساوى .....
- ٣) اذا كان ميل  $\overline{AB}$  يساوى ميل  $\overline{BC}$  فان النقاط  $A, B, C$  تكون على .....
- ٤) اذا كان  $A = (3, 1)$  ،  $B = (1, 2)$  فان ميل  $\overline{AB}$  يساوى .....
- ٥) اذا كان  $A = (2, 1)$  ،  $B = (4, 1)$  فان ميل  $\overline{AB}$  يساوى .....
- ٦) اذا كانت  $A, B, C$  على استقامة واحدة فان : ميل  $\overline{AB} =$  .....
- ٧) ميل الخط المستقيم  $\frac{\dots\dots\dots}{\dots\dots\dots} =$  .....
- ٨) اذا كان ميل مستقيم = صفرفانه يوازي محور .....
- ٩) العلاقة  $S = 5$  يمثلها مستقيم يوازي محور ..... وميله .....
- ١٠) ميل المستقيم المار بالنقطتين  $(7, 2)$  ،  $(3, -2)$  هو .....
- ١١) ميل المستقيم المار بالنقطتين  $(7, 2)$  ،  $(5, -2)$  هو .....
- ١٢) ميل المستقيم المار بالنقطتين  $(7, 1)$  ،  $(1, 2)$  هو .....
- ١٣) ميل المستقيم المار بالنقطتين  $(2, 0)$  ،  $(0, 2)$  هو .....

(٢) اختر الاجابة الصحيحة من بين الاجابات المعطاة

- ١) اذا كان :  $A = (5, 3)$  ،  $B = (5, 1)$  فان ميل  $\overline{AB} =$  .....  $[\frac{1}{3}, 3, 3-, \frac{1}{3}-]$
- ٢) اذا كان :  $A = (1, 1)$  ،  $B = (3, 2)$  فان ميل  $\overline{AB} =$  .....  $[\frac{2-}{3}, \frac{2}{3}, \frac{3-}{2}, \frac{2}{3}]$
- ٣) ميل المستقيم الموازي لمحور السينات = ..... [ صفر، غير معرف، ١، ١- ]
- ٤) ميل المستقيم الموازي لمحور الصادات = ..... [ موجب، سالب، صفر، غير معرف ]
- ٥) المستقيم  $S = 1$  يكون ميله ..... [ ١-، صفر، ١، غير معرف ]
- ٦) ميل الخط المستقيم المار بالنقطتين  $(1, 3)$  ،  $(5, 1)$  هو .....  $[2, 1, 2-, 1-]$
- ٧) اذا كان ميل الخط المستقيم المار بالنقطتين  $(5, 3)$  ،  $(7, 5)$  غير معرف فان :  $S =$  .....  $[0, 3, 5, 7]$
- ٨) المستقيم المار بالنقطتين  $(5, 3)$  ،  $(2, 5)$  ميله .....  $[0, 10, 10-, 10]$
- ٩) المستقيم العمودي على محور الصادات ميله ..... [ صفر، ١، غير معرف، ١- ]
- ١٠) الجدول الاتي يبين علاقة بين  $S, V$  وهي :

٥	٤	٣	٢	١	س
٩	٧	٥	٣	١	ص

$$[S = 4 + S, S = 1 + S, S = 2 - S, S = 3 - S]$$




(٢) أجب عن الأسئلة الآتية

١) إذا كانت:  $f = (-3, 1)$  ،  $g = (2, 1)$  فأوجد ميل  $\overline{AB}$   
الحل: .....


٢) إذا كان ميل المستقيم المار بالنقطتين  $f = (-3, 1)$  ،  $g = (2, 5)$  هو  $\frac{2}{3}$  فأوجد قيمة  $m$ .  
الحل: .....

٣) أوجد ميل المستقيم  $\overline{AB}$  حيث  $f = (-3, 1)$  ،  $g = (2, 5)$  حل النقطة  $g = (1, 8) \in \overline{AB}$   
الحل: .....



٤) في الشكل المقابل:  $\angle A = 45^\circ$  مثلث قائم الزاوية في  $L$  ،  $\angle B = 45^\circ$  فإذا كان  $L = (2, 3)$  ،  $M = (7, 2)$  أوجد إحداثي  $N$  واحسب ميل  $\overline{MN}$   
الحل: .....

٥) الشكل المقابل يوضح تغير رأس مال شركة خلال ٨ سنوات  
أ) أوجد ميل كل من  $\overline{AB}$  ،  $\overline{BC}$  ،  $\overline{CD}$  ما دلالة كل منها؟  
ب) أحسب رأس مال الشركة عند بدء عملها.  
الحل: .....





## العمليات على الجذور

## العددان المترافقان

$$(\sqrt{2} + \sqrt{3}) \text{ مرافقه هو } (\sqrt{2} - \sqrt{3})$$

$$(\sqrt{3} - \sqrt{7}) \text{ مرافقه هو } (\sqrt{3} + \sqrt{7})$$

◆ مجموع العددين المترافقان =  $2 \times$  الأول

◆ طرح العددين المترافقان =  $2 \times$  الثاني

◆ حاصل ضربيهما = مربع الأول - مربع الثاني

## مثال

إذا كانت  $\sqrt{3} + \sqrt{5} = س$  ،  $\sqrt{3} - \sqrt{5} = ص$  ، فأوجد كل مما يأتي:

$$(1) \sqrt{5} - \sqrt{3} = ص + س$$

$$(2) \sqrt{3} - \sqrt{5} = ص - س$$

$$(3) س - ص = 3 - 5 = 2$$

$$(4) 20 = 5 \times 4 = (\sqrt{5} - \sqrt{3})^2 = (ص - س)^2$$

$$(5) 12 = 3 \times 4 = (\sqrt{3} - \sqrt{5})^2 = (س - ص)^2$$

## ملحوظة

$$س^2 + 2س + ص^2 = (\sqrt{3} + \sqrt{5})^2$$

$$س^2 - 2س + ص^2 = (\sqrt{3} - \sqrt{5})^2$$

$$س^2 - ص^2 = (\sqrt{3} + \sqrt{5})(\sqrt{3} - \sqrt{5})$$

## تدريب

إذا كانت  $\sqrt{2} + \sqrt{7} = س$  ،  $\sqrt{2} - \sqrt{7} = ص$  ، فأوجد كل مما يأتي:

$$(1) س + ص = \dots\dots\dots$$

$$(2) س - ص = \dots\dots\dots$$

$$(3) س - ص = \dots\dots\dots$$

$$(4) (\sqrt{3} + \sqrt{5})^2 = \dots\dots\dots$$

$$(5) س^2 - 2س + ص^2 = \dots\dots\dots$$

## جمع وطرح الجذور

- الـجذور المتشابهة فقط هي التي تجمع وتطرح
- عند الجمع أو الطرح نجمع ونطرح المعاملات

$$\sqrt{3} + \sqrt{7} = \sqrt{3} + \sqrt{7}$$

$$\sqrt{2} + \sqrt{4} = \sqrt{2} + 2\sqrt{1}$$

$$\sqrt{7} = \sqrt{7} - \sqrt{4} + \sqrt{3}$$

$$\sqrt{2} + \sqrt{3} \text{ جذور غير متشابهة لا تجمع}$$

$$\sqrt{6} = \sqrt{4} + \sqrt{2}$$

$$2\sqrt{2} = \sqrt{2} + \sqrt{2}$$

## ضرب الجذور

• ضرب عدد  $\times$  جذر:

$$\sqrt{3} = 3 \times \sqrt{1} \quad , \quad \sqrt{5} = \sqrt{1} \times 5$$

• عند ضرب أي جذرين نضرب العددين تحت جذر واحد

$$\sqrt{6} = \sqrt{3 \times 2} = \sqrt{3} \times \sqrt{2}$$

• ضرب الجذور المتشابهة:

$$\sqrt{7} = \sqrt{7} \times \sqrt{1}$$

$$2 = \sqrt{2} \times \sqrt{2} \times \sqrt{1}$$

• عند ضرب الجذور نضرب:

الإشارة  $\times$  الإشارة والعدد  $\times$  العدد والجذر  $\times$  الجذر

$$\sqrt{6} - \sqrt{3} = \sqrt{2} \times \sqrt{3} - \sqrt{1} \times \sqrt{3}$$

$$24 = 3 \times 8 = \sqrt{3} \times \sqrt{4} \times \sqrt{2}$$

$$\sqrt{12} = \sqrt{4} \times \sqrt{3}$$

## اختصار الجذور التربيعية

١) خلى العدد الى تحت الجذر عبارة عن حاصل ضرب عددين

بشرط أن يكون عدد منهم ليه جذر تربيعي

٢) طلع العدد الى ليه جذر بره بس خدله الجذر التربيعي

$$\sqrt{2 \times 9} = \sqrt{18} \quad (1)$$

$$\sqrt{2 \times 25} = \sqrt{50} \quad (2)$$

$$\sqrt{2 \times 36} = \sqrt{72} \quad (3)$$

$$\sqrt{3 \times 25} = \sqrt{75} \quad (4)$$

$$\sqrt{5 \times 9} = \sqrt{45} \quad (5)$$

لو الى جوه الجذر التربيعي كسر:

هنضرب الى بره في نفسه مرتين وندخله جوه الجذر

$$\sqrt{2} = \sqrt{8 \times \frac{1}{4}} = \frac{1}{2} \sqrt{8} \quad (6)$$

## اختصار الجذور التكعيبية

١) خلى العدد الى تحت الجذر عبارة عن حاصل ضرب عددين

بشرط أن يكون عدد منهم ليه جذر تكعيبي

٢) طلع الرقم الى ليه جذر بره بس خدله الجذر التكعيبي

$$\sqrt[3]{2 \times 8} = \sqrt[3]{16} \quad (1)$$

$$\sqrt[3]{2 \times 27} = \sqrt[3]{54} \quad (2)$$

$$\sqrt[3]{3 \times 27} = \sqrt[3]{81} \quad (3)$$

$$\sqrt[3]{2 \times 64} = \sqrt[3]{128} \quad (4)$$

$$\sqrt[3]{2 \times 125} = \sqrt[3]{250} \quad (5)$$

ملحوظة: لو الى جوه الجذر التكعيبي كسر:

هنضرب الى بره في نفسه ٣ مرات وندخله جوه الجذر

$$\sqrt[3]{2} = \sqrt[3]{8 \times \frac{1}{4}} = \frac{1}{4} \sqrt[3]{8} \quad (6)$$

$$\sqrt[3]{2} = \sqrt[3]{54 \times \frac{1}{27}} = \frac{1}{27} \sqrt[3]{54} \quad (7)$$

## جعل المقام عدد صحيح

◆ إذا كان العدد على الصورة  $\frac{4}{\sqrt{2}}$

نضرب البسط والمقام  $\times \sqrt{2}$

$$\frac{4}{\sqrt{2}} = \frac{4 \times \sqrt{2}}{\sqrt{2} \times \sqrt{2}} = \frac{4\sqrt{2}}{2}$$

$$\frac{3}{\sqrt{3}} = \frac{3 \times \sqrt{3}}{\sqrt{3} \times \sqrt{3}} = \frac{3\sqrt{3}}{3}$$

◆ إذا كان العدد على الصورة  $\frac{4}{\sqrt{3} + \sqrt{7}}$

نضرب البسط والمقام  $\times$  مرافق المقام  $(\sqrt{3} - \sqrt{7})$

$$\frac{4(\sqrt{3} - \sqrt{7})}{(\sqrt{3} - \sqrt{7})(\sqrt{3} + \sqrt{7})} = \frac{4(\sqrt{3} - \sqrt{7})}{3 - 7}$$

$$\sqrt{3} - \sqrt{7} = \frac{4(\sqrt{3} - \sqrt{7})}{3 - 7} =$$

## فك الأقواس

◆ ضرب عدد  $\times$  قوس :  $(a + b)$

$$2 + \sqrt{2} \times 3 = (2 + 3)\sqrt{2}$$

◆ مربع القوس :  $(a + b)^2$

$$= \text{مربع الأول} + 2 \times \text{الأول} \times \text{الثاني} + \text{مربع الثاني}$$

$$6\sqrt{2} + 5 = 2 + 6\sqrt{2} + 3 = (\sqrt{2} + 3)^2$$

$$35\sqrt{2} + 7 = 5 + 35\sqrt{2} + 7 = (\sqrt{5} - \sqrt{7})^2$$

◆ ضرب قوسين متشابهين ما عدا في الإشارة:

$$\text{الناتج} = \text{مربع الأول} - \text{مربع الثاني}$$

$$1 = 2 - 3 = (\sqrt{2} - \sqrt{3})(\sqrt{2} + \sqrt{3})$$

$$2 - 9 = 7 = (3 + \sqrt{7})(3 - \sqrt{7})$$

## أمثلة على العدان المترافقان

مثال ١

$$\frac{2}{\sqrt{3} + \sqrt{5}} = \text{ب} , \frac{2}{\sqrt{3} - \sqrt{5}} = \text{أ} \text{ إذا كانت}$$

اثبت أن أ ، ب مترافقان ، ثم أوجد قيمة

$$(1) \quad (أ + ب)^2 (2) \quad أ^2 - ب^2 (3) \quad أ^2 ب^2$$

$$(5) \quad \left(\frac{أ + ب}{أ ب}\right)^2 (6) \quad أ^2 + ب^2$$

الحل

$$أ = \frac{(\sqrt{3} + \sqrt{5})^2}{(\sqrt{3} + \sqrt{5})(\sqrt{3} - \sqrt{5})}$$

$$\sqrt{3} + \sqrt{5} = \frac{(\sqrt{3} + \sqrt{5})^2}{3 - 5} =$$

$$ب = \frac{(\sqrt{3} - \sqrt{5})^2}{(\sqrt{3} - \sqrt{5})(\sqrt{3} + \sqrt{5})}$$

$$\sqrt{3} - \sqrt{5} = \frac{(\sqrt{3} - \sqrt{5})^2}{3 - 5} =$$

∴ أ ، ب مترافقان (المطلوب الأول)

$$\sqrt{3}^2 = أ - ب , \quad \sqrt{5}^2 = أ + ب$$

$$أ - ب = 3 - 5 = 2$$

$$(1) \quad (أ + ب)^2 = 2(5) = 10$$

$$(2) \quad أ^2 - ب^2 = (أ - ب)(أ + ب) = 2(10) = 20$$

$$(3) \quad أ^2 ب^2 = (أ ب)^2 = (2)^2 = 4$$

$$(4) \quad \left(\frac{أ + ب}{أ ب}\right)^2 = \left(\frac{2}{2}\right)^2 = 1$$

$$(5) \quad \frac{أ + ب}{أ ب} = \frac{2}{2} = 1$$

$$أ + ب = 2$$

$$أ - ب = 2$$

$$أ + ب = 2$$

$$أ + ب = 2$$

مثال ١

$$\frac{2}{\sqrt{3} + \sqrt{5}} = \text{ص} , \frac{2}{\sqrt{3} - \sqrt{5}} = \text{س} \text{ إذا كانت}$$

فأوجد القيمة العددية للمقدار  $\frac{\text{س} + \text{ص}}{\text{س} - \text{ص}}$ 

الحل

$$\text{س} + \text{ص} = 2 \times \frac{2}{\sqrt{3} + \sqrt{5}} = \frac{4}{\sqrt{3} + \sqrt{5}}$$

$$\text{س} - \text{ص} = \frac{2}{\sqrt{3} - \sqrt{5}} - \frac{2}{\sqrt{3} + \sqrt{5}} = \frac{2(\sqrt{3} + \sqrt{5}) - 2(\sqrt{3} - \sqrt{5})}{(\sqrt{3} - \sqrt{5})(\sqrt{3} + \sqrt{5})} = \frac{4\sqrt{5}}{3 - 5} = -2\sqrt{5}$$

$$\frac{\text{س} + \text{ص}}{\text{س} - \text{ص}} = \frac{\frac{4}{\sqrt{3} + \sqrt{5}}}{-2\sqrt{5}} = \frac{4}{-2\sqrt{5}(\sqrt{3} + \sqrt{5})} = \frac{-2}{\sqrt{5}(\sqrt{3} + \sqrt{5})}$$

مثال ١

$$\frac{4}{\sqrt{3} + \sqrt{7}} = \text{ص} , \frac{4}{\sqrt{3} - \sqrt{7}} = \text{س} \text{ إذا كانت}$$

اثبت أن س ، ص مترافقان ، ثم أوجد قيمة  $\frac{\text{س}^2 \text{ص}^2}{\text{س} - \text{ص}}$ 

الحل

$$\text{ص} = \frac{4}{\sqrt{3} + \sqrt{7}} , \quad \text{س} = \frac{4}{\sqrt{3} - \sqrt{7}}$$

$$\text{س} - \text{ص} = \frac{4}{\sqrt{3} - \sqrt{7}} - \frac{4}{\sqrt{3} + \sqrt{7}} = \frac{4(\sqrt{3} + \sqrt{7}) - 4(\sqrt{3} - \sqrt{7})}{(\sqrt{3} - \sqrt{7})(\sqrt{3} + \sqrt{7})} = \frac{8\sqrt{7}}{3 - 7} = -2\sqrt{7}$$

∴ س ، ص مترافقان (المطلوب الأول)

$$\text{س}^2 \text{ص}^2 = (4)^2 (4)^2 = 256$$

مثال ٢

$$\frac{3}{2 - \sqrt{7}} = \text{س} , \frac{3}{2 + \sqrt{7}} = \text{ص} \text{ إذا كانت}$$

اثبت أن س ، ص مترافقان ، وأوجد قيمة  $\frac{\text{س}^2 + \text{ص}^2}{\text{س} + \text{ص}}$ 

الحل

$$\text{س} = \frac{3}{2 - \sqrt{7}} , \quad \text{ص} = \frac{3}{2 + \sqrt{7}}$$

$$\text{س} + \text{ص} = \frac{3}{2 - \sqrt{7}} + \frac{3}{2 + \sqrt{7}} = \frac{3(2 + \sqrt{7}) + 3(2 - \sqrt{7})}{(2 - \sqrt{7})(2 + \sqrt{7})} = \frac{12}{4 - 7} = -4$$

∴ س ، ص مترافقان (المطلوب الأول)

$$\text{س}^2 + \text{ص}^2 = \left(\frac{3}{2 - \sqrt{7}}\right)^2 + \left(\frac{3}{2 + \sqrt{7}}\right)^2 = \frac{9}{(2 - \sqrt{7})^2} + \frac{9}{(2 + \sqrt{7})^2} = \frac{9(2 + \sqrt{7})^2 + 9(2 - \sqrt{7})^2}{(2 - \sqrt{7})^2 (2 + \sqrt{7})^2} = \frac{9(4 + 4\sqrt{7} + 7) + 9(4 - 4\sqrt{7} + 7)}{(4 - 7)^2} = \frac{9(11 + 4\sqrt{7}) + 9(11 - 4\sqrt{7})}{9} = 22$$

$$22 = \frac{\text{س}^2 + \text{ص}^2}{\text{س} + \text{ص}} \times (-4) = -88$$



## أمثلة على اختصار الجذور

**اختصر لأبسط صورة كل مما يأتي:**

$$\sqrt{20} \sqrt{2} - \sqrt{16} \sqrt{2} + \sqrt{04} \sqrt{2} \quad 0$$

### الحل

$$\frac{2 \times 125 \sqrt{2}}{2} - \frac{2 \times 8 \sqrt{2}}{2} + \frac{2 \times 27 \sqrt{2}}{2} = \text{المقدار}$$

$$\sqrt[2]{2} \cdot 0 - \sqrt[2]{2} \cdot 2 \times 3 + \sqrt[2]{2} \cdot 3 \times 2 =$$

$$\sqrt[2]{v} = \sqrt[2]{0} - \sqrt[2]{1} + \sqrt[2]{1} =$$

$$\sqrt[3]{2} \cdot \sqrt[3]{4} = \sqrt[3]{2 \cdot 4} = \sqrt[3]{8} = 2$$

## الحل

$$\sqrt[3]{7} - \sqrt[3]{8} + \sqrt[3]{27} = \text{المقدار}$$

$$\sqrt[3]{x} \cdot y - \sqrt[3]{x} \cdot y \times y + \sqrt[3]{x} \cdot y =$$

$$\text{صفر} = \sqrt[3]{7} - \sqrt[3]{4} + \sqrt[3]{3} =$$

$$\frac{1}{4}\sqrt{2} - 0.4\sqrt{2} + 1.28\sqrt{2}$$

### الحل

$$\sqrt{8 \times \frac{1}{4}} \sqrt{2} - \sqrt{2 \times 27} \sqrt{2} + \sqrt{2 \times 64} \sqrt{2} = \text{المقدار}$$

$$\sqrt{2} \sqrt{2} - \sqrt{2} \sqrt{2} \times 2 + \sqrt{2} \sqrt{2} =$$

$$\sqrt[2]{2} \cdot 9 =$$

**اختصر لأبسط صورة كل مما يأتي:**

$$\sqrt{98} \sqrt{2} - \sqrt{18} \sqrt{2} + 5 \sqrt{2}$$

### الحل

$$\frac{2 \times 49}{\sqrt{\quad}} - \frac{2 \times 9}{\sqrt{\quad}} + \frac{2 \times 25}{\sqrt{\quad}} = \text{المقدار}$$

$$\sqrt{2}V = \sqrt{2}V_1 - \sqrt{2}V_2 + \sqrt{2}V_3 =$$

$$\sqrt{50}\sqrt{2} - \sqrt{3}\sqrt{3} + \sqrt{12}\sqrt{2}$$

## الحل

$$\sqrt{3 \times 25} \sqrt{-3} \sqrt{3} + 3 \times 4 \sqrt{2} = \text{المقدار}$$

$$\sqrt[3]{0} - \sqrt[3]{3} + \sqrt[3]{2 \times 2} =$$

$$\sqrt[3]{x} = \sqrt[3]{x} \cdot 0 - \sqrt[3]{x} \cdot 3 + \sqrt[3]{x} \cdot 4 =$$

$$\frac{1}{2}\sqrt{x} + 18\sqrt{-0.1}\sqrt{x}$$

### الحل

$$16 \times \frac{1}{4} \sqrt{\phantom{x}} + 2 \times 9 \sqrt{\phantom{x}} - 2 \times 25 \sqrt{\phantom{x}} = \text{المقدار}$$

$$\sqrt{1} + \sqrt{2} - \sqrt{2} =$$

$$\sqrt{2 \times 4} \sqrt{1} + \sqrt{2} \sqrt{1} \sqrt{3} - \sqrt{2} \sqrt{1} \sqrt{0} =$$

$$\sqrt{2} \varepsilon = \sqrt{2} \gamma + \sqrt{2} \gamma - \sqrt{2} \varnothing =$$

$$\sqrt{5} \sqrt{2} + \sqrt{2} \sqrt{2} - \sqrt{10} \sqrt{2}$$

### الحل

$$\sqrt{5} \sqrt{2} + \sqrt{5 \times 4} \sqrt{2} - \sqrt{5 \times 9} \sqrt{2} = \text{المقدار}$$

$$\sqrt{5} \sqrt{2} + \sqrt{5} \sqrt{2} \times 2 - \sqrt{5} \sqrt{3} =$$

$$\sqrt{5} = \sqrt{5} \cdot 2 + \sqrt{5} \cdot 4 - \sqrt{5} \cdot 3 =$$

## التطبيقات

## ١ الدائرة

\* محيط الدائرة =  $\pi \times \text{نق}$ \* مساحة الدائرة =  $\pi \times \text{نق}^2$ 

## مثال ١

دائرة طول قطرها ١٤ سم احسب محيطها ومساحتها

$$\left(\frac{22}{7} = \pi \text{ حيث}\right)$$

## الحل

∴ القطر = ١٤ سم ∴ نق = ٧ سم

$$\text{محيط الدائرة} = \pi \times \text{نق} = 2 \times \frac{22}{7} \times 7 = 44 \text{ سم}$$

$$\text{مساحة الدائرة} = \pi \times \text{نق}^2 = 7 \times 7 \times \frac{22}{7} = 154 \text{ سم}^2$$

## مثال ٢

دائرة مساحتها ٣١٤ سم<sup>٢</sup> احسب محيطها

$$(\text{حيث } \pi = 3,14)$$

## الحل

$$\text{مساحة الدائرة} = \pi \times \text{نق}^2 \quad 314 = 3,14 \times \text{نق}^2$$

$$\text{نق}^2 = \frac{314}{3,14} = 100 \quad \therefore \text{نق} = 10 \text{ سم}$$

$$\text{محيط الدائرة} = \pi \times \text{نق} = 2 \times 3,14 \times 10 = 62,8 \text{ سم}$$

## مثال ٢

دائرة مساحتها  $\pi \times 36$  احسب محيطها

## الحل

$$\text{مساحة الدائرة} = \pi \times \text{نق}^2$$

$$\pi \times 36 = \pi \times \text{نق}^2$$

$$\text{نق}^2 = 36 \quad \therefore \text{نق} = 6 \text{ سم}$$

$$\text{محيط الدائرة} = \pi \times \text{نق} = 2 \times \pi \times 6 = 12\pi \text{ سم}$$

## ٢ المكعب

إذا كان طول حرف المكعب = ل فإن:

$$* \text{مساحة الوجه الواحد} = \text{ل} \times \text{ل} = \text{ل}^2$$

$$* \text{المساحة الجانبية} = 4 \times \text{ل}^2$$

$$* \text{المساحة الكلية} = 6 \times \text{ل}^2$$

$$* \text{حجم المكعب} = \text{ل}^3$$

$$* \text{طول حرف المكعب} = \sqrt[3]{\text{الحجم}}$$

## مثال ١

مكعب طول حرفه ٥ سم

احسب مساحته الجانبية و مساحته الكلية وحجمه

## الحل

$$\text{مساحة الوجه الواحد} = \text{ل}^2 = 5 \times 5 = 25 \text{ سم}^2$$

$$\text{المساحة الجانبية} = 4 \times \text{ل}^2 = 4 \times 25 = 100 \text{ سم}^2$$

$$\text{المساحة الكلية} = 6 \times \text{ل}^2 = 6 \times 25 = 150 \text{ سم}^2$$

$$\text{حجم المكعب} = \text{ل}^3 = 5 \times 5 \times 5 = 125 \text{ سم}^3$$

## مثال ٢

مكعب حجمه ٢١٦ سم<sup>٣</sup>

احسب مساحته الجانبية و مساحته الكلية

## الحل

$$\text{طول حرف المكعب} = \sqrt[3]{\text{الحجم}} = \sqrt[3]{216} = 6 \text{ سم}$$

$$\text{مساحة الوجه الواحد} = \text{ل}^2 = 6 \times 6 = 36 \text{ سم}^2$$

$$\text{المساحة الجانبية} = 4 \times \text{ل}^2 = 4 \times 36 = 144 \text{ سم}^2$$

$$\text{المساحة الكلية} = 6 \times \text{ل}^2 = 6 \times 36 = 216 \text{ سم}^2$$

## ٣ الاسطوانة الدائرية القائمة

\* المساحة الجانبية = محيط القاعدة × الارتفاع

$$= 2\pi \text{ نق ع}$$

\* المساحة الكلية = الجانبية + ٢ × مساحة القاعدة

$$= 2\pi \text{ نق ع} + 2\pi \text{ نق}^2$$

\* الحجم = مساحة القاعدة × الارتفاع

$$= \pi \text{ نق}^2 \text{ ع}$$

مثال ١

اسطوانة دائرية قائمة طول نصف قطرها ٧ سم

وارتفاعها ١٠ سم احسب مساحتها الكلية وحجمها

الحل

المساحة الجانبية =  $2\pi \text{ نق ع}$ 

$$= 2 \times \frac{22}{7} \times 7 \times 10 = 440 \text{ سم}^2$$

المساحة الكلية = الجانبية +  $2\pi \text{ نق}^2$ 

$$= 440 + 2 \times \frac{22}{7} \times 7 \times 7 = 748 \text{ سم}^2$$

حجم الأسطوانة =  $\pi \text{ نق}^2 \text{ ع}$ 

$$= \frac{22}{7} \times 7 \times 7 \times 10 = 1540 \text{ سم}^3$$

مثال ٢

اسطوانة دائرية قائمة حجمها  $1200\pi$  وارتفاعها

١٢ سم احسب مساحتها الكلية

الحل

حجم الأسطوانة =  $\pi \text{ نق}^2 \text{ ع}$ 

$$1200\pi = \pi \text{ نق}^2 \times 12$$

$$\text{نق}^2 = \frac{1200}{12} = 100 \therefore \text{نق} = 10 \text{ سم}$$

المساحة الجانبية =  $2\pi \text{ نق ع}$ 

$$= 2 \times \pi \times 10 \times 12 = 240\pi$$

المساحة الكلية = الجانبية +  $2\pi \text{ نق}^2$ 

$$= 240\pi + 2 \times \pi \times 10 \times 10 = 440\pi$$

$$= 440\pi = 200\pi + 240\pi$$

## ٤ الكرة

\* حجم الكرة =  $\frac{4}{3}\pi \text{ نق}^3$ \* مساحة سطح الكرة =  $4\pi \text{ نق}^2$ 

مثال ١

كرة طول نصف قطرها ٧ سم

احسب حجمها ومساحة سطحها

الحل

حجم الكرة =  $\frac{4}{3}\pi \text{ نق}^3$ 

$$= \frac{4}{3} \times \frac{22}{7} \times 7 \times 7 \times 7 = 4312 \text{ سم}^3$$

مساحة سطح الكرة =  $4\pi \text{ نق}^2$ 

$$= 4 \times \frac{22}{7} \times 7 \times 7 = 616 \text{ سم}^2$$

مثال ٢

كرة حجمها  $36\pi$  احسب مساحة سطحها

الحل

حجم الكرة =  $\frac{4}{3}\pi \text{ نق}^3$   $36\pi = \frac{4}{3}\pi \text{ نق}^3$ 

$$\text{نق}^3 = \frac{3}{4} \times 36 = 27 \therefore \text{نق} = 3 \text{ سم}$$

مساحة سطح الكرة =  $4\pi \text{ نق}^2$ 

$$= 4 \times \pi \times 3 \times 3 = 36\pi$$

مثال ٢

كرة حجمها  $1543,5\pi$  سم<sup>٣</sup> أوجد طول قطرها

الحل

حجم الكرة =  $\frac{4}{3}\pi \text{ نق}^3$ 

$$1543,5\pi = \frac{4}{3}\pi \text{ نق}^3$$

$$1543,5 = \frac{4}{3} \text{ نق}^3 \rightarrow \text{نق}^3 = \frac{3}{4} \times 1543,5$$

$$\text{نق}^3 = \frac{9261}{8} \rightarrow \text{نق} = 10,5 \text{ سم}$$

$$\therefore \text{طول القطر} = 2 \times 10,5 = 21 \text{ سم}$$



## متوازي المستطيلات

٥

إذا كان الطول = س ، العرض = ص ، الارتفاع = ع

∴ محيط القاعدة =  $2(س + ص)$ مساحة القاعدة =  $س \times ص$ \* المساحة الجانبية = محيط القاعدة  $\times$  الارتفاع\* المساحة الكلية = الجانبية  $+ 2 \times$  مساحة القاعدة\* الحجم = مساحة القاعدة  $\times$  الارتفاع

## مثال ١

أيهما أكبر حجماً : أسطوانة دائرية قائمة طول نصف قطر قاعدتها ٧ سم وارتفاعها ١٠ سم أم مكعب طول حرفه ١١ سم

## الحل

حجم الأسطوانة =  $\pi \times \text{نق}^2 \times ع$ 

$$= \frac{22}{7} \times 7 \times 7 \times 10 =$$

$$= 1540 \text{ سم}^3$$

حجم المكعب =  $ل^3$ 

$$= 11 \times 11 \times 11 =$$

$$= 1331 \text{ سم}^3$$

∴ حجم الاسطوانة &lt; حجم المكعب

## مثال ١

متوازي مستطيلات بعدا قاعدته ٤ سم ، ٥ سم ،

ارتفاعه ٦ سم ، أوجد مساحته الكلية وحجمه

## الحل

$$\text{مساحة القاعدة} = ٥ \times ٤ = ٢٠$$

$$\text{محيط القاعدة} = ٢(٥ + ٤) = ١٨ = ٩ \times ٢$$

$$\text{الجانبية} = \text{محيط القاعدة} \times ع = ١٨ \times ٦ = ١٠٨ \text{ سم}^2$$

$$\text{المساحة الكلية} = \text{الجانبية} + ٢ \times \text{مساحة القاعدة}$$

$$= ١٠٨ + ٢ \times ٢٠ = ١٤٨ \text{ سم}^2$$

$$\text{الحجم} = \text{مساحة القاعدة} \times ع = ٢٠ \times ٦ = ١٢٠ \text{ سم}^3$$

## مثال ١

كرة من المعدن طول قطرها ٦ سم صُهرت وحولت إلى أسطوانة دائرية قائمة طول نصف قطر قاعدتها ٣ سم

احسب ارتفاع الاسطوانة

## الحل

∴ طول قطر الكرة = ٦ سم ∴ نق = ٣ سم

∴ الكرة صُهرت وحولت إلى اسطوانة

∴ حجم الكرة = حجم الاسطوانة

$$\frac{4}{3} \pi \text{ نق}^3 = \pi \text{ نق}^2 \times ع$$

$$\frac{4}{3} \times 3 \times 3 \times 3 = \text{نق}^2 \times ٣$$

$$٤٨ = \text{نق}^2 \times ٣$$

$$\text{نق}^2 = \frac{٤٨}{٣} = ١٦$$

∴ نق = ٤ سم

## مثال ٢

متوازي مستطيلات قاعدته مربعة الشكل طول ضلعها

٥ سم ، ارتفاعه ٤ سم أوجد حجمه ومساحته الكلية

## الحل

∴ القاعدة مربعة الشكل:

$$\text{مساحة القاعدة} = \text{طول الضلع} \times \text{نفسه} = ٥ \times ٥ = ٢٥$$

$$\text{محيط القاعدة} = \text{طول الضلع} \times ٤ = ٥ \times ٤ = ٢٠$$

$$\text{الجانبية} = \text{محيط القاعدة} \times ع = ٢٠ \times ٤ = ٨٠ \text{ سم}^2$$

$$\text{المساحة الكلية} = \text{الجانبية} + ٢ \times \text{مساحة القاعدة}$$

$$= ٨٠ + ٢ \times ٢٥ = ١٣٠ \text{ سم}^2$$

$$\text{الحجم} = \text{مساحة القاعدة} \times ع = ٢٥ \times ٤ = ١٠٠ \text{ سم}^3$$

## حل المعادلات و المتباينات


٤ أوجد في ح مجموعة حل المتباينة:

$$١١ \leq ٣س - ٥$$

الحل

$$٣س - ١١ \leq ٥ \quad \therefore ٣س \leq ١٦ \quad \text{هنا نغير العلامة}$$

$$س \geq \frac{١٦}{٣} \quad \text{م. ح.} \leftarrow س \geq ٥ \quad \text{م. ح.} \leftarrow س \geq ٥$$



٥ أوجد في ح مجموعة حل المتباينة:

$$٥ > ١ - ٣س \geq ٣$$

الحل

$$١ + ٥ > ١ - ٣س \geq ٣$$

$$٦ > ١ - ٣س \geq ٣ \quad (٢ \div)$$

$$١ - ٣س \geq ٣ \quad \therefore ٣س \leq ١ - ٣ \quad \text{م. ح.} \leftarrow س \leq -٢$$



٦ أوجد في ح مجموعة حل المعادلة:

$$٥س - ٣ < ٣ + ٧$$


الحل

خلي السينات قبل = والأعداد المطلقة بعد =

$$٥س - ٣ < ٣ + ٧$$

$$٥س < ١٠ \quad \therefore س < ٢$$

$$س < ٢ \quad \text{م. ح.} \leftarrow س < ٢$$



\* مجموعة حل المعادلة عبارة عن مجموعة

\* مجموعة حل المتباينة عبارة عن فترة

\* عند ضرب أو قسمة طرفي المتباينة في عدد سالب نغير علامة التباين.

فمثلاً: ٢س &lt; ٦ ← س &lt; ٣

١ أوجد في ح مجموعة حل المعادلة:

$$٣\sqrt[٣]{س} = ٢ + ٥$$

الحل

$$٣\sqrt[٣]{س} = ٧ \quad \leftarrow ٣\sqrt[٣]{س} = ٧$$

$$\sqrt[٣]{س} = \frac{٧}{٣} = \frac{٣\sqrt[٣]{٣}}{٣} = \frac{\sqrt[٣]{٣}}{١} \times \frac{٣}{٣} = \frac{٣}{٣} = ١$$

$$\therefore \text{م. ح.} \leftarrow س = ١$$



٢ أوجد في ح مجموعة حل المعادلة:

$$١ = \sqrt[٢]{س} - ١$$

الحل

$$١ + ١ = \sqrt[٢]{س} \quad \therefore \text{م. ح.} \leftarrow س = ٤$$


٣ أوجد في ح مجموعة حل المتباينة:

$$٢س - ١ < ٣$$

الحل

$$٢س < ٤ \quad \leftarrow ٢س < ٤ \quad \leftarrow س < ٢$$

$$س < ٢ \quad \text{م. ح.} \leftarrow س < ٢$$



## العلاقة بين متغيرين

٣ إذا كان (٢، ٣) يحقق العلاقة  $٢س - كص = ١٠$

فأوجد قيمة ك

**الحل**

من الزوج (٢، ٣) نأخذ  $س = ٢$  ،  $ص = ٣$

ونعوض في العلاقة  $٢س - كص = ١٠$

$$\therefore ٢ \times ٢ - ك \times ٣ = ١٠$$

$$٤ - ٣ك = ١٠$$

$$-٣ك = ١٠ - ٤$$

$$-٣ك = ٦ \therefore ك = \frac{٦}{-٣} = -٢$$

٤ إذا كان (ك، ٢) يحقق العلاقة  $س + ص = ٣٠$

فأوجد قيمة ك

**الحل**

من الزوج (ك، ٢) نأخذ  $س = ك$  ،  $ص = ٢$

$$\therefore ك + ٢ = ٣٠$$

$$٣٠ = ك + ٢ \therefore ك = ٢٨$$

\* لإيجاد نقطة التقاطع مع محور السينات نضع  $ص = ٠$

\* لإيجاد نقطة التقاطع مع محور الصادات نضع  $س = ٠$

٥ إذا كانت  $٢س + ٣ص = ٦$

فأوجد نقط تقاطع المستقيم مع محور السينات والصادات

**الحل**

لإيجاد نقطة التقاطع مع محور السينات نضع  $ص = ٠$

$$\therefore ٢س + ٣ \times ٠ = ٦ \quad ٢س = ٦ \quad س = ٣$$

$\therefore$  نقطة التقاطع مع محور السينات هي (٣، ٠)

لإيجاد نقطة التقاطع مع محور الصادات نضع  $س = ٠$

$$\therefore ٢ \times ٠ + ٣ص = ٦ \quad ٣ص = ٦ \quad ص = ٢$$

$\therefore$  نقطة التقاطع مع محور السينات هي (٠، ٢)

\*  $أس + ب ص = ج$  تسمى علاقة خطية

\* يوجد عدد لا نهائي من الأزواج المرتبة تحقق العلاقة

\* العلاقة الخطية تمثل بيانيا بخط مستقيم.

\* لتمثيل العلاقة خلى الـ ص لوحدها  $ص = أس + ج$

وافرض قيم للـ س من دماغك وعوض بيها في العلاقة

١ أوجد ثلاثة أزواج مرتبة تحقق العلاقة:

$$س + ص = ٣$$

**الحل**

نخلى الـ ص لوحدها:  $ص = ٣ - س$

$$\text{نضع } س = ١ \therefore ص = ٣ - ١ = ٢$$

$$\therefore (١، ٢) \text{ يحقق العلاقة}$$

$$\text{نضع } س = ٢ \therefore ص = ٣ - ٢ = ١$$

$$\therefore (٢، ١) \text{ يحقق العلاقة}$$

$$\text{نضع } س = ٣ \therefore ص = ٣ - ٣ = ٠$$

$$\therefore (٣، ٠) \text{ يحقق العلاقة}$$

٢ أوجد ثلاثة أزواج مرتبة تحقق العلاقة:

$$٢س - ص = ٢$$

**الحل**

نخلى الـ ص لوحدها:  $ص = ٢س - ٢$

$$ص = ٢ - ٢س$$

$$\text{نضع } س = ١ \therefore ص = ٢ - ٢ \times ١ = ٠$$

$$\therefore (١، ٠) \text{ يحقق العلاقة}$$

$$\text{نضع } س = ٢ \therefore ص = ٢ - ٢ \times ٢ = -٢$$

$$\therefore (٢، -٢) \text{ يحقق العلاقة}$$

$$\text{نضع } س = ٣ \therefore ص = ٢ - ٢ \times ٣ = -٤$$

$$\therefore (٣، -٤) \text{ يحقق العلاقة}$$



## الميل

$$\text{ميل المستقيم} = \frac{\text{فرق الصادات}}{\text{فرق السينات}} = \frac{ص_2 - ص_1}{س_2 - س_1}$$

\* ميل المستقيم الموازي لمحور السينات = صفر

\* ميل المستقيم الموازي لمحور الصادات غير معرف

\* لإثبات أن النقط أ ، ب ، ج تقع على استقامة واحدة

نثبت أن: ميل أ ب = ميل ب ج

١) أوجد ميل المستقيم المار بالنقطتين (٤، -٤) ، (٧، ٥)

## الحل

$$\text{الميل} = \frac{\text{فرق الصادات}}{\text{فرق السينات}} = \frac{٥ - (-٤)}{٧ - ٤} = \frac{٩}{٣} = ٣$$

٢) اثبت أن النقط أ (١، ٢) ، ب (١، -٣) ، ج (٥، ٠)

تقع على استقامة واحدة

## الحل

$$\text{ميل أ ب} = \frac{\text{فرق الصادات}}{\text{فرق السينات}} = \frac{٢ - ٣}{١ - ١} = \frac{-١}{٠} = \frac{١}{٢}$$

$$\text{ميل ب ج} = \frac{\text{فرق الصادات}}{\text{فرق السينات}} = \frac{٣ - ٠}{١ - ٥} = \frac{٣}{-٤} = -\frac{٣}{٤}$$

∴ ميل أ ب = ميل ب ج ∴ النقط على استقامة واحدة

٣) إذا كان ميل المستقيم المار بالنقطتين (٤، ص) ، (١، -٥) ،

يساوى ٣ فأوجد قيمة ص

## الحل

$$\text{الميل} = \frac{\text{فرق الصادات}}{\text{فرق السينات}} = \frac{ص - ٥}{١ - ٤} = ٣$$

$$\frac{ص - ٥}{١ - ٤} = ٣ \quad \leftarrow \quad ٣ = \frac{ص - ٥}{١ - ٤}$$

$$٣ = \frac{ص - ٥}{١ - ٤} \quad \leftarrow \quad ٣ \times (١ - ٤) = ص - ٥$$

$$٣ \times (١ - ٤) = ص - ٥ \quad \leftarrow \quad ٣ \times (-٣) = ص - ٥$$

$$-٩ = ص - ٥ \quad \leftarrow \quad -٩ + ٥ = ص$$

$$-٤ = ص$$

٥) مثل بيانيا العلاقة : ص = ٢س - ١

## الحل

$$\text{نضع س} = ٠ \quad \therefore \text{ص} = ٢ \times ٠ - ١ = -١$$


∴ (٠، -١) يحقق العلاقة

$$\text{نضع س} = ١ \quad \therefore \text{ص} = ٢ \times ١ - ١ = ١$$

∴ (١، ١) يحقق العلاقة

$$\text{نضع س} = ٢ \quad \therefore \text{ص} = ٢ \times ٢ - ١ = ٣$$

∴ (٢، ٣) يحقق العلاقة




٦) مثل بيانيا العلاقة : ص = س + ٤

## الحل

نخلى الـ ص لوحدتها: ص = س + ٤

وممكن نعمل فكرة الجدول بس نعوض بره الجدول

س	١	٢	٣
ص	٣	٤	٥



الدرجة

السؤال الأول:- اختر الإجابة الصحيحة فما يلي:-

درجة

١ حجم مكعب طول حرفه ٧ سم = ..... سم<sup>٣</sup>

١٠٠٠

٣٤٣

١٢٥

٧

درجة

٢  $2\sqrt{10} - 8\sqrt{10} + 4\sqrt{10} = \dots\dots\dots$

صفر

١-

٣

٢

درجة

٣  $[-\infty, \infty] = \dots\dots\dots$

ج +

ص

ط

ج

السؤال الثاني:- أكمل ما يأتي:-

درجة

١ حجم متوازي مستطيلات أبعاده  $\sqrt{2}$  ،  $\sqrt{3}$  ،  $\sqrt{6}$  سم = ..... سم<sup>٣</sup>

درجة

٢ حاصل ضرب العدد  $(\sqrt{5} - ٤)$  ومرافقه = .....

درجة

٣ المعكوس الضربي للعدد  $\frac{\sqrt{2}}{3} = \dots\dots\dots$

درجتان

١ إذا كانت  $M = \{3, 2, -\}$  ،  $N = \{1, ٥\}$

السؤال الثالث:-

١  $M \cap N$

أوجد  $M \cup N$

درجتان

٢ اختصر لأبسط صورة:


$$\frac{3}{4}\sqrt{8} + \frac{1}{2}\sqrt{3} - 3\sqrt{2}$$

إنتهت الاسئلة بالتوفيق ...

## الدرس الرابع : نتائج على نظريات المثلث المتساوي الساقين

**نتيجة (1) :**

متوسط المثلث المتساوي الساقين المرسوم من الرأس ينصف زاوية الرأس ويكون عمودياً على القاعدة



فقى الشكل المقابل :

إذا كان :  $\Delta$  م ب ح فيه :

$p = p$  ،  $\overline{p}$  متوسط فان :

(1)  $\vec{a}$  ينصف  $\vec{b}$  \ ب م ح

أى أن :  $\mathcal{U}(\Delta \text{ ب } \mathcal{P} \mathcal{E}) = \mathcal{U}(\Delta \text{ ح } \mathcal{P} \mathcal{E})$


$\overline{c} \quad \overline{b} \quad \overline{a} \quad (7)$

**ملاحظة :**

$$\Delta \text{ ب } \mathcal{P} \equiv \Delta \text{ ح } \mathcal{P} \quad \text{لأن : } \mathcal{P} \text{ ضلع مشترك ،}$$
$$\mathcal{P} \text{ ح } = \mathcal{P} \text{ ب ، } \mathcal{P} \text{ ح } = \mathcal{P} \text{ ب}$$

**نتيجة (٢) :**

منصف زاوية رأس المثلث المتساوي الساقين ينصف القاعدة ويكون عمودياً عليها



فقى الشكل المقابل :

إذا كان :  $\Delta$  م ب ح فيه :

ب = ب ، ب ← ينصف ب ب ح فإن :

(١)  $\epsilon$  منتصف  $\overline{b-d}$  أى أن :  $b \epsilon = \epsilon d$

$\overline{ab} \perp \overline{cd}$  (۲)

أحمد التنتوي<sup>5</sup>


**ملاحظة :**

$$\Delta \vdash B \equiv \Delta \vdash A \quad \text{لأن : } \overline{A} \text{ ضلع مشترك ،}$$

$$\vdash B = \vdash A \quad ، \quad \vdash B = \vdash A \quad \text{،} \quad \vdash B = \vdash A$$

### نتيجة (٣) :

المستقيم المرسوم من رأس المثلث المتساوي الساقين عمودياً على القاعدة ينصف كلاً من القاعدة و زاوية الرأس



**فقى الشكل المقابل :**

إذا كان :  $\Delta$  م ب ح فيه :

$\overline{A} \cup B = A$ ,  $A \cap \overline{B} = \emptyset$  فإن :

(۱) ۛ منتصف ب ح

أَيُّ أَنْ : ب = ع = ح


$$(\varepsilon \vdash \supset \supset) \mathcal{U} = (\varepsilon \vdash \supset \supset) \mathcal{U} \quad (\Gamma)$$

**ملاحظة :**

$$\Delta \text{ ب } \Delta \equiv \Delta \text{ ح } \Delta \quad \text{لأن : } \overline{\Delta \text{ ع}} \text{ ضلع مشترك ،}$$

$$^{\circ}9. = (\Delta \text{ ع } \Delta) \cup = (\Delta \text{ ب } \Delta) \cup , \quad \Delta \text{ ح } = \Delta \text{ ب }$$

① في الشكل المقابل :



$\Delta \text{ ب د } \perp \text{ ب د } : \text{ ب د } = \text{ ب د } , \text{ ب د } \perp \text{ ب د}$

$$^{\circ} \text{ ۳۲} = ( \text{ ب پ ع } ) \cup ,$$

، ب ح = ٦ سم أوجد :

و (بـ مـ د) ، طول بـ ء

أحمد التنتوي<sup>5</sup>






## محاور التماثل :

أولاً : محاور تماثل للمثلث المتساوي الساقين :

محور تماثل المثلث المتساوي الساقين هو المستقيم المرسوم من رأسه عمودياً على قاعدته  
ففي الشكل المقابل :




إذا كان :  $\triangle P$  ب د فيه :  
 $P = B = D$  ،  $\overline{PE} \perp \overline{BD}$  فإن :  
 $\overline{PE}$  هو محور تماثل للمثلث  $P$  ب د المتساوي الساقين

## ملاحظات :

- (١) المثلث المتساوي الساقين له محور تماثل واحد فقط
- (٢) المثلث المتساوي الأضلاع له ثلاثة محاور تماثل
- (٣) المثلث المختلف الأضلاع له محاور تماثل

ثانياً : محاور تماثل القطعة المستقيمة :

يسمى المستقيم العمودي على قطعة مستقيمة محور تماثل لهذه القطعة المستقيمة  
و للاختصار يسمى محور القطعة المستقيمة  
ففي الشكل المقابل :




إذا كانت :  $E$  منتصف  $\overline{AB}$  ،  
المستقيم  $l \perp \overline{AB}$  حيث :  $E \in l$   
فإن : المستقيم  $l$  هو محور تماثل  $\overline{AB}$

## خاصية :

أي نقطة على محور تماثل القطعة المستقيمة تكون على بعدين متساويين من طرفيها

ففي الشكل المقابل :


إذا كان : المستقيم  $l$  محور تماثل  $\overline{AB}$   
فإن :

(١) إذا كان :  $P \in l$  فإن :

$$P = B = D$$

(٢) إذا كان :  $P = B = D$  فإن :هـ  $\in l$  لأن : عكس الخاصية صحيح

فإذا كانت هناك نقطة على بعدين متساويين من طرفي قطعة مستقيمة فإن هذه النقطة تقع على محور هذه القطعة المستقيمة



(٤) في الشكل المقابل :


$$P = B = D = 60^\circ \text{ سم} , \quad B = D = 60^\circ \text{ سم} ,$$

$$P \cap \overline{BD} = \{E\} , \quad B = D = 60^\circ \text{ سم}$$

اوجد طول كل من :  $\overline{PE}$  ،  $\overline{BE}$  ،  $\overline{DE}$


(٥) في الشكل المقابل :

$\overline{بم} = \overline{بم}$  ،  $\{م\} = \overline{بم} \cap \overline{بم}$   
 $بم = ب$  ، أثبت أن :  
 $م$  منتصف  $\overline{بم}$




(٧) في الشكل المقابل :

$\triangle ب د ح$  فيه :  $بم = ب$  ،  
 $\angle (ب د ع) = \angle (ب د ح)$   
 أثبت أن :  $\overline{بم}$  محور  $\overline{ب د}$




(٦) في الشكل المقابل :

$ص ل = ص ل$  ،  $ع ص = ع ل$   
 $ل ص = ص م$  أثبت أن :  
 $س$  ،  $م$  ،  $ع$  على استقامة واحدة



(٨) في الشكل المقابل :

$بم = ب$  ،  $\overline{بم} \parallel \overline{بم}$  ،  
 $\overline{بم} \parallel \overline{بم}$  أثبت أن :  $بم = ب$   
 $\angle (ب د ع) = \angle (ب د ح)$  ،



أحمد الشنتوري



(٩) أكمل ما يلي :

[١] المستقيم المرسوم من رأس المثلث المتساوي الساقين عمودياً على القاعدة يسمى ....

[٢] المستقيم العمودي على القطعة المستقيمة من منتصفها يسمى ....

[٣] أي نقطة تنتمي لمحور القطعة المستقيمة تكون على بعدين .... من طرفيها

[٤] في  $\Delta PQR$  إذا كان  $P = 70^\circ$  ،  $Q = (P \geq)$  ،  $R = 110^\circ$  ، فإن : عدد محاور تماثل  $\Delta PQR =$  ....

[٥] في  $\Delta PQR$  إذا كان  $P = 50^\circ$  ،  $Q = (P \geq)$  ،  $R = 80^\circ$  ، فإن : عدد محاور تماثل  $\Delta PQR =$  ....

[٦] إذا كان  $\Delta PQR$  له محور تماثل واحد و فيه :

$Q = (P \geq)$  ،  $R = 120^\circ$  ، فإن :  $P =$  ....

[٧] العمود الساقط من رأس المثلث المتساوي الساقين على القاعدة ينصف كلاً من .... ، ....

[٨] الشعاع المنصف لزاوية رأس المثلث المتساوي الساقين ينصف .... و يكون ....

(١٠) اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة :

[١] إذا كان طول أي ضلع في مثلث  $= \frac{1}{2}$  محيط المثلث فإن : عدد محاور تماثل المثلث = ....

( صفر ، ١ ، ٢ ، ٣ )

[٢] في المعين  $ABCD$  يكون :  $AC$  محور تماثل هو ....

(  $\overleftrightarrow{AC}$  ،  $\overleftrightarrow{BD}$  ،  $\overleftrightarrow{AB}$  ،  $\overleftrightarrow{CD}$  )

[٣] إذا كان :  $AC$  هو محور تماثل  $ABCD$  فإن : ....

(  $AB = CD$  ،  $AD = BC$  ،  $AC = BD$  ،  $AB = AD$  )

(  $AB = CD$  ،  $AD = BC$  ،  $AC = BD$  ،  $AB = AD$  )

[٤] إذا كان :  $ABCD$  شكل رباعي فيه :  $AB = CD$  ،  $AD = BC$  ،

$AC = BD$  ، فإن :  $ABCD$  هو ....

( يوازي ، عمودي على ، محور تماثل ، يطابق )

[٥] إذا كان :  $\Delta ABC$  قائم الزاوية في  $B$  ،  $C = 50^\circ$  ،  $A =$  ....

فإن : عدد محاور تماثل  $\Delta ABC =$  ....

( صفر ، ١ ، ٢ ، ٣ )

[٦] إذا كان :  $\Delta ABC$  قائم الزاوية في  $B$  ،  $C = 40^\circ$  ،  $A =$  ....

فإن : عدد محاور تماثل  $\Delta ABC =$  ....

( صفر ، ١ ، ٢ ، ٣ )

[٧] المستقيم العمودي على القطعة المستقيمة من منتصفها يسمى لها ....

( موازي ، منصف ، متوسط ، محور تماثل )

أحمد الشنتوري

## الوحدة الخامسة

## التباين

## الدرس الأول : التباين

مفهوم التباين :  
نعلم أن :

علاقة التباين هي العلاقة التي تستخدم للمقارنة بين عددين مختلفين و نعبّر عنها بإحدى العلامتين :  $<$  (أكبر من) ، (أصغر من) و تسمى كل منهما متباينة أو علاقة تباين و لما كانت أطوال القطع المستقيمة و كذلك قياسات الزوايا عبارة عن أعداد لذا تستخدم علاقة التباين للمقارنة بين طولى قطعتين مستقيمتين أو قياسى زاويتين

فمثلاً :

(١) إذا كان :  $m = 6$  سم ،  $n = 4$  سم فإن :

$m < n$  أو  $n > m$

(٢) إذا كان :  $m = 60^\circ$  ،  $n = 42^\circ$  فإن :

$m > n$  أو  $n < m$

(١) أكمل ما يلى مستخدماً علامة ( $>$  أو  $<$ ) :

(١) إذا كانت  $m$  حادة فإن :  $m > 90^\circ$  ....

(٢) إذا كانت  $n$  منفرجة فإن :  $n > 90^\circ$  ....

(٣) إذا كان :  $s = 3$  سم ،  $l = 5$  سم

فإن :  $l > s$  ....

أحمد الشنتوري

(٢) فى الشكل المقابل :

[١] أكمل :

(١)  $m \angle P = \dots$

(٢)  $m \angle D = \dots$

[٢] أكمل ما يلى مستخدماً علامة ( $>$  أو  $<$ ) :


(١)  $m \angle D = \dots$   $m \angle P$

(٢)  $m \angle D = \dots$   $m \angle P$

(٣)  $m \angle D = \dots$   $m \angle P$

(٤)  $m \angle D = \dots$   $m \angle P$

(٣) فى الشكل المقابل أكمل ما يلى مستخدماً علامة ( $>$  أو  $<$ ) :



[١]  $m \angle D = \dots$

[٢]  $m \angle D = \dots$

[٣]  $m \angle D = \dots$

[٤]  $m \angle D = \dots$


[٥]  $m \angle D = \dots$

أحمد الشنتوري


## مسلمات التباين :

لأي ثلاثة أعداد  $s, v, e$  :[١] إذا كان :  $s < v$  فإن :  $s + e < v + e$ [٢] إذا كان :  $s < v$  فإن :  $s - e < v - e$ [٣] إذا كان :  $s < v$  ،  $e$  عدداً موجباًفإن :  $s + e < v + e$ [٤] إذا كان :  $s < v$  ،  $v < e$  فإن :  $s < e$ [٥] إذا كان :  $s < v$  ،  $v < e$  ،  $e < s$ فإن :  $s + v < e + s$ 


## (٤) في الشكل المقابل :

إذا كان :  $\overrightarrow{PM} \supset \overrightarrow{PE}$  ،  $\overrightarrow{PM} \supset \overrightarrow{PD}$ ، كان :  $PM < PD$  ،أثبت أن :  $PM < PD$  ،  $PD < PE$ 

## (٥) في الشكل المقابل :


 $\triangle PDE$  فيه :  $PM < PD$  ،أثبت أن :  $PM < PE$  $PM < PD$ 

## (٦) في الشكل المقابل :


إذا كان :  $\overrightarrow{PM} \supset \overrightarrow{PD}$  ،  $\overrightarrow{PM} \supset \overrightarrow{PE}$ ، أثبت أن :  $PM < PD$  ، $PM < PD$  ،  $PD < PE$ 



(٧) في الشكل المقابل :

إذا كان :  $\angle (P, B, E) = 120^\circ$ ،  $\angle (P, D, H) = 100^\circ$ رتب قياسات زوايا  $\triangle P, B, D$  تصاعدياً

(٨) في الشكل المقابل :


 $P, B, D, E$  متوازي أضلاع ،  $\angle B > \angle E$ أثبت أن :  $\angle P + \angle B < \angle D + \angle E$ 

(٩) أكمل ما يلي :

[١] إذا كان :  $P, B, D$  أعداد موجبة ، و كان :  $B < P$ فإن :  $P + D \dots B + D$ [٢] إذا كان :  $P, B, D$  أعداد موجبة ، و كان :  $B < P$ ،  $B < D$  فإن :  $P \dots D$ [٣] إذا كان :  $\angle (P, B, E) < \angle (P, D, H)$  فإن :مكمل  $P \geq \dots$  مكمل  $D$ [٤] إذا كانت النقط :  $P, B, D, E$  على استقامة واحدة ، و كان $P = 3$  سم ،  $B = D = 2$  سم ،  $D = E = 2$  سمفإن :  $P + D \dots B + E$ [٥] إذا كان :  $\overrightarrow{PB}$  ينصف  $\angle B$  فإن : $\angle (P, B, E) \dots \angle (P, D, H)$ 

أحمد الشنتوري

(١) في الشكل المقابل

في  $\Delta P$  ب ج متساوي الساقين

$$\therefore \overline{PB} = \overline{PC}$$

$$\therefore \overline{PS} \perp \overline{BC}$$

$$\therefore \overline{PS} \text{ ينصف } (\overline{BC})$$

$$\therefore \overline{PS} \text{ ينصف } \overline{BC}$$

$$\therefore \text{ب ج} = 10 \text{ سم} \therefore \text{ب س} = 10 \div 2 = 5 \text{ سم} \quad \blacksquare$$

في  $\Delta P$  ب س القائم الزاوية في ع

$$\therefore \text{ق} (\text{ح ب س}) = 30^\circ$$

$$\therefore \text{ب س} = \frac{1}{2} \text{ ب ج}$$

$$\therefore \text{ب ج} = 2 \times 5 = 10 \text{ سم}$$

في  $\Delta P$  ب س القائم الزاوية في ع

$$^2(\text{س ب}) - ^2(\text{ب ج}) = ^2(\text{س ب})$$

$$^2(5) - ^2(10) = ^2(\text{س ب})$$

$$^2(\text{س ب}) = 25 - 100 = 75$$

$$\text{س ب} = \sqrt{75} = 5\sqrt{3} \text{ سم} \quad \blacksquare$$


$$\text{مساحة } \Delta \text{ ب ج} = \frac{1}{2} \times \text{طول القاعدة} \times \text{الإرتفاع}$$

$$\text{مساحة } \Delta \text{ ب ج} = \frac{1}{2} \times \text{ب ج} \times \text{س ب}$$

$$\text{مساحة } \Delta \text{ ب ج} = \frac{1}{2} \times 10 \times 5\sqrt{3} = 25\sqrt{3} \text{ سم}^2 \quad \blacksquare$$

## نتائج على نظريات المثلث متساوي الساقين

**نتيجة ١** متوسط المثلث المتساوي الساقين المرسوم من الرأس ينصف زاوية الرأس و يكون عمودياً على القاعدة

في  $\Delta P$  ب ج


$$\therefore \overline{PB} = \overline{PC}$$

$$\therefore \overline{PS} \text{ ينصف } \overline{BC}$$

$$\therefore \overline{PS} \text{ ينصف } (\overline{BC})$$

$$\therefore \overline{PS} \perp \overline{BC}$$

**نتيجة ٢** منصف زاوية الرأس في المثلث المتساوي الساقين ينصف القاعدة و يكون عمودياً عليها

في  $\Delta P$  ب ج


$$\therefore \overline{PB} = \overline{PC}$$

$$\therefore \overline{PS} \text{ ينصف } (\overline{BC})$$

$$\therefore \overline{PS} \text{ ينصف } \overline{BC}$$

$$\therefore \overline{PS} \perp \overline{BC}$$

**نتيجة ٣** المستقيم المرسوم من رأس المثلث المتساوي الساقين عمودياً على القاعدة ينصف كلاً من القاعدة و زاوية الرأس

في  $\Delta P$  ب ج


$$\therefore \overline{PB} = \overline{PC}$$

$$\therefore \overline{PS} \perp \overline{BC}$$

$$\therefore \overline{PS} \text{ ينصف } \overline{BC}$$

$$\therefore \overline{PS} \text{ ينصف } (\overline{BC})$$


(٣) في الشكل المقابل  $\overrightarrow{AM}$  ينصف (ح ب ج)   
 $AM = MB$  اثبت أن  $AB = 2AM$  ،  $AB = 2AM$  ،  $AB = 2AM$



في  $\Delta$  م ب ج متساوي الساقين

ۛ = ۛ

∴  $\overline{AP}$  ينصف  $(PQ)$

∴  $\overline{AH}$  ينصف  $\overline{AB}$  ∴  $BH = AH$  

∴  $\overline{AP} \perp \overline{BC}$

**فی  $\Delta$  ب و ج**


## وہ ینصف ب ج

ج ۵۰

۲۴ ∴ ی ب = ی ج

∴  $\overline{y}$  ينصف (ح ب و ج)

$\overline{P} \perp \overline{AB}$  ،  $\overline{P} // \overline{CB}$  اثبت أن  $P = B$  ،  $B = H$



∴  $\overline{s} // \overline{جَب}$  ،  $\overline{وَب}$  قاطع لهما

١. ∴ ق(Δsp) = ق(Δوب ج) بالتبادل

، بھ ینصف (ب ج)

٢  $\therefore \text{ق}(\Delta \text{ب س}) = \text{ق}(\Delta \text{س ج})$

من ١، ٢

$$\therefore q(\sup s) = q(\sup s)$$

۱۴  $sp = p$  ::

في  $\Delta$  متساوي الساقين

$sp = p \because$

$\therefore \overline{p} \text{ يَنصِف } (p \supset)$

۲۴  $\therefore \overline{AH} \text{ ينصف } \overline{B} \therefore \overline{BH} = \overline{AH}$

۴۰۰ ب و



## مسلمات التباين

إذا كان س ، ص ، ع ، ل ، أ ، ب أعداد حقيقية

(١) إذا كان س < ص فإن س + ع < ص + ع

مثال س = ٧ ، ص = ٥ ، ع = ٣

س < ص ٥ < ٧

س + ع < ص + ع ٨ < ١٠ ٣ + ٥ < ٣ + ٧

(٢) إذا كان س < ص فإن س - ع < ص - ع

مثال س = ٧ ، ص = ٥ ، ع = ٣

س < ص ٥ < ٧

س - ع < ص - ع ٢ < ٤ ٣ - ٥ < ٣ - ٧

(٣) إذا كان س < ص ، ع عدداً موجباً ع < ٠

فإن س ع < ص ع

مثال س = ٧ ، ص = ٥ ، ع = ٣

س < ص ٥ < ٧

س ع < ص ع ١٥ < ٢١ ٣ × ٥ < ٣ × ٧

(٤) إذا كان س < ص ، ع عدداً سالباً ع > ٠

فإن س ع > ص ع

مثال س = ٧ ، ص = ٥ ، ع = -٣

س < ص ٥ < ٧

س ع > ص ع

١٥ > ٢١ - ٣ - × ٥ > ٣ - × ٧

(٥) إذا كان س < ص ، ص < ع فإن س < ع

مثال س = ٧ ، ص = ٥ ، ع = ٣

س < ص ٥ < ٧ ، ص < ع ٣ < ٥

فإن س < ع ٣ < ٧


(٦) إذا كان س < ص ، أ < ب

فإن س + أ < ص + ب


مثال س = ٧ ، ص = ٥ ، أ = ٣ ، ب = ١

٦ < ١٠ ١ + ٥ < ٣ + ٧


محور التماثل للمثلث المتساوي الساقين هو المستقيم المرسوم من رأسه عمودياً على قاعدته



محور تماثل القطعة المستقيمة هو المستقيم العمودي عليها من منتصفها



أى نقطة على محور تماثل القطعة المستقيمة تكون على بعدين متساويين من طرفيها




عدد محاور تماثل المثلث متساوي الأضلاع = ٣  
عدد محاور تماثل المثلث متساوي الساقين = ١  
عدد محاور تماثل المثلث مختلف الأضلاع = ٠

(٢) في الشكل المقابل

 $\overline{PB} \parallel \overline{JH}$  أثبت أن

$$ق(\angle PJB) < ق(\angle JSB)$$

$$ق(\angle JSB) < ق(\angle HSB)$$

 $\therefore \overline{PB} \parallel \overline{JH}$  ،  $\overline{BJ}$  قاطع لهما

$$\therefore ق(\angle PJB) = ق(\angle JSB) \text{ بالتبادل } ١$$

$$\therefore ق(\angle JSB) = ق(\angle JSB) + ق(\angle HSB)$$

$$\therefore ق(\angle JSB) < ق(\angle HSB) \quad ٢$$

من ١ ، ٢

$$\therefore ق(\angle JSB) < ق(\angle HSB)$$

$$\therefore ق(\angle HSB) \text{ خارجة عن } \triangle PJB$$

$$\therefore ق(\angle HSB) = ق(\angle JSB) + ق(\angle PJB)$$

$$\therefore ق(\angle HSB) < ق(\angle JSB)$$


$$\therefore ق(\angle JSB) < ق(\angle HSB) \text{ برهاناً}$$

$$\therefore ق(\angle JSB) < ق(\angle HSB)$$

(١) في الشكل المقابل

$$SB = SJ ، ق(\angle PJB) < ق(\angle JSB)$$

$$\text{اثبت أن } ق(\angle JSB) < ق(\angle HSB)$$



$$\therefore SB = SJ$$

$$\therefore ق(\angle JSB) = ق(\angle JSB) \quad ١$$

$$\therefore ق(\angle JSB) < ق(\angle HSB) \quad ٢$$


بطرح ١ من ٢

$$\therefore ق(\angle JSB) < ق(\angle HSB)$$

(٢) في الشكل المقابل

$$ق(\angle HSB) = ق(\angle HSB) ، \angle P < \angle B$$

$$\text{اثبت أن } \angle H < \angle S$$

في  $\triangle HSB$ 

$$\therefore ق(\angle HSB) = ق(\angle HSB)$$


$$\therefore \angle H = \angle S \quad ١$$

$$\therefore \angle P < \angle B \quad ٢$$

بطرح ١ من ٢

$$\therefore \angle H < \angle S$$

تمارين على نتائج المثلث المتساوي الساقين




١) في الشكل المقابل :

$AB = AC$  ،  $D$  منتصف  $BC$

أثبت أن :

$AD \perp BC$




٢) في الشكل المقابل :

$SB = SC$  ،  $SD \perp BC$  ،

$\angle B = 40^\circ$  ،  $\angle C = 80^\circ$  ،  $D$  منتصف  $BC$  ،  $\angle SDC = 25^\circ$

أوجد ١) طول  $SD$

٢)  $\angle BDC$  (  $\angle CSD$  )




٣) في الشكل المقابل :

$\triangle ABC$  فيه  $AB \perp AC$  ،

$\angle B = 40^\circ$  ،  $\angle C = 40^\circ$  ،

$\angle BDC = 25^\circ$  ،  $D$  منتصف  $BC$

أوجد ١)  $\angle BDC$  ،  $\angle CSD$  ، طول  $SD$



٤) في الشكل المقابل :

$\triangle ABC$  فيه  $AB = AC$  ،

$AD \perp BC$  ،  $\angle BDC = 25^\circ$  ،

$\angle C = 40^\circ$


أوجد ١)  $\angle BDC$  ،  $\angle CSD$

٢) طول  $SD$





المثلث المتساوي الساقين




- ❖ الساقين هما ..... ، .....
- ❖ القاعدة ..... زاوية الرأس .....
- ❖ زاويتا القاعدة ..... ، .....

في الشكل المقابل  $\angle B = \angle C$

إثبت أن

$$\angle B = \angle C$$

العمل: ارسم  $\overline{AH} \perp \overline{BC}$



$\triangle ABH \cong \triangle ACH$  ، .....

فيهما ..... ، ..... ، .....  
 $\therefore \triangle ABH \cong \triangle ACH$  وينتج أن .....

زاويتا القاعده في المثلث المتساوي الساقين  
متطابقتان

❖ إذا كان قياس زاوية الرأس في مثلث متساوي الساقين  $70^\circ$  فإن قياس كل من زاويتي القاعده .....

❖ إذا كان قياس زاوية القاعده في مثلث متساوي الساقين  $50^\circ$  فإن قياس زاوية الرأس .....

❖ إذا كان قياس زاوية في مثلث متساوي الساقين  $60^\circ$  فإن المثلث يكون .....

❖  $\triangle ABC$  فيه  $\angle B = \angle C$

$$\angle A = \angle B = \angle C = 50^\circ \text{ فإن } \angle A = \angle B = \angle C = \dots\dots\dots$$

❖  $\triangle ABC$  فيه  $\angle B = \angle C$

$$\angle A = \angle B = \angle C = 120^\circ \text{ فإن } \angle A = \angle B = \angle C = \dots\dots\dots$$

① إيجاد  $\angle B$


$$\angle B = \angle C = \dots\dots\dots$$

$$\angle A = \angle B = \angle C = \dots\dots\dots$$

مجموع قياسات زوايا

$$\angle A + \angle B + \angle C = \dots\dots\dots$$

$$\angle B = \angle C = \angle A = \dots\dots\dots$$



② إيجاد  $\angle A$

$$\angle B = \angle C = \dots\dots\dots$$

$$\angle A = \angle B = \angle C = \dots\dots\dots$$

$$\angle A = \angle B = \angle C = \dots\dots\dots$$

$$\angle A = \angle B = \angle C = \dots\dots\dots$$

$$\angle A = \angle B = \angle C = \dots\dots\dots$$

مجموع قياسات زوايا

$$\angle A + \angle B + \angle C = \dots\dots\dots$$

$$\angle A = \angle B = \angle C = \dots\dots\dots$$

$$\angle A = \angle B = \angle C = \dots\dots\dots$$

$$\angle A = \angle B = \angle C = \dots\dots\dots$$

$$\angle A = \angle B = \angle C = \dots\dots\dots$$

$$\angle A = \angle B = \angle C = \dots\dots\dots$$

$$\angle A = \angle B = \angle C = \dots\dots\dots$$

$$\angle A = \angle B = \angle C = \dots\dots\dots$$

$$\angle A = \angle B = \angle C = \dots\dots\dots$$

$$\angle A = \angle B = \angle C = \dots\dots\dots$$

$$\angle A = \angle B = \angle C = \dots\dots\dots$$

$$\angle A = \angle B = \angle C = \dots\dots\dots$$

$$\angle A = \angle B = \angle C = \dots\dots\dots$$

$$\angle A = \angle B = \angle C = \dots\dots\dots$$

$$\angle A = \angle B = \angle C = \dots\dots\dots$$

$$\angle A = \angle B = \angle C = \dots\dots\dots$$

$$\angle A = \angle B = \angle C = \dots\dots\dots$$

$$\angle A = \angle B = \angle C = \dots\dots\dots$$

$$\angle A = \angle B = \angle C = \dots\dots\dots$$





$$\angle A = \angle B = \angle C = \dots\dots\dots$$

$$\angle A = \angle B = \angle C = \dots\dots\dots$$

$$\angle A = \angle B = \angle C = \dots\dots\dots$$

$$\angle A = \angle B = \angle C = \dots\dots\dots$$

$$\angle A = \angle B = \angle C = \dots\dots\dots$$



٥) إوجد  $\angle ه$  ( $\angle ه$ )

$$\angle ه = \angle ب \therefore$$

$$\angle ه = \angle ب = ٧٠$$

مجموع قياسات زوايا

المثلث الداخلة = .....

$$\angle ه = \angle ب = ٧٠ - ١٨٠ = ١١٠$$

$$\angle ه = \angle ب = ١٢٠ - ١٨٠ = ٦٠$$

$$\angle ه = \angle ب = ١٢٠ - ١٨٠ = ٦٠$$

$$\angle ه = \angle ب = ١٢٠ - ١٨٠ = ٦٠$$

٦) إوجد  $\angle ه$  ( $\angle ه$ )

$$\angle ه = \angle ب = ٤٠$$

$$\angle ه = \angle ب = ٤٠$$

$$\angle ه = \angle ب = ٤٠$$

$$\angle ه = \angle ب = ٤٠$$

مجموع قياسات زوايا المثلث الداخلة = .....

$$\angle ه = \angle ب = ٤٠$$

٧) إثبت أن :  $\angle ه = \angle ب$

$$\angle ه = \angle ب$$

$$\angle ه = \angle ب$$

$$\angle ه = \angle ب$$

$$\angle ه = \angle ب = ١$$

$$\angle ه = \angle ب$$

$$\angle ه = \angle ب = ٢$$

$$\angle ه = \angle ب = ٢$$

٨) إوجد  $\angle ه$  ( $\angle ه$ )

$$\angle ه = \angle ب = ١٣٠$$

$$\angle ه = \angle ب = ١٣٠$$

$$\angle ه = \angle ب = ١٣٠$$

$$\angle ه = \angle ب = ١٣٠$$

$$\angle ه = \angle ب = ١٣٠$$

$$\angle ه = \angle ب = ١٣٠$$

٩) إوجد قياسات زوايا  $\triangle ه ب ج$

$$\angle ه = \angle ب = ١٠$$

$$\angle ه = \angle ب = ١٠$$

$$\angle ه = \angle ب = ١٠$$

$$\angle ه = \angle ب = ١٠$$

$$\angle ه = \angle ب = ١٠$$

$$\angle ه = \angle ب = ١٠$$

$$\angle ه = \angle ب = ١٠$$

١٠) إوجد قيمة  $\angle ه$

$$\angle ه = \angle ب = ٣٠$$

$$\angle ه = \angle ب = ٣٠$$

$$\angle ه = \angle ب = ٣٠$$

$$\angle ه = \angle ب = ٣٠$$

إذا وجدت زاويتان في مثلث متساويتان في القياس فإن المثلث يكون .....

١٢) إثبت أن  $\angle ه = \angle ب$

$$\angle ه = \angle ب$$

$$\angle ه = \angle ب$$

$$\angle ه = \angle ب$$

$$\angle ه = \angle ب = ١$$

$$\angle ه = \angle ب$$

$$\angle ه = \angle ب = ٢$$

١٣) إثبت أن  $\angle ه = \angle ب$

$$\angle ه = \angle ب$$









$$\angle ه = \angle ب$$

$$\angle ه = \angle ب$$

مجموع قياسات زوايا المثلث الداخلة = .....

$$\angle ه = \angle ب = ١٣٠$$

$$\angle ه = \angle ب = ١٣٠$$


$$\therefore \Delta \Delta \text{ متطابقان وينتج أن } P = P' \text{ هـ}$$

$$\therefore \mathcal{W}(\widehat{hj}) = \mathcal{W}(\widehat{h}) \therefore h = hj$$





## ۛ منتصف ب ج

∴  $\frac{1}{2}h \leftarrow$  نصف  $\hat{b}$  ج

$$\overline{ab} = \overline{a}b + a\overline{b}$$


طرفي القطعه المستقيمه تقع على .....



جہ // ب م

$\hat{V} =$  بالتبادل

∴ وہ (جہ ب)

$$\gamma \circ \beta = \bigcup \gamma \quad \therefore \quad (\beta \hat{\cup} \gamma) \circ \alpha =$$


Ⓣ اثبت أن ج ب = هـ ج

۴۰۰

## متساوی الاضلاع

$$0, \dots = (\hat{p} \wedge m) \sim \therefore$$
$$0, \dots = (\hat{p}_j) \sim \dots$$


∴ (بجھ) = 0..... ∴ مجموع قياسات زوايا

المثلث الداخلي = .....  $\therefore$  وهو  $(\hat{b}) = 0, \dots, 0$

$$\mathfrak{h}_{\mathcal{F}} = \mathfrak{c}_{\mathcal{F}} \therefore (\widehat{\mathfrak{h}})_{\mathcal{V}} = (\widehat{\mathfrak{c}})_{\mathcal{V}} \therefore$$

٢٤) اثبت أن

م // ج


$$mP = hP \therefore$$
$$(\hat{\cdot} \hat{\cdot} \hat{\cdot}) \wr = (\hat{\cdot} \hat{\cdot}) \wr$$
$$(\hat{v}, \hat{v})_{\mathcal{H}} + (\hat{h})_{\mathcal{H}} = (\hat{h} \hat{b})_{\mathcal{H}} ::$$

∴  $\vec{p}_j$  ينصف  $(\vec{p}_h)$

$$\therefore \psi(\hat{p}_j \psi) = \psi(\hat{h}) \quad \text{وهما متبادلتان}$$







$\overline{m} // p \leftarrow j$

## التباين

إذا اختلف طولاً ضلعين في مثلث فإن الضلع الأكبر في الطول يقابل زاوية أكبر في القياس

- ❖ إذا كان  $\triangle PAB$  فيه  $P < B < A$  فإن  $\widehat{A} < \widehat{B} < \widehat{P}$
- ❖  $\triangle PAB$  فيه  $P = 7$  سم ،  $B = 5$  سم فإن  $\widehat{A} < \widehat{B}$

① رتب قياسات زوايا  $\triangle PAB$  ج تصاعدياً إذا كانت  $P = 8$  سم ،  $B = 9$  سم ،  $A = 5$  سم



❖ عدد محاور المثلث المتساوي الاضلاع .....

❖ عدد محاور المثلث المتساوي الساقين .....

❖ عدد محاور المثلث المختلف الاضلاع .....

❖ مثلث فيه زاويتين قياسهما  $70^\circ$  ،  $40^\circ$  عدد محاور تماثله .....

❖ مثلث قائم الزاوية به زاوية قياسها  $50^\circ$  عدد محاور التماثل له .....


❖ مثلث متساوي الساقين زاوية الرأس قياسها  $60^\circ$  عدد محاور التماثل له .....

❖  $\triangle PAB$  ،  $\widehat{A} = 50^\circ$  ،  $\widehat{B} = 80^\circ$  فإن  $B =$  .....

❖ في الشكل المقابل

إثبت أن  $BH = \frac{1}{2} AB$

إثبت أن  $BM = B$



## المثلث المتساوي الساقين

٢

(١) أكمل ما يأتي بالإجابة الصحيحة


- ١) زاويتا القاعدة في المثلث متساوي الساقين ..... في القياس
- ٢) إذا كان المثلث متساوي الاضلاع فإن قياس كل زاوية من زواياه الداخلية = .....
- ٣) قياس الزاوية الخارجة عند أي رأس من رؤوس المثلث المتساوي الاضلاع = .....
- ٤) في  $\Delta$  ا ب ج إذا كان ا ب = ا ج ،  $\angle$  ا =  $50^\circ$  ، فإن :  $\angle$  ب = .....
- ٥) في  $\Delta$  ا ب ج إذا كان ا ب = ا ج ،  $\angle$  ب =  $70^\circ$  ، فإن :  $\angle$  ا = .....
- ٦) إذا كان  $\Delta$  ا ب ج قائم الزاوية في ب ، ا ب = ب ج ، فإن :  $\angle$  ج = .....
- ٧) في  $\Delta$  ا ب ج إذا كان ا ب = ا ج ،  $\angle$  ب =  $60^\circ$  ، فإن :  $\Delta$  ا ب ج يكون .....
- ٨) إذا كان قياس زاوية رأس في المثلث متساوي الساقين =  $80^\circ$  ، فإن قياس زاوية قاعدته = .....
- ٩) في  $\Delta$  س ص ع ، إذا كان  $\angle$  س =  $40^\circ$  ،  $\angle$  ص =  $70^\circ$  ، فإن  $\Delta$  س ص ع ..... الساقين
- ١٠) إذا تطابقت زوايا مثلث فإنه يكون ..... الأضلاع
- ١١) في  $\Delta$  س ص ع إذا كان س ص = س ع ،  $\angle$  س =  $60^\circ$  ومحيطه ٤٥ سم فإن : ص ع = .....
- ١٢) إذا تطابقت زاويتان في مثلث كان المثلث .....
- ١٣) إذا كان قياس إحدى زوايا القاعدة في المثلث متساوي الساقين  $70^\circ$  ، فإن قياس زاوية الرأس = .....
- ١٤) منصف زاوية الرأس في المثلث متساوي الساقين .....
- ١٥) متوسط المثلث المتساوي الساقين للمرسوم من الرأس يكون .....
- ١٦) المستقيم المرسوم من رأس المثلث متساوي الساقين عموديا على القاعدة .....
- ١٧) محور تماثل القطعة المستقيمة هو المستقيم .....
- ١٨) المستقيم المرسوم من رأس المثلث المتساوي الساقين عموديا على القاعدة يسمى .....
- ١٩) عدد محاور تماثل المثلث المتساوي الساقين .....
- ٢٠) عدد محاور تماثل المثلث المتساوي الاضلاع .....
- ٢١) عدد محاور تماثل المثلث المختلف الاضلاع .....
- ٢٢) أي نقطة تقع على محور تماثل القطعة المستقيمة تكون على ..... من طرفيها
- ٢٣) إذا كان المثلث متساوي الساقين قياس إحدى زواياه  $60^\circ$  ، فإن عدد محاور تماثله .....
- ٢٤) إذا كان قياس إحدى زوايا مثلث قائم الزاوية  $45^\circ$  ، كان المثلث .....
- ٢٥) مثلث له محور تماثل واحد وقياس إحدى زاويتي القاعدة تساوي  $50^\circ$  ، فإن قياس زاوية رأسه = .....
- ٢٦) إذا كان قياسا زاويتين في مثلث  $70^\circ$  ،  $40^\circ$  ، فإن نوع المثلث بالنسبة لاضلاعه .....
- ٢٧)  $\Delta$  ا ب ج فيه  $\angle$  ا =  $80^\circ$  ،  $\angle$  ج =  $50^\circ$  ، فإن عدد محاور تماثله = .....
- ٢٨) المستقيم العمودي على قطعه مستقيمة من منتصفها يسمى .....
- ٢٩) عدد محاور تماثل القطعة المستقيمة = .....
- ٣٠) إذا كانت ج  $\in$  لمحور تماثل ا ب فإن ..... = .....



(٢) اختر الإجابة الصحيحة

- ١) في  $\Delta$  ا ب ج إذا كان ا ب = ب ج ، ن ( $\Delta$  ب) =  $40^\circ$  فان : ن ( $\Delta$  ج) = ..... [  $40^\circ$  ،  $140^\circ$  ،  $70^\circ$  ،  $20^\circ$  ]
- ٢) قياس الزاوية الخارجة عن المثلث المتساوي الاضلاع = ..... [  $30^\circ$  ،  $60^\circ$  ،  $90^\circ$  ،  $120^\circ$  ]
- ٣)  $\Delta$  س ص ع متساوي الساقين ، ن ( $\Delta$  س) =  $60^\circ$  فان  $\Delta$  س ص ع يكون .....  
[ قائم الزاوية ، منفرج الزاوية ، متساوي الاضلاع ، مختلف الاضلاع ]
- ٤) في  $\Delta$  ا ب ج إذا كان ا ب = ا ج ، ن ( $\Delta$  ب) =  $45^\circ$  فان  $\Delta$  ا ب ج يكون .....  
[ قائم الزاوية ، منفرج الزاوية ، حاد الزوايا ، متساوي الاضلاع ]
- ٥)  $\Delta$  ا ب ج متساوي الساقين فيه ن ( $\Delta$  ب) =  $100^\circ$  فان : ن ( $\Delta$  ا) = ..... [  $40^\circ$  ،  $50^\circ$  ،  $80^\circ$  ،  $100^\circ$  ]
- ٦) إذا كان قياسا زاويتين في مثلث  $80^\circ$  ،  $50^\circ$  فان المثلث يكون .....  
[ مختلف الاضلاع ، متساوي الاضلاع ، متساوي الساقين ، قائم الزاوية ]
- ٧) إذا كان قياس زاوية رأس مثلث متساوي الساقين  $50^\circ$  فان قياس إحدى زاويتي قاعدته .....  
[  $55^\circ$  ،  $65^\circ$  ،  $80^\circ$  ،  $100^\circ$  ]
- ٨) عدد محاور تماثل المثلث متساوي الاضلاع = ..... [ صفر ، ١ ، ٢ ، ٣ ]
- ٩) في  $\Delta$  ا ب ج إذا كان ا ب = ب ج فان  $\Delta$  ج تكون ..... [ حادة ، منفرجة ، قائمة ، مستقيمة ]
- ١٠) إذا كانت س  $\exists$  لمحور تماثل ا ب فان ا س ..... ب س  
[  $\equiv$  ،  $\perp$  ،  $//$  ،  $=$  ]
- ١١) المثلث الذي طول اضلاعه ٢ سم ، (٣ + س) سم ، ٥ سم يكون متساوي الساقين عندما س = .....  
[ ١ ، ٢ ، ٣ ، ٤ ]
- ١٢) قياس أي زاوية من زوايا المثلث متساوي الاضلاع = ..... [  $30^\circ$  ،  $45^\circ$  ،  $60^\circ$  ،  $120^\circ$  ]
- ١٣) زاويتا القاعدة في المثلث متساوي الساقين ..... [ متتامتان ، متكاملتان ، متطابقتان ، مستقيمتان ]
- ١٤) عدد محاور تماثل المثلث متساوي الساقين = ..... [ صفر ، ١ ، ٢ ، ٣ ]
- ١٥) إذا كان طول ضلع في مثلث  $\frac{1}{3}$  المحيط فان عدد محاور تماثل هذا المثلث = ..... [ صفر ، ١ ، ٢ ، ٣ ]
- ١٦) عدد محاور تماثل المثلث القائم الزاوية وفيه زاوية قياسها  $30^\circ$  هو ..... [ صفر ، ١ ، ٢ ، ٣ ]

(٣) أجب عن الاسئلة الآتية




- ١) في الشكل المقابل : ا ب = ا ج ، ن ( $\Delta$  ا) =  $40^\circ$  ،  
(١) أوجد : ن ( $\Delta$  ا ب ج) ، (ب) أثبت أن :  $\Delta$  ا ب ج  $\equiv$   $\Delta$  ا ج ب

الحل :

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....




٢) في الشكل المقابل :  $AS = BS$  ،  $CS = CS$  ،  $\angle ASB = \angle BSC$   
اثبت أن :  $\triangle ASB \cong \triangle BSC$




الحل :  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

٣) في الشكل المقابل :  $AB = AC$  ،  $AD = AD$  ،  $\angle BAD = \angle CAD$   
اثبت أن :  $\triangle ABD \cong \triangle ACD$




الحل :  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

٤) في الشكل المقابل :  $AB = AC$  ،  $AD = AD$  ،  $\angle BAD = \angle CAD$   
اثبت أن :  $\triangle ABD \cong \triangle ACD$




الحل :  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

٥) في الشكل المقابل :  $AB = AC$  ،  $AD$  ينصف  $\angle BAC$   
أوجد :  $\angle ABD$  ،  $\angle ACD$




الحل :  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....




٥) في الشكل المقابل :  $AB = AC$  ،  $BC = BA$  ،  $\angle A = 30^\circ$  ،  $AD = DC$  ، أوجد قياسات زوايا المثلث  $ABC$

الحل :




٦) في الشكل المقابل :  $AB = AC$  ،  $BC = BA$  ،  $\angle A = 130^\circ$  ، أوجد  $\angle C$  ،  $\angle B$

الحل :




٧) في الشكل المقابل :  $AB = AC$  ،  $BC = BA$  ،  $\angle A = (13 + 2x)^\circ$  ،  $\angle B = (17 - 3x)^\circ$  ، أوجد قياسات زوايا  $\triangle ABC$

الحل :



٨) في الشكل المقابل :  $AB = AC$  ،  $BC = BA$  ،  $AD = DC$  ،  $AD$  ينصف  $BC$  ، أثبت أن :  $\triangle ABC$  متساوي الساقين


الحل :



٩) في الشكل المقابل :  $AB = AC$  ،  $BC = BA$  ،  $AD = DC$  ،  $AD$  ينصف  $BC$  ، أثبت أن :  $\triangle ABC$  متساوي الساقين

الحل :






١٠) في الشكل المقابل :  $\overline{AB} = \overline{DE}$  ،  $\overline{BC} \parallel \overline{EF}$

اثبت أن : المثلث  $\triangle ABC$  متساوي الساقين

الحل :

.....  
.....  
.....  
.....




١١) في الشكل المقابل :  $\overline{AD} = \overline{DC}$  ،  $\angle A = 40^\circ$

أوجد :  $\angle B$  (  $\triangle ABC$  )

الحل :

.....  
.....  
.....  
.....




١٢) في الشكل المقابل :  $\angle A = 2x - 1$  ،  $\angle B = x + 3$  ،  $\angle C = x - 9$

أوجد : محيط  $\triangle ABC$

الحل :

.....  
.....  
.....  
.....



١٣) في الشكل المقابل :  $\overline{AD} = \overline{DC}$  ،  $\angle A = 40^\circ$

$\overline{AD} \perp \overline{BC}$  ،  $\angle A = 40^\circ$

اثبت أن :  $\triangle ABC$  متساوي الساقين

الحل :

.....  
.....  
.....  
.....  
.....

١	إذا تطابقت زوايا المثلث كان المثلث .....	٢	قائم	٣	متساوي الاضلاع	٤	مختلف الاضلاع	٥	منفرج
٦	عدد محاور تماثل المثلث المتساوي الساقين .....	٧	٣	٨	٤	٩	٢	١٠	١
١١	إذا كانت $\angle \alpha < \angle \beta$ فإن $\angle \gamma$ ..... $\angle \alpha$ و $\angle \beta$ ..... $\angle \gamma$	١٢	$>$	١٣	$<$	١٤	$<$	١٥	$=$

- ١ منصف زاوية رأس المثلث المتساوي الساقين ينصف القاعدة ويكون ..... عليها
- ٢ قياس الزاوية الخارجة عند أي رأس من رؤوس المثلث المتساوي الاضلاع = .....°
- ٣ إذا اختلف قياس زاويتان في المثلث فأكبرهما في القياس يقابلها .....

١	في الشكل المقابل:- $\Delta \alpha \beta \gamma$ فيه $\overline{\alpha \beta} \parallel \overline{\gamma \delta}$ $\angle \alpha = 65^\circ$ أوجد:- قياسات زوايا $\Delta \alpha \beta \gamma$	٢	في الشكل المقابل:- $\overline{\alpha \beta} \parallel \overline{\gamma \delta}$ $\angle \alpha > \angle \beta$ أثبت ان:- $\angle \alpha < \angle \beta$
---	---	---	---